



Table of radionuclides (Vol. 4 - A = 133 to 252)

Marie-Martine Bé, Vanessa Chisté, Christophe Dulieu, Edgardo Browne, Valery Chechev, Nikolay Kuzmenko, Filip Kondov, Aurelian Luca, Monica Galan, Andrew Pierce, et al.

► To cite this version:

Marie-Martine Bé, Vanessa Chisté, Christophe Dulieu, Edgardo Browne, Valery Chechev, et al.. Table of radionuclides (Vol. 4 - A = 133 to 252). Bureau International des Poids et Mesures. , 4, 2008, Table of radionuclides, 92-822-2230-6. cea-02476295

HAL Id: cea-02476295

<https://cea.hal.science/cea-02476295>

Submitted on 12 Feb 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Table of Radionuclides (Vol. 4 – A = 133 to 252)

M.-M. Bé, V. Chisté, C. Dulieu
E. Browne
V. Chechev, N. Kuzmenko
F. Kondev
A. Luca
M. Galán
A. Pearce
X. Huang



2008

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES

Pavillon de Breteuil, F-92310 SÈVRES

Édité par le BIPM,
Pavillon de Breteuil
F-92312 Sèvres Cedex
France

Imprimé par Reproduction Service

ISBN 92-822-2204-7 (Set)
ISBN 92-822-2230-6 (Vol. 4)
ISBN 92-822-2231-4 (CD-Rom)

Preface

This monograph is one of several published in a series by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) on behalf of the *Comité Consultatif des Rayonnements Ionisants* (CCRI), previously known as the *Comité Consultatif pour les Étalons de Mesure des Rayonnements Ionisants* (CCEMRI). The aim of this series of publications is to review topics that are of importance for the measurement of ionizing radiation and especially of radioactivity, in particular those techniques normally used by participants in international comparisons. It is hoped that these publications will prove to be useful reference volumes both for those who are already engaged in this field and for those who are approaching such measurements for the first time.

The purpose of this monograph, number 5 in the series, is to present the recommended values of nuclear and decay data for a wide range of radionuclides. Activity measurements for more than fifty-five of these radionuclides have already been the subject of comparisons under the auspices of Section II (dedicated to the *Measurement of radionuclides*) of the CCRI. The material for this monograph is now covered in four volumes. The first two volumes contain the primary recommended data relating to half-lives, decay modes, x-rays, gamma-rays, electron emissions; alpha- and beta-particle transitions and emissions, and their uncertainties for a set of sixty-eight radionuclides, Volume 1 for those radionuclides with mass number up to and including 150 and Volume 2 for those radionuclides with mass number over 150. Volume 3 contains the equivalent data for twenty-six additional radionuclides as listed and re-evaluations for ^{125}Sb and ^{153}Sm while Volume 4 contains the data for a further thirty-one radionuclides with re-evaluation for ^{226}Ra . The data have been collated and evaluated by an international working group (Decay Data Evaluation Project) led by the LNE-LNHB. The evaluators have agreed on the methodologies to be used and the CD-ROM included with this monograph contains the evaluators' comments for each radionuclide in addition to the data tables included in the monograph.

The work involved in evaluating nuclear data is on-going and the recommended values are updated on the LNHB website at http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm.

The publication of further volumes of Monographie 5 is envisaged as and when necessary to add new radionuclide data or re-evaluations in a more permanent format that can be referenced easily.

Although other data sets may still be used when evaluating radionuclide activity, use of this common, recommended data set should help to reduce the uncertainties in activity evaluations and lead to more coherent results for comparisons.

K. Carneiro
President of the CCRI

A.J. Wallard
Director of the BIPM

Monographie BIPM-5 – Table of Radionuclides, Volume 4

Marie-Martine BÉ, Vanessa CHISTÉ, Christophe DULIEU, Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB), France ;
Edgardo BROWNE, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), USA ;
Valery CHECHEV, Nikolay KUZMENKO, Khlopin Radium Institute (KRI), Russia ;
Filip G. KONDEV, Argonne National Laboratory (ANL), USA ;
Aurelian LUCA, Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Romania ;
Mónica GALÁN, Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (CIEMAT), Spain ;
Andrew PEARCE, National Physical Laboratory (NPL), United Kingdom ;
Xiaolong HUANG, China Institute of Atomic Energy (CIAE), China.

“TABLE DE RADIONUCLÉIDES”

Sommaire - Ce volume regroupe l'évaluation des radionucléides suivants :

^{133}I , ^{133}Xe , $^{133}\text{Xe}^m$, $^{135}\text{Xe}^m$, ^{139}Ce , ^{206}Tl , ^{210}Tl , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{210}Po , ^{213}Po , ^{214}Pb , ^{214}Bi , ^{214}Po , ^{217}Rn , ^{218}Po ,
 ^{218}At , ^{218}Rn , ^{221}Fr , ^{222}Rn , ^{226}Ra , ^{227}Ac , ^{232}U , ^{236}U , ^{237}Np , ^{238}Np , ^{239}U , ^{239}Np , ^{239}Pu , ^{241}Pu , ^{246}Cm , ^{252}Cf .

Les valeurs recommandées et les incertitudes associées comprennent : la période radioactive, les modes de décroissance, les émissions α , β , γ , X et électroniques ainsi que les caractéristiques des transitions correspondantes.

“TABLE OF RADIONUCLIDES”

Summary - This volume includes the evaluation of the following radionuclides:

^{133}I , ^{133}Xe , $^{133}\text{Xe}^m$, $^{135}\text{Xe}^m$, ^{139}Ce , ^{206}Tl , ^{210}Tl , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{210}Po , ^{213}Po , ^{214}Pb , ^{214}Bi , ^{214}Po , ^{217}Rn , ^{218}Po ,
 ^{218}At , ^{218}Rn , ^{221}Fr , ^{222}Rn , ^{226}Ra , ^{227}Ac , ^{232}U , ^{236}U , ^{237}Np , ^{238}Np , ^{239}U , ^{239}Np , ^{239}Pu , ^{241}Pu , ^{246}Cm , ^{252}Cf .

Primary recommended data comprise half-lives, decay modes, X-rays, gamma-rays, electron emissions, alpha- and beta-particle transitions and emissions, and their uncertainties.

“TABELLE DER RADIONUKLIDE”

Zusammenfassung - Dieser Band umfaßt die Evaluation der folgenden Radionuklide:

^{133}I , ^{133}Xe , $^{133}\text{Xe}^m$, $^{135}\text{Xe}^m$, ^{139}Ce , ^{206}Tl , ^{210}Tl , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{210}Po , ^{213}Po , ^{214}Pb , ^{214}Bi , ^{214}Po , ^{217}Rn , ^{218}Po ,
 ^{218}At , ^{218}Rn , ^{221}Fr , ^{222}Rn , ^{226}Ra , ^{227}Ac , ^{232}U , ^{236}U , ^{237}Np , ^{238}Np , ^{239}U , ^{239}Np , ^{239}Pu , ^{241}Pu , ^{246}Cm , ^{252}Cf .

In diesem Bericht sind evaluierte Werte der Halbwertszeiten, Übergangswahrscheinlichkeiten und Übergangsenergien von α , β^- , β^+ , EC- und Gammaübergängen, Konversionskoeffizienten von Gammaübergängen sowie der Emissionswahrscheinlichkeiten von Röntgen- und Gammaquanten, Auger- und Konversionselektronen und deren Unsicherheiten zusammengefaßt.

“ТАБЛИЦА РАДИОНУКЛИДОВ”

Резюме - Этот том включает оценки характеристик распада для следующих нуклидов:

^{133}I , ^{133}Xe , $^{133}\text{Xe}^m$, $^{135}\text{Xe}^m$, ^{139}Ce , ^{206}Tl , ^{210}Tl , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{210}Po , ^{213}Po , ^{214}Pb , ^{214}Bi , ^{214}Po , ^{217}Rn , ^{218}Po ,
 ^{218}At , ^{218}Rn , ^{221}Fr , ^{222}Rn , ^{226}Ra , ^{227}Ac , ^{232}U , ^{236}U , ^{237}Np , ^{238}Np , ^{239}U , ^{239}Np , ^{239}Pu , ^{241}Pu , ^{246}Cm , ^{252}Cf .

Основные рекомендуемые данные включают периоды полураспада, виды распада, X-излучение, гамма-излучение, электронное излучение, альфа- и бета- переходы и излучения, а также погрешности рассмотренных величин.

“TABLA DE RADIONUCLEIDOS”

Contenido - Este volúmen agrupa la evaluación de los radionucleidos siguientes :

^{133}I , ^{133}Xe , $^{133}\text{Xe}^m$, $^{135}\text{Xe}^m$, ^{139}Ce , ^{206}Tl , ^{210}Tl , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{210}Po , ^{213}Po , ^{214}Pb , ^{214}Bi , ^{214}Po , ^{217}Rn , ^{218}Po ,
 ^{218}At , ^{218}Rn , ^{221}Fr , ^{222}Rn , ^{226}Ra , ^{227}Ac , ^{232}U , ^{236}U , ^{237}Np , ^{238}Np , ^{239}U , ^{239}Np , ^{241}Pu , ^{246}Cm , ^{252}Cf .

Los valores recomendados y las incertidumbres asociadas comprenden : el período de semidesintegración radiactiva, los modos de desintegración, las emisiones α , β , γ , X y electrónicas incluyendo las características de las transiciones correspondientes.

TABLE DE RADIONUCLÉIDES
TABLE OF RADIONUCLIDES
TABELLE DER RADIONUKLIDE
ТАБЛИЦА РАДИОНУКЛИДОВ
TABLA DE RADIONUCLEIDOS

Marie-Martine BÉ, Vanessa CHISTÉ, Christophe DULIEU, Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB), France ;
Edgardo BROWNE, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), USA ;
Valery CHECHEV, Nikolay KUZMENKO, Khlopin Radium Institute (KRI), Russia ;
Filip G. KONDEV, Argonne National Laboratory (ANL), USA ;
Aurelian LUCA, Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Romania ;
Mónica GALÁN, Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (CIEMAT), Spain ;
Andrew PEARCE, National Physical Laboratory (NPL), United Kingdom ;
Xiaolong HUANG, China Institute of Atomic Energy (CIAE), China.

TABLE DE RADIONUCLÉIDES

INTRODUCTION

Le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) a commencé l'étude des données nucléaires et atomiques qui caractérisent la décroissance des radionucléides en 1974. Ces évaluations ont fait l'objet de la publication des quatre volumes de la Table de Radionucléides [87Ta] et de trois volumes de la *Monographie BIPM-5* [99Be, 04Be, 06Be]. Ce nouveau volume s'inscrit dans la continuation du travail précédent.

D'autre part, pour des raisons évidentes, telles la facilité de mise à jour des données ou la commodité de consultation pour les utilisateurs, le LNHB a créé une base de données informatisée. Le logiciel NUCLEIDE est la forme informatisée de cette table, il permet un accès aisément aux différentes informations à l'aide de menus déroulants atteints par un simple « clic » sur un « bouton ».

Le propos de la Table est d'étudier un nombre limité de radionucléides utiles dans le domaine de la métrologie ou dans des domaines variés d'applications (médecine nucléaire, environnement, cycle du combustible, etc.) et d'en présenter une étude complète.

Les données recommandées comprennent : la période radioactive, les modes de décroissance, les émissions α , β , γ , X et électroniques ainsi que les caractéristiques des transitions associées.

Dans le but de mettre à jour et d'ajouter de nouvelles évaluations plus rapidement Le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB, France) et le Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Germany) ont établi un accord de coopération. Ils ont ensuite été rejoints par Idaho National Engineering & Environmental Laboratory (INEEL, USA), Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL, USA) et Khlopin Radium Institute (KRI, Russia). Le premier travail de cette collaboration internationale a été d'établir une méthode et des règles communes d'évaluation. Les évaluations proposent des valeurs recommandées et leurs incertitudes. Ces valeurs ont été évaluées à partir des données expérimentales disponibles. A défaut, elles sont issues de calculs théoriques. Toutes les références utilisées pour l'évaluation d'un radionucléide sont listées à la fin de chaque chapitre.

Ce volume est le quatrième de la *Monographie 5* [04Be] publiée sous l'égide du BIPM.

VALEURS RECOMMANDÉES ET INCERTITUDES

Les principales étapes pour l'évaluation des données et leurs incertitudes sont :

- une analyse critique de toutes les publications disponibles afin de retenir ou non une valeur et son incertitude, ramenée à l'incertitude-type composée ;
- la détermination d'une valeur recommandée qui est, selon les cas, une moyenne simple ou pondérée des valeurs issues des publications, ceci est décidé après examen du chi carré réduit. Dans le cas d'une moyenne pondérée, le poids relatif de chaque valeur est limité à 50 %. L'incertitude, notée u_c , est la plus grande des valeurs des incertitudes interne ou externe ; dans le cas de valeurs incompatibles, elle peut être étendue pour recouvrir la valeur la plus précise.

Pour certaines applications il est nécessaire de définir une incertitude élargie, notée U , telle que :

$$U(y) = k \times u_c(y) \quad \text{où } k \text{ est le facteur d'élargissement.}$$

La valeur de k retenue pour cette publication est : $k = 1$.

Les valeurs d'incertitude indiquées portent sur les derniers chiffres significatifs, ainsi :

9,230 (11) signifie $9,230 \pm 0,011$ et

9,2 (11) $9,2 \pm 1,1$

Si une valeur est donnée sans incertitude, cela signifie qu'elle est considérée comme douteuse. Elle est indiquée à titre indicatif et souvent a été estimée en fonction du schéma de désintégration comme étant « de l'ordre de ».

Des précisions concernant les techniques d'évaluation peuvent être obtenues dans les références [85Zi], [96He], [99In] (voir rubrique Références) ou directement auprès des auteurs.

La description physique des données évaluées est disponible dans la référence [99In].

NUMÉROTAGE

Les niveaux d'un noyau sont numérotés, arbitrairement, de 0 pour le niveau fondamental à n pour le n ième niveau excité. Les diverses transitions sont ainsi repérées par leur niveau de départ et leur niveau d'arrivée.

Dans le cas de transition de faible probabilité qu'il n'est pas possible de situer sur le schéma de désintégration, les niveaux de départ et d'arrivée sont notés (-1, n).

Dans le cas de l'émission gamma de 511 keV qui suit une désintégration bêta plus, la notation adoptée est : (-1, -1).

UNITÉS

Les valeurs recommandées sont exprimées :

- pour les périodes :

	Symbole
. en secondes pour $T_{1/2} \leq 60$ secondes	s
. en minutes pour $T_{1/2} > 60$ secondes	min
. en heures pour $T_{1/2} > 60$ minutes	h
. en jours pour $T_{1/2} > 24$ heures	d
. en années pour $T_{1/2} > 365$ jours	a

1 année = 365,242 198 jours = 31 556 926 secondes ;

- pour les probabilités de transition et nombre de particules émises, les valeurs sont données pour 100 désintégrations ;
- les énergies sont exprimées en keV.

AVERTISSEMENT

Ce document a été imprimé en 2008, pour toutes les nouvelles évaluations et mises à jour ultérieures le lecteur se référera aux documents accessibles sur :

<http://www.nucleide.org/NucData.htm>

<http://www1.bipm.org/fr/publications/monographie-ri-5.html>

TABLE OF RADIONUCLIDES

INTRODUCTION

The evaluation of decay data for the “Table de Radionucléides” by the Bureau National de Métrologie – Laboratoire National Henri Becquerel/Commissariat à L’Énergie Atomique (BNM – LNHB/CEA) began in 1974, continued to 1987 and four volumes were published [87Ta] and then, in 1999, the fifth volume was published containing the revised evaluations for 30 selected radionuclides [99Be]. This work has been pursued and three volumes of evaluations have already been published as *Monographie* BIPM-5 [04Be, 06Be].

Moreover, LNHB developed a software (NUCLEIDE) with the objectives of making it easier to update and add data and, obviously, to offer easy access to the nuclear and atomic decay data to the user by “click on the button” facilities.

The aim of this Table is to provide recommended data for nuclides of special interest for metrology or practical applications like nuclear medicine, monitoring and reactor shielding, etc.

Primary recommended data comprise half-lives, decay modes, X-rays, gamma-rays, electron emissions, alpha- and beta-particle transitions and emissions, and their uncertainties. All the references used for the evaluations are given.

In order to update the data of the nuclides already present and to add new evaluations, the Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB, France) and the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Germany) established a cooperative agreement ; they were then joined by the Idaho National Engineering & Environmental Laboratory (INEEL, USA), the Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL, USA) and the Khlopin Radium Institute (KRI, Russia). This international collaboration is based on an informal agreement, the initial work of this group was to discuss and to agree on a methodology to be used in these evaluations. The data and associated uncertainties were evaluated from all available experiments and taking into account theoretical considerations.

This volume is the fourth in the series of the *Monographie* 5 published under the BIPM auspices.

RECOMMENDED VALUES AND UNCERTAINTIES

The main steps for the evaluation of the data and their uncertainties are :

- a critical analysis of all available original publications in order to accept or not each value and its uncertainty reduced to the combined standard uncertainty ;
- the determination of the best value which is either the weighted or the unweighted average of the retained values, this is decided after examination of the reduced χ^2 value. For a weighted average of discrepant data, each weight is limited to 50 %, and the uncertainty, designated u_c , is the larger of the internal or external uncertainty values, which may be expanded to cover the most precise input value.

For some applications it may be necessary to define an expanded uncertainty, designated U , as :

$$U(y) = k \times u_c(y) \quad \text{where } k \text{ is the coverage factor.}$$

For this publication the expanded uncertainty is computed with $k = 1$.

The value of the uncertainty, in parentheses, applies to the least significant digits, i.e. :

9.230 (11) means 9.230 ± 0.011 and

9.2 (11) 9.2 ± 1.1

A value given without an uncertainty is considered questionable. It is provided for information and often its order of magnitude is estimated from the decay scheme.

Information on evaluation methods may be obtained from references [85Zi, 96He, 99In] or directly from the authors.

Information on the meaning of physical data may be obtained from reference [99In].

NUMBERING

Nuclear levels are arbitrarily numbered from 0 (for the ground state level) to n (for the n^{th} excited level). All transitions are designated by their initial and final levels.

For transitions with weak emission probabilities that are not shown by an arrow in the decay scheme, the initial and final levels are noted (-1, n).

For a 511 keV gamma emission, which follows a beta plus disintegration, the adopted numbering is (-1, -1).

UNITS

The recommended values are given :

- for half-lives :

	Symbol
. in seconds for $T_{1/2} \leq 60$ seconds	s
. in minutes for $T_{1/2} > 60$ seconds	min
. in hours for $T_{1/2} > 60$ minutes	h
. in days for $T_{1/2} > 24$ hours	d
. in years for $T_{1/2} > 365$ days	a

$$1 \text{ year} = 365.242\ 198 \text{ days} = 31\ 556\ 926 \text{ seconds}$$

- for transition probabilities and number of emitted particles, the values are given for 100 disintegrations of the parent nuclide.

- for energies, the values are expressed in keV.

NOTICE

This report was printed in 2008, new evaluations and updated issues will be available on:

<http://www.nucleide.org/NucData.htm>

<http://www1.bipm.org/fr/publications/monographie-ri-5.html>

TABELLE DER RADIONUKLIDE

EINLEITUNG

Die Evaluation der Zerfallsdaten für die „Table de Radionucléides“ durch das Laboratoire National Henri Becquerel (BNM-LNHB/CEA) begann im Jahre 1974, diese Arbeit wurde bis 1987 fortgesetzt, und es wurden vier Bände veröffentlicht [87Ta]. Seitdem sind des weiteren drei Bände der *Monographie BIPM-5* [99Be, 04Be, 06Be] erschienen. Der vorliegende neue Band stellt die Fortsetzung der vorhergehenden Arbeit dar.

Darüber hinaus wurde im LNHB eine computerbasierte Datenbank entwickelt. Die Software NUCLEIDE erleichtert die Aktualisierung und die Einbeziehung weiterer Daten und ermöglicht den Zugang zu den Kern- und Atomdaten für den Anwender „auf Tastendruck“.

Der Zweck dieser Tabelle ist es, empfohlene Daten einer begrenzten Anzahl von Radionukliden für metrologische und praktische Anwendungen wie etwa in der Nuklearmedizin, der Umweltüberwachung, dem Brennstoffkreislauf, der Reaktorabschirmung usw. zur Verfügung zu stellen.

Die empfohlenen Daten betreffen die Halbwertszeit, die Art des Zerfalls und die Charakteristika der α -, β -, γ -, Röntgen- und Elektronenemissionen und der entsprechenden Übergänge.

Um die bereits vorliegenden Daten zu aktualisieren und neue Evaluationen schneller einbeziehen zu können, vereinbarten das Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB, Frankreich) und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Deutschland) eine Übereinkunft zur Zusammenarbeit. Es schlossen sich das Idaho National Engineering and Environmental Laboratory (INEEL, USA), das Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL, USA) und das Khlopin Radium Institute (KRI, Rußland) an. Eine der ersten Arbeiten dieser Gruppe war es, die in diesen Evaluationen benutzte Methodologie zu diskutieren und festzulegen. Die Datenbank umfaßt empfohlene Daten und ihre Unsicherheiten, die aus den verfügbaren experimentellen Daten oder theoretischen Berechnungen gewonnen wurden. Alle für die Evaluation benutzten Referenzen werden angegeben.

Dieser Band ist die vierte Ausgabe der *Monographie BIPM-5* [04Be].

EMPFOHLENE WERTE UND UNSICHERHEITEN

Die Hauptschritte für die Evaluation der Daten und Unsicherheiten sind:

- Eine kritische Analyse aller verfügbaren Veröffentlichungen, um einen jeweils veröffentlichten Wert und seine Unsicherheit - auf die kombinierte Standardunsicherheit zurückgeführt - zu berücksichtigen oder auszuschließen.
- Die Bestimmung eines empfohlenen Wertes, der entweder das gewichtete oder das ungewichtete Mittel der veröffentlichten Werte ist. Die Entscheidung wird nach der Prüfung des reduzierten Chi-Quadrat-Werts getroffen. Im Falle des gewichteten Mittels wird das Gewicht jedes Einzelwerts auf 50 % begrenzt. Die Unsicherheit, als u_c bezeichnet, ist der größere Wert der inneren oder äußeren Unsicherheit. Für einen diskrepanten Datensatz kann sie so vergrößert werden, daß der genaueste Einzelwert in der Unsicherheit mit eingeschlossen ist.

Für einige Anwendungen ist es notwendig, eine vergrößerte Unsicherheit, als U bezeichnet, wie folgt zu definieren:

$$U(y) = k \times u_c(y) \quad \text{wo } k \text{ der Erweiterungsfaktor ist.}$$

Für die vorliegende Veröffentlichung ist die erweiterte Unsicherheit mit $k = 1$ berechnet.

Die Werte der Unsicherheit beziehen sich auf die letzten Stellen, d. h.:

9,230 (11) bedeutet $9,230 \pm 0,011$ und

9,2 (11) bedeutet $9,2 \pm 1,1$

Wenn ein Wert ohne Unsicherheit angegeben ist, bedeutet das, daß dieser Wert als fragwürdig zu betrachten ist. Er wird zur Information mitgeteilt und ist oft abgeschätzt aus dem Zerfallsschema im Sinne „in der Größenordnung von“.

Informationen über die Evaluationsprozedur können aus den Referenzen [85Zi, 96He, 99In] oder direkt von den Autoren bezogen werden.

Die Bedeutung der evaluierten Daten kann aus Ref. [99In] entnommen werden.

NUMERIERUNG

Die Kernniveaus werden willkürlich numeriert von 0 für den Grundzustand bis zu n für das n-te angeregte Niveau. Alle Übergänge werden durch ihr Ausgangs- und Endniveau gekennzeichnet. Für Übergänge mit geringen Wahrscheinlichkeiten, die nicht im Zerfallsschema gezeigt werden können, werden als Ausgangs- und Endniveau (-1, n) angegeben.

Für die 511 keV-Gamma-Emission, die dem Beta Plus-Zerfall folgt, ist die angenommene Numerierung (-1, -1).

EINHEITEN

Die empfohlenen Werte sind ausgedrückt:

- für Halbwertszeiten:

. in Sekunden für $T_{1/2} \leq 60$ Sekunden	s
. in Minuten für $T_{1/2} > 60$ Sekunden	min
. in Stunden für $T_{1/2} > 60$ Minuten	h
. in Tagen für $T_{1/2} > 24$ Stunden	d
. in Jahren für $T_{1/2} > 365$ Tage	a

$$1 \text{ a} = 365,242\,198 \text{ d} = 31\,556\,926 \text{ s}$$

- für Übergangswahrscheinlichkeiten und die Anzahl der emittierten Teilchen werden Werte angegeben, die sich auf 100 Zerfälle beziehen.

- die Werte der Energien sind in keV ausgedrückt.

HINWEIS

Dieses Dokument wurde im Jahre 2008 erstellt. Alle späteren Fassungen oder neueren Evaluationen können vom Leser unter

<http://www.nucleide.org/NucData.htm>

<http://www1.bipm.org/fr/publications/monographie-ri-5.html>

abgerufen werden.

ТАБЛИЦА РАДИОНУКЛИДОВ

ВВЕДЕНИЕ

Оценка данных распада для Table de Radionucléides, BNM – LNHB/CEA, была начата в 1974 г. и продолжалась до 1987 г. К тому времени были опубликованы четыре тома [87Ta] и затем, в 1999 г., был опубликован пятый том, содержащий ревизованные оценки для 30 выбранных радионуклидов [99Be]. Эта работа была продолжена, и три тома были опубликованы как *Monographie BIPM-5* [04Be, 06Be].

В дополнение к LNHB была развита компьютерная форма Table de Radionucléides (программа NUCLEIDE) с тем, чтобы обеспечить более простое обновление и дополнение данных и, очевидно, также с целью предложить пользователю более легкий доступ к ядерным и атомным данным распада путем "нажатия кнопки".

Цель настоящего издания - дать рекомендованные данные для нуклидов, представляющих специфический интерес для метрологии или практических приложений, таких как ядерная медицина, мониторинг, реакторная защита и др.

Первичные рекомендованные данные включают периоды полураспада, виды распада, характеристики X- и гамма-излучений, электронных излучений, альфа- и бета-переходов и излучений и погрешности величин этих характеристик. В книге дан полный список литературы, использованной для оценок.

Для того чтобы обновить данные по нуклидам, уже имеющимся в Table de Radionucleides, и добавить новые оценки, Национальная лаборатория им. Анри Беккереля (LNHB, Франция) и Физико-Технический Институт (PTB, Германия) заключили кооперативное соглашение. К ним затем присоединились Национальная лаборатория прикладных и экологических исследований Айдахо (INEEL, США), Лоуренсовская Национальная Лаборатория Беркли (LBNL, США) и Радиевый институт им. В.Г. Хлопина (KRI, Россия). Это международное сотрудничество основано на неформальном соглашении. Первоначальная работа состояла в обсуждении и принятии согласованной методологии, которая должна быть использована в этих оценках. Данные и связанные с ними погрешности были оценены с использованием всех имеющихся в распоряжении результатов экспериментов и с учетом теоретических рассмотрений.

Настоящий том представляет собой четвёртый выпуск *Monographie BIPM-5*.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ

Основные шаги для оценки данных и их погрешностей следующие:

- критический анализ всех имеющихся оригинальных публикаций, чтобы принять или отвергнуть данное значение и его погрешность, приведенную к комбинированному стандартному отклонению;
- определение лучшего значения, которое является взвешенным или невзвешенным средним сохраненных величин; выбор взвешенного или невзвешенного среднего определяется анализом величины χ^2 . В случае среднего взвешенного вес каждого оригинального результата ограничивается 50 %. В качестве итоговой погрешности (u_c) принимается большая из двух погрешностей среднего взвешенного: внутренней и внешней. Для расходящегося набора данных она может быть расширена, чтобы перекрыть самое точное входное значение.

Для некоторых применений может оказаться необходимым расширенная погрешность (U), выраженная как: $U(y) = k \times u_c(y)$, где k - коэффициент перекрытия. Для этой публикации принято $k = 1$.

Значение погрешности, в скобках, приводится в единицах последней значащей цифры, т.е.:

9,230 (11) означает $9,230 \pm 0,011$ и

9,2 (11) $9,2 \pm 1,1$

Если значение величины дается без погрешности, она считается сомнительной и приводится для информации. Такие величины часто оценивались из схемы распада под рубрикой "порядка".

Информацию о процедурах оценки можно получить из публикаций [85Zr, 96He, 99In] или непосредственно от авторов.

Информация о смысле физических величин может быть получена из [99In].

НУМЕРАЦИЯ

Ядерные уровни произвольно пронумерованы от 0 для основного состояния до n для n -ого возбужденного уровня. Все переходы обозначаются по их начальному и конечному уровням.

Для слабых переходов, не показанных стрелкой в схеме распада, начальный и конечный уровни обозначаются как (-1, n).

Для гамма-излучения с энергией 511 кэВ, которое следует за бета-плюс распадом, принято обозначение (-1, -1).

ЕДИНИЦЫ

Рекомендованные значения выражены:

- для периодов полураспада:
 - в секундах для $T_{1/2} \leq 60$ секунд s
 - в минутах для $T_{1/2} > 60$ секунд min
 - в часах для $T_{1/2} > 60$ минут h
 - в сутках для $T_{1/2} > 24$ часов d
 - в годах для $T_{1/2} > 365$ суток a

1 год = 365,242 198 суток = 31 556 926 секунд

- для вероятностей переходов и числа испускаемых частиц значения даны на 100 распадов;
- для энергий значения выражены в килоэлектронвольтах (keV).

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот выпуск подготовлен в 2008 г. Новые оценки и обновленные результаты можно найти на сайте:

<http://www.nucleide.org/NucData.htm>

<http://www1.bipm.org/fr/publications/monographie-ri-5.html>

TABLA DE RADIONUCLEIDOS

INTRODUCCION

El Laboratorio Nacional Henri Becquerel (LNHB) inició en 1974 el estudio de datos nucleares y atómicos que caracterizan la desintegración de radionucleidos. Esas evaluaciones han permitido la publicación de cuatro volúmenes de la Tabla de Radionucleidos [87Ta, 99Be]. Este nuevo volumen es el siguiente en la continuación del estudio precedente *Monographie BIPM-5* [04Be, 06Be].

Para facilitar la corrección de nueva información y mejorar la comodidad de consulta a los lectores, el LNHB a creado una base de datos informatizada. El programa NUCLEIDE permite el acceso a la Tabla de Radionucleidos con la ayuda de menús en cascada disponibles con un simple « clic ».

El objetivo de la Tabla de Radionucleidos es el de proporcionar información sobre un número limitado de radionucleidos utilizados en el campo de la metrología o en otras disciplinas (medicina nuclear, medio ambiente, ciclo del combustible, etc.)

Los datos recomendados incluyen : el período de semidesintegración, los modos de desintegración, las emisiones α , β , γ , X y de electrones atómicos asociados a las mismas.

Con el propósito de actualizar y agregar nuevas evaluaciones rápidamente el *Laboratoire National Henri Becquerel* (LNHB, Francia) y el *Physikalisch-Technische Bundesanstalt* (PTB , Alemania) establecieron un acuerdo de colaboración. Posteriormente se unieron el *Idaho National Engineering & Environmental Laboratory* (INEEL, USA), *Lawrence Berkeley National Laboratory* LBNL, USA) y *Khoplin Radium Institute* (KRI, Rusia). El primer trabajo de esta colaboración internacional fue el de establecer el método y las reglas comunes de evaluación. Las evaluaciones proponen valores recomendados e incertidumbres asociadas. Éstos valores han sido evaluados a partir de datos experimentales. En su ausencia, los valores se obtienen por cálculos teóricos. Todas las referencias utilizadas para la evaluación de un radionucleido se citan al final de cada capítulo.

VALORES RECOMENDADOS E INCERTIDUMBRES

Las principales etapas para evaluar datos con sus incertidumbres son:

- Un análisis crítico de todas las publicaciones disponibles con el fin de obtener un valor con su incertidumbre, considerada como incertidumbre típica combinada.
- La determinación de un valor recomendado que es, según el caso, una media simple o ponderada de valores obtenidos de publicaciones. Ésto se decide tras el chi-cuadrado reducido. En el caso de una media ponderada para conjuntos de valores discrepantes, el peso estadístico relativo de cada valor es limitado al 50 %. La incertidumbre, u_c , es el mayor de los valores de las incertidumbres interna o externa. En el caso de conjuntos de valores discrepantes, este valor puede ser extendido con el fin de incluir el valor experimental más preciso.

Para ciertas aplicaciones, es necesario definir una incertidumbre expandida, llamada U :

$$U(y) = k \times u_c(y) \quad \text{donde } k \text{ es el factor de cobertura.}$$

El valor de k utilizado en esta publicación es : $k = 1$.

Los valores de incertidumbres indicados entre paréntesis corresponden a las últimas cifras significativas, por ejemplo :

9,230 (11) significa $9,230 \pm 0,011$ y

9,2 (11) significa $9,2 \pm 1,1$

Valores dados sin incertidumbres se consideran dudosos (usualmente se presentan como valores aproximados, y a menudo estimados a partir de los esquemas de desintegración).

Para más información sobre las técnicas de evaluación consultar [85Zi], [96He], [99In] o directamente con el autor.

NUMERACION

Los niveles de un núcleo están arbitrariamente numerados desde “0” (para el nivel fundamental), hasta “ n ” para el enésimo nivel excitado. Las transiciones se representan por sus niveles inicial y final.

En el caso de una transición débil e imposible de situar en el esquema de desintegración, el nivel inicial y el final están designados con la siguiente notación : (-1, n).

En el caso de una emisión γ de 511 keV que sigue a una desintegración β^+ , la notación adoptada es : (-1, -1).

UNIDADES

Los valores recomendados se dan:

- para los períodos de semidesintegración :

	Símbolo
. en segundos para $T_{1/2} \leq 60$ segundos	s
. en minutos para $T_{1/2} > 60$ segundos	min
. en horas para $T_{1/2} > 60$ minutos	h
. en días para $T_{1/2} > 24$ horas	d
. en años para $T_{1/2} > 365$ días	a

1 año = 365,242 198 días = 31 556 926 segundos ;

- para las probabilidades de transición y número de partículas emitidas, los valores se dan por 100 desintegraciones ;
- para las energías, los valores se expresan en keV.

ADVERTENCIA

Este documento ha sido impreso en el 2008. Para obtener todas las nuevas evaluaciones actualizadas ulteriormente, el lector deberá referirse a los documentos disponibles en :

<http://www.nucleide.org/NucData.htm>
<http://www1.bipm.org/fr/publications/monographie-ri-5.html>

RÉFÉRENCES

REFERENCES

REFERENZEN

REFERENCIAS

[87Ta] **Table de Radionucléides**, F. Lagoutine, N. Coursol, J. Legrand. ISBN 2-7272-0078-1 (LMRI, 1982-1987).

[85Zi] **W.L. Zijp**, Netherland Energy Research Foundation, ECN, Petten, The Netherlands, Rep. ECN-179.

[96He] **R.G. Helmer**, Proceedings of the Int. Symp. "Advances in alpha-, beta- and gamma-ray Spectrometry", St. Petersburg, September 1996, p. 71.

[96Be] **M.-M. Bé, B. Duchemin and J. Lamé**. Nucl. Instrum. Methods A369 (1996) 523 and Bulletin du Bureau National de Métrologie 110 (1998).

[99In] **Table de Radionucléides. Introduction, nouvelle version**. Introduction, revised version. Einleitung, überarbeitete Fassung. ISBN 2-7272-0201-6, BNM-CEA/LNHB BP 52, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France.

[99Be] **M.-M. Bé, E. Browne, V. Chechev, R.G. Helmer, E. Schönfeld**. Table de Radionucléides, ISBN 2-7272-0200-8 and ISBN 2-7272-0211-3 (LNHB, 1988-1999).

[04Be] **M.-M. Bé, E. Browne, V. Chechev, V. Chisté, R. Dersch, C. Dulieu, R.G. Helmer, T.D. MacMahon, A.L. Nichols, E. Schönfeld**. Table of Radionuclides, Monographie BIPM-5, ISBN 92-822-2207-7 (set) and ISBN 92-822-2205-5 (CD), CEA/BNM-LNHB, 91191 Gif-sur-Yvette, France and BIPM, Pavillon de Breteuil, 92312 Sèvres, France.

and

M.-M. Bé, E. Browne, V. Chechev, V. Chisté, R. Dersch, C. Dulieu, R.G. Helmer, N. Kuzmenco, A.L. Nichols, E. Schönfeld. NUCLEIDE, Table de Radionucléides sur CD-Rom, Version 2-2004, CEA/BNM-LNHB, 91191 Gif-sur-Yvette, France.

[06Be] **Monographie BIPM-5 – Table of Radionuclides, Volume 3**

Marie-Martine BÉ, Vanessa CHISTÉ, Christophe DULIEU, (LNHB), France ; Edgardo BROWNE, Coral BAGLIN, (LBNL), USA ; Valery CHECHEV, Nikolay KUZMENKO, (KRI), Russia ; Richard HELMER, (INEEL), USA ; Filip KONDEV, (ANL), USA ; T. Desmond MACMAHON, (NPL), U.K. ; Kyung Beom LEE, (KRISS), South Korea.

Table of Radionuclides, Monographie BIPM-5, ISSN 92-822-2204-7 (set), ISBN 92-822-2218-7 (Vol. 3) and ISBN 92-822-2219-5 (CD), CEA/LNE-LNHB, 91191 Gif-sur-Yvette, France and BIPM, Pavillon de Breteuil, 92312 Sèvres, France.

AUTEURS POUR CORRESPONDANCE

AUTHOR'S MAIL ADDRESSES

ADRESSEN DER AUTOREN

AUTORES PARA CORRESPONDENCIA

Toutes demandes de renseignements concernant les données recommandées et la façon dont elles ont été établies doivent être adressées directement aux auteurs des évaluations.

Information on the data and the evaluation methods is available from the authors listed below.

Informationen über die Daten und Evaluationsprozeduren können bei den im folgenden zusammengestellten Autoren angefordert werden:

Todos los pedidos de información relativos a datos recomendados y la manera de establecerlos deben dirigirse directamente a los autores de las evaluaciones.

Dr. Marie-Martine Bé

CEA/LNHB- 602
91191 Gif-sur-Yvette, CEDEX, France
Tel: 33-1-69-08-46-41
Fax: 33-1-69-08-26-19
E-mail: mmbe@cea.fr

Dr. Edgardo Browne

Lawrence Berkeley National Laboratory
MS 88RO192, Berkeley, California 94720, USA
Tel: (510) 486-7647
Fax: (510) 486-5757
E-mail: ebrowne@lbl.gov

Dr. Valery P. Chechев

V.G. Khlopin Radium Institute
28, 2nd Murinsky Ave., 194021 St. Petersburg, Russia
Tel: 007 (812) 2473706
Fax: 007 (812) 2478095
E-mail: chechev@atom.nw.ru

Dr. Vanessa Chisté

CEA/LNHB
91191 Gif-sur-Yvette, CEDEX, France
Tel: 33-1-69-08-63-07
Fax: 33-1-69-08-26-19
E-mail: vanessa.chiste@cea.fr

Dr. Filip G. Kondev

Applied Physics and Nuclear Data,
Nuclear Engineering Division
Argonne National Laboratory
9700 South Cass Ave. Argonne, IL 60439, USA
Tel: 1-(630) 252-4484
Fax: 1-(630) 252-5287
E-mail: kondev@anl.gov

Dr. Mónica Galán

CIEMAT, Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes
Avenida de la Complutense, 22
28040 Madrid, Spain
E-mail: monica.galan@ciemat.es

Dr. Andrew Pearce

National Physical Laboratory
Teddington,
Middlesex, TW11 OLM, United Kingdom
E-mail: Andy.Pearce@npl.co.uk

Dr. Aurelian Luca

IFIN-HH/Radionuclide Metrology Laboratory
407 Atomistilor street
PO Box MG-6
077125 Mahurele, Ilfov County, Romania
E-mail : aluca@ifin.nipne.ro

Dr. Xialong Huang

China Nuclear Data center
PO Box 275 (41)
Beijing, China
E-mail : huang@ciae.ac.cn

Table of contents

(Volumes 3 & 4)

List of radionuclides included in:

Volume 4 – A = 133 to 252

Mass	Nuclide	Page
133	I-133	1
133	Xe-133	11
133	Xe-133m	17
135	Xe-135m	23
139	Ce-139	31
206	Tl-206	39
210	Tl-210	45
210	Pb-210	51
210	Bi-210	59
210	Po-210	65
213	Po-213	71
214	Pb-214	75
214	Bi-214	83
214	Po-214	111
217	Rn-217	117
218	Po-218	121
218	At-218	125
218	Rn-218	129
221	Fr-221	135
222	Rn-222	143
226	Ra-226*	149
227	Ac-227	155
232	U-232	169
236	U-236	177
237	Np-237	183
238	Np-238	195
239	U-239	205
239	Np-239	221
239	Pu-239	231
241	Pu-241	259
246	Cm-246	269
252	Cf-252	277

Volume 3 – A = 3 to 244

Mass	Nuclide	Page
3	H-3	1
55	Fe-55	5
56	Co-56	11
60	Co-60	23
63	Ni-63	29
65	Zn-65	33
79	Se-79	39
90	Sr-90	43
90	Y-90	47
90	Y-90m	53
108	Ag108	59
108	Ag-108m	67
111	In-111	75
125	Sb-125*	81
137	Cs-137	91
153	Sm-153*	99
159	Gd-159	109
203	Pb-203	115
233	Pa-233	123
233	Th-233	133
234	U-234	147
236	Np-236	155
236	Np-236m	163
237	U-237	169
238	U-238	177
242	Cm-242	185
243	Am-243	195
244	Cm-244	203

* : updated evaluations

* : updated evaluations

Table of contents

(Volumes 1 & 2)

List of radionuclides included in:

Volume 2 – A = 152 to 242

Mass	Nuclide	Page
152	Eu-152	1
153	Gd-153	21
153	Sm-153	27
154	Eu-154	37
155	Eu-155	59
166	Ho-166	67
166	Ho-166m	75
169	Yb-169	87
170	Tm-170	99
177	Lu-177	107
186	Re-186	113
198	Au-198	121
201	Tl-201	129
203	Hg-203	135
204	Tl-204	141
208	Tl-208	147
212	Bi-212	155
212	Pb-212	167
212	Po-212	173
216	Po-216	177
220	Rn-220	183
224	Ra-224	189
226	Ra-226	195
227	Th-227	201
228	Th-228	227
238	Pu-238	235
240	Pu-240	247
241	Am-241	257
242	Pu-242	277

Volume 1 – A = 7 to 140


Mass	Nuclide	Page
7	Be-7	1
11	C-11	7
13	N-13	11
15	O-15	17
18	F-18	21
24	Na-24	27
32	P-32	35
33	P-33	41
44	Sc-44	45
44	Ti-44	51
46	Sc-46	57
51	Cr-51	63
54	Mn-54	71
56	Mn-56	77
57	Co-57	83
57	Ni-57	91
59	Fe-59	99
64	Cu-64	105
66	Ga-66	113
67	Ga-67	133
85	Kr-85	141
85	Sr-85	147
88	Y-88	153
89	Sr-89	161
93	Nb-93m	167
99	Mo-99	173
99	Tc-99m	183
109	Cd-109	191
110	Ag-110	199
110	Ag-110m	207
123	I-123	219
123	Te-123m	229
125	Sb-125	235
129	I-129	243
131	I-131	249
131	Xe-131m	257
133	Ba-133	263
140	Ba-140	271
140	La-140	277

Table of contents

(Volumes 1 to 4 - All nuclides sorted by increasing atomic mass)

Mass	Nuclide	Vol.	Page	Mass	Nuclide	Vol.	Page	Mass	Nuclide	Vol.	Page
3	H-3	3	1	123	Te-123m	1	229	213	Po-213	4	71
7	Be-7	1	1	123	I-123	1	219	214	Pb-214	4	75
11	C-11	1	7	125	Sb-125	1	235	214	Bi-214	4	83
13	N-13	1	11	125	Sb-125*	3	81	214	Po-214	4	111
15	O-15	1	17	129	I-129	1	243	216	Po-216	2	177
18	F-18	1	21	131	I-131	1	249	217	Rn-217	4	117
24	Na-24	1	27	131	Xe-131m	1	257	218	Po-218	4	121
32	P-32	1	35	133	I-133	4	1	218	At-218	4	125
33	P-33	1	41	133	Xe-133	4	11	218	Rn-218	4	129
44	Sc-44	1	45	133	Xe-133m	4	17	220	Rn-220	2	183
44	Ti-44	1	51	133	Ba-133	1	263	221	Fr-221	4	135
46	Sc-46	1	57	135	Xe-135m	4	23	222	Rn-222	4	143
51	Cr-51	1	63	137	Cs-137	3	91	224	Ra-224	2	189
54	Mn-54	1	71	139	Ce-139	4	31	226	Ra-226	2	195
55	Fe-55	3	5	140	Ba-140	1	271	226	Ra-226*	4	149
56	Mn-56	1	77	140	La-140	1	277	227	Ac-227	4	155
56	Co-56	3	11	152	Eu-152	2	1	227	Th-227	2	201
57	Co-57	1	83	153	Sm-153	2	27	228	Th-228	2	227
57	Ni-57	1	91	153	Sm-153*	3	99	232	U-232	4	169
59	Fe-59	1	99	153	Gd-153	2	21	233	Th-233	3	133
60	Co-60	3	23	154	Eu-154	2	37	233	Pa-233	3	123
63	Ni-63	3	29	155	Eu-155	2	59	234	U-234	3	147
64	Cu-64	1	105	159	Gd-159	3	109	236	U-236	4	177
65	Zn-65	3	33	166	Ho-166	2	67	236	Np-236	3	155
66	Ga-66	1	113	166	Ho-166m	2	75	236	Np-236m	3	163
67	Ga-67	1	133	169	Yb-169	2	87	237	U-237	3	169
79	Se-79	3	39	170	Tm-170	2	99	237	Np-237	4	183
85	Kr-85	1	141	177	Lu-177	2	107	238	U-238	3	177
85	Sr-85	1	147	186	Re-186	2	113	238	Np-238	4	195
88	Y-88	1	153	198	Au-198	2	121	238	Pu-238	2	235
89	Sr-89	1	161	201	Tl-201	2	129	239	U-239	4	205
90	Sr-90	3	43	203	Hg-203	2	135	239	Np-239	4	221
90	Y-90	3	47	203	Pb-203	3	115	239	Pu-239	4	231
90	Y-90m	3	53	204	Tl-204	2	141	240	Pu-240	2	247
93	Nb-93m	1	167	206	Tl-206	4	39	241	Pu-241	4	259
99	Mo-99	1	173	208	Tl-208	2	147	241	Am-241	2	257
99	Tc-99m	1	183	210	Tl-210	4	45	242	Pu-242	2	277
108	Ag108	3	59	210	Pb-210	4	51	242	Cm-242	3	185
108	Ag-108m	3	67	210	Bi-210	4	59	243	Am-243	3	195
109	Cd-109	1	191	210	Po-210	4	65	244	Cm-244	3	203
110	Ag-110	1	199	212	Pb-212	2	167	246	Cm-246	4	269
110	Ag-110m	1	207	212	Bi-212	2	155	252	Cf-252	4	277
111	In-111	3	75	212	Po-212	2	173				

* : updated evaluations



1 Decay Scheme

I-133 disintegrates by beta minus emission to excited levels in Xe-133.

L' iode 133 se désexcite par émission beta moins vers les niveaux excités du xénon 133.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{133}\text{I})$:	20,87	(8)	h
$T_{1/2}(^{133}\text{Xe})$:	5,2474	(5)	d
$Q^-(^{133}\text{I})$:	1757	(4)	keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	lg ft
$\beta_{0,13}^-$	167 (4)	0,414 (15)	Allowed	6,18
$\beta_{0,12}^-$	371 (4)	1,25 (4)	Allowed	6,81
$\beta_{0,11}^-$	407 (4)	0,397 (12)	Allowed	7,44
$\beta_{0,10}^-$	459 (4)	3,75 (7)	Allowed	6,64
$\beta_{0,9}^-$	521 (4)	3,12 (6)	Allowed	6,91
$\beta_{0,8}^-$	706 (4)	0,58 (5)	Allowed	8,09
$\beta_{0,7}^-$	846 (4)	0,026 (18)	(1st) Forbidden	9,7
$\beta_{0,6}^-$	882 (4)	4,16 (13)	allowed	7,59
$\beta_{0,5}^-$	1013 (4)	1,81 (6)	Unique (th) Forbidden	8,17
$\beta_{0,3}^-$	1227 (4)	83,42 (21)	Allowed	6,81
$\beta_{0,1}^-$	1524 (4)	1,07 (6)	1st Forbidden Unique	9,92

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{4,3} (Xe)	150,382 (9)	0,029 (6)					
γ _(-1,1) (Xe)	167,97 (6)	0,078 (17)					
γ _{13,12} (Xe)	203,787 (31)	0,00432 (8)					
γ _{1,0} (Xe)	233,219 (15)	2,88 (2)	M4	6,24 (9)	2,035 (29)	0,453 (6)	8,84 (12)
γ _{10,8} (Xe)	245,837 (18)	0,035 (9)					
γ _{2,0} (Xe)	262,70 (6)	0,377 (13)	M1+E2	0,0497 (7)	0,00641 (9)	0,001300 (18)	0,0577 (8)
γ _{3,2} (Xe)	267,17 (6)	0,117 (7)					
γ _{6,3} (Xe)	345,459 (6)	0,104 (18)					
γ _{9,6} (Xe)	361,118 (7)	0,11 (4)					
γ _{8,4} (Xe)	372,143 (19)	0,009 (6)					
γ _{7,3} (Xe)	381,578 (30)	0,045 (5)					
γ _{10,7} (Xe)	386,784 (30)	0,059 (5)					
γ _{4,2} (Xe)	417,55 (6)	0,155 (10)	M1+E2	0,0139 (10)	0,001921 (27)	0,000392 (6)	0,0163 (11)
γ _{10,6} (Xe)	422,903 (7)	0,314 (10)	M1+E2	0,0128 (13)	0,00185 (3)	0,000379 (6)	0,0151 (13)
γ _{11,7} (Xe)	438,930 (34)	0,040 (5)					
γ _{5,1} (Xe)	510,531 (22)	1,81 (6)					
γ _{12,6} (Xe)	510,822 (9)	0,004 (5)					
γ _{8,3} (Xe)	522,525 (17)	0,04 (5)					
γ _{3,0} (Xe)	529,872 (3)	87,0 (2)	M1+E2	0,00691 (13)	0,000956 (14)	0,0001948 (29)	0,00810 (14)
γ _{13,8} (Xe)	537,543 (34)	0,035 (7)					
γ _{10,5} (Xe)	554,484 (17)	0,0004 (5)					
γ _{9,4} (Xe)	556,195 (10)	0,020 (3)					
γ _(-1,2) (Xe)	567,1 (4)	0,003 (3)					
γ _{10,4} (Xe)	617,98 (1)	0,542 (15)	M1+E2	0,0050 (7)	0,00066 (6)	0,000134 (12)	0,0059 (8)
γ _{7,2} (Xe)	648,75 (7)	0,056 (13)	M1	0,00510 (7)	0,000639 (9)	0,0001292 (18)	0,00590 (8)
γ _{11,4} (Xe)	670,126 (19)	0,042 (6)					
γ _{13,7} (Xe)	678,490 (42)	0,022 (7)					
γ _{4,0} (Xe)	680,254 (9)	0,648 (19)	M1	0,00460 (6)	0,000570 (8)	0,0001152 (16)	0,00527 (7)
γ _{9,3} (Xe)	706,577 (6)	1,496 (40)	M1+E2	0,0036 (6)	0,00047 (5)	0,000095 (10)	0,0042 (6)
γ _{10,3} (Xe)	768,362 (6)	0,459 (15)	M1+E2	0,00318 (22)	0,000402 (22)	0,000081 (4)	0,00368 (24)
γ _{8,2} (Xe)	789,70 (6)	0,050 (4)					
γ _{11,3} (Xe)	820,508 (17)	0,154 (6)	M1+E2	0,0026 (3)	0,00033 (3)	0,000068 (6)	0,0031 (4)
γ _{12,3} (Xe)	856,281 (9)	1,233 (40)	M1+E2	0,00202 (3)	0,000263 (4)	0,0000533 (8)	0,00235 (3)
γ _{6,0} (Xe)	875,331 (5)	4,48 (12)	E2+M3	0,001876 (26)	0,000245 (3)	0,0000496 (7)	0,00218 (3)
γ _{13,4} (Xe)	909,686 (31)	0,213 (9)	M1+E2	0,00222 (4)	0,000277 (5)	0,0000559 (9)	0,00257 (4)
γ _{7,0} (Xe)	911,45 (3)	0,046 (6)					
γ _(-1,3) (Xe)	1018,1 (5)	0,0060 (26)					
γ _{10,2} (Xe)	1035,53 (6)	0,0086 (18)					
γ _{8,0} (Xe)	1052,397 (17)	0,551 (16)					
γ _{13,3} (Xe)	1060,068 (30)	0,137 (7)	M1+E2	0,00143 (20)	0,000179 (22)	0,000036 (4)	0,00165 (23)
γ _{11,2} (Xe)	1087,68 (6)	0,0121 (18)					
γ _{9,0} (Xe)	1236,449 (5)	1,49 (4)					
γ _{10,0} (Xe)	1298,234 (5)	2,33 (7)	M1+E2	0,000822 (12)	0,0001026 (15)	0,00002070 (29)	0,000972 (14)
γ _{13,2} (Xe)	1327,24 (7)	0,00022 (22)					
γ _{11,0} (Xe)	1350,380 (17)	0,148 (5)	M1+E2	0,00085 (10)	0,000104 (12)	0,0000211 (23)	0,00101 (12)
γ _{12,0} (Xe)	1386,153 (8)	0,0086 (26)	[E2]				
γ _{13,0} (Xe)	1589,94 (3)	0,0029 (4)					

3 Atomic Data

3.1 Xe

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,888 \quad (5) \\ \bar{\omega}_L &: 0,097 \quad (5) \\ n_{KL} &: 0,902 \quad (4)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	29,459	53,98
K α_1	29,779	100
K β_3	33,562	}
K β_1	33,625	}
K β_5''	33,881	} 28,99
K β_2	34,415	}
K β_4	34,496	} 6,84
KO _{2,3}	34,552	}
X _L		
L ℓ	3,6378	
L α	4,0977 – 4,1103	
L η	3,9576	
L β	4,4176 – 4,7758	
L γ	4,895 – 5,296	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	23,512 – 24,842	100
KLX	27,897 – 29,770	46,5
KXY	32,27 – 34,54	5,41
Auger L	2,4 – 5,2	

4 Electron Emissions

		Energy keV		Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Xe)	2,4	-	5,2
				0,677 (4)
e _{AK}	(Xe)			0,072 (4)
	KLL	23,512	-	24,842
	KLX	27,897	-	29,770
	KXY	32,27	-	34,54
				}
ec _{1,0} T	(Xe)	198,655	-	233,207
ec _{1,0} K	(Xe)	198,655		(15)
ec _{1,0} L	(Xe)	227,766	-	228,437
ec _{1,0} M	(Xe)	232,070	-	232,542
ec _{3,0} K	(Xe)	495,331		(3)
ec _{3,0} L	(Xe)	524,419	-	525,090
				0,596 (11)
				0,083 (12)
$\beta_{0,13}^-$	max:	167	(4)	0,414 (15)
$\beta_{0,13}^-$	avg:	45,1	(12)	
$\beta_{0,12}^-$	max:	371	(4)	1,25 (4)
$\beta_{0,12}^-$	avg:	108,8	(14)	
$\beta_{0,11}^-$	max:	407	(4)	0,397 (12)
$\beta_{0,11}^-$	avg:	120,8	(14)	
$\beta_{0,10}^-$	max:	459	(4)	3,75 (7)
$\beta_{0,10}^-$	avg:	138,7	(14)	
$\beta_{0,9}^-$	max:	521	(4)	3,12 (6)
$\beta_{0,9}^-$	avg:	160,4	(15)	
$\beta_{0,8}^-$	max:	706	(4)	0,58 (5)
$\beta_{0,8}^-$	avg:	228,4	(16)	
$\beta_{0,7}^-$	max:	846	(4)	0,026 (18)
$\beta_{0,7}^-$	avg:	283,1	(16)	
$\beta_{0,6}^-$	max:	882	(4)	4,16 (13)
$\beta_{0,6}^-$	avg:	297,4	(16)	
$\beta_{0,5}^-$	max:	1013	(4)	1,81 (6)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	350,5	(17)	
$\beta_{0,3}^-$	max:	1227	(4)	83,42 (21)
$\beta_{0,3}^-$	avg:	439,4	(17)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	1524	(4)	1,07 (6)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	572,0	(17)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Xe)	3,6378 — 5,296	0,0724 (14)	
XK α_2	(Xe)	29,459	0,163 (4)	{ K α
XK α_1	(Xe)	29,779	0,303 (6)	}
XK β_3	(Xe)	33,562	}	
XK β_1	(Xe)	33,625	0,0877 (19)	K' β_1
XK β_5''	(Xe)	33,881	}	
XK β_2	(Xe)	34,415	}	
XK β_4	(Xe)	34,496	0,0207 (7)	K' β_2
XKO _{2,3}	(Xe)	34,552	}	

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{4,3}(\text{Xe})$	150,382 (9)	0,029 (6)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Xe})$	167,97 (6)	0,078 (17)
$\gamma_{13,12}(\text{Xe})$	203,787 (31)	0,00432 (8)
$\gamma_{1,0}(\text{Xe})$	233,219 (15)	0,293 (4)
$\gamma_{10,8}(\text{Xe})$	245,837 (18)	0,035 (9)
$\gamma_{2,0}(\text{Xe})$	262,70 (6)	0,356 (12)
$\gamma_{3,2}(\text{Xe})$	267,17 (6)	0,117 (7)
$\gamma_{6,3}(\text{Xe})$	345,459 (6)	0,104 (18)
$\gamma_{9,6}(\text{Xe})$	361,118 (7)	0,11 (4)
$\gamma_{8,4}(\text{Xe})$	372,143 (19)	0,009 (6)
$\gamma_{7,3}(\text{Xe})$	381,578 (30)	0,045 (5)
$\gamma_{10,7}(\text{Xe})$	386,784 (30)	0,059 (5)
$\gamma_{4,2}(\text{Xe})$	417,55 (6)	0,153 (10)
$\gamma_{10,6}(\text{Xe})$	422,903 (7)	0,309 (10)
$\gamma_{11,7}(\text{Xe})$	438,930 (34)	0,040 (5)
$\gamma_{5,1}(\text{Xe})$	510,530 (22)	1,81 (6)
$\gamma_{12,6}(\text{Xe})$	510,821 (9)	0,004 (5)
$\gamma_{8,3}(\text{Xe})$	522,524 (17)	0,04 (5)
$\gamma_{3,0}(\text{Xe})$	529,8709 (30)	86,3 (2)
$\gamma_{13,8}(\text{Xe})$	537,542 (34)	0,035 (7)
$\gamma_{10,5}(\text{Xe})$	554,483 (17)	0,0004 (5)
$\gamma_{9,4}(\text{Xe})$	556,194 (10)	0,020 (3)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Xe})$	567,1 (4)	0,003 (3)
$\gamma_{10,4}(\text{Xe})$	617,978 (10)	0,539 (15)
$\gamma_{7,2}(\text{Xe})$	648,75 (7)	0,056 (13)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{11,4}(\text{Xe})$	670,124 (19)	0,042 (6)
$\gamma_{13,7}(\text{Xe})$	678,488 (42)	0,022 (7)
$\gamma_{4,0}(\text{Xe})$	680,252 (9)	0,645 (19)
$\gamma_{9,3}(\text{Xe})$	706,575 (6)	1,49 (4)
$\gamma_{10,3}(\text{Xe})$	768,360 (6)	0,457 (15)
$\gamma_{8,2}(\text{Xe})$	789,69 (6)	0,050 (4)
$\gamma_{11,3}(\text{Xe})$	820,505 (17)	0,154 (6)
$\gamma_{12,3}(\text{Xe})$	856,278 (9)	1,23 (4)
$\gamma_{6,0}(\text{Xe})$	875,328 (5)	4,47 (12)
$\gamma_{13,4}(\text{Xe})$	909,683 (31)	0,212 (9)
$\gamma_{7,0}(\text{Xe})$	911,447 (30)	0,046 (6)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Xe})$	1018,1 (5)	0,0060 (26)
$\gamma_{10,2}(\text{Xe})$	1035,53 (6)	0,0086 (18)
$\gamma_{8,0}(\text{Xe})$	1052,393 (17)	0,551 (16)
$\gamma_{13,3}(\text{Xe})$	1060,063	0,137 (7)
$\gamma_{11,2}(\text{Xe})$	1087,67 (6)	0,0121 (18)
$\gamma_{9,0}(\text{Xe})$	1236,443 (5)	1,49 (4)
$\gamma_{10,0}(\text{Xe})$	1298,227 (5)	2,33 (7)
$\gamma_{13,2}(\text{Xe})$	1327,23 (7)	0,00022 (22)
$\gamma_{11,0}(\text{Xe})$	1350,373 (17)	0,148 (5)
$\gamma_{12,0}(\text{Xe})$	1386,145 (8)	0,0086 (26)
$\gamma_{13,0}(\text{Xe})$	1589,93 (3)	0,0029 (4)

6 Main Production Modes


Te – 133(β^-) I – 133


$\left\{ \begin{array}{l} \text{Fissionproduct} \\ \text{Possible impurities : I – 131, I – 132, I – 134, I – 135} \end{array} \right.$


7 References

- S.KATCOFF, W.RUBINSON. Phys. Rev. 91 (1953) 1458
(Half-life)
- A.WAHL. Phys. Rev. 99 (1955) 730
(Half-life)
- G.HOLM, H. RYDE. Ark. Fysik 15 (1959) 387
(Gamma-ray emission probabilities)
- E.EICHLER, J.W.CHASE, N.R.JOHNSON, G.D.O'KELLEY. Bull. Am .Phys. Soc. 5 (1960) 448
(Beta emission energies)
- G.ANDERSON, G.RUDSTAM, G.SÖRENSEN. Ark. Fysik 28 (1965) 37
(Half-life)
- E.EICHLER, J.W.CHASE, N.R.JOHNSON, G.D.O'KELLEY. Phys. Rev. 146 (1966) 899
(Half-life, Beta emission probabilities)
- S.A.REYNOLDS, J.F.EMERY, E.I.WYATT. Nucl. Sci. Eng. 32 (1968) 46
(Half-life)
- R.N.SAXENA, H.D.SHARMA. Nucl. Phys. A171 (1971) 593
(Beta emission probabilities, Gamma-ray emission probabilities)
- E.ACHTERBERG, F.C.IGLESIAS, A.E.JECH, J.A.MORAGUES, D.OTERO, M.L.PEREZ, N.PROTO, J.J.ROSSI, W.SCHEUER, J.F.SUAREZ. Phys. Rev. C5 (1972) 1759
(K ICC, Gamma ray energies, Multipolarities)

- R.B.BEGZHANOV, O.SH.KOBILOV, KH.S.SABIROV, S.SK.SALIMOV, U.KH.KHUDAIBERGENOV. Bull. Acad. Sci. USSR 36 (1972) 2190
(Multipolarities)
- K.S.KRANE, C.E.OLSEN, W.A.STEYERT. Phys. Rev. C5 (1972) 1671
(Mixing ratio, Multipolarities)
- B.K.S.KOENE, H.LIGHTART, H.POSTMA. Nucl. Phys. A235 (1974) 267
(Mixing ratio, Multipolarities)
- R.A.MEYER, F.F.MOMYER, J.H.LANDRUM, E.A.HENRY, R.P.YAFFE, W.B.WALTERS. Phys. Rev. C14 (1976) 1152
(Beta emission probabilities, Gamma-ray emission probabilities, Decay scheme)
- G.H.FULLER. J. Phys. Chem. Ref. Data 5 (1976) 835
(Spin and Parity)
- K.S.KRANE. At. Data Nucl. Data Tables 42 (1977) 363
(Mixing ratio)
- T.LÖNNROTH, J.KUMPULAINEN, C.TUOKKO. Physica Scripta 27 (1983) 228
(Spin and Parity)
- P.RAGHAVAN. At. Data Nucl. Data Tables 42 (1989) 189
(Nuclear moments)
- S.RAB. Nucl. Data Sheets 75 (1995) 527
(Decay scheme)
- E.SCHÖNFELD, H.JASSEN. Nucl. Instrum. Methods A369 (1996) 527
(Atomic Data)
- I.M.BAND, M.B.TRZHASKOVSKAYA, C.W.Jr.NESTOR. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q)







1 Decay Scheme

Xe-133 disintegrates by beta minus emission to the excited levels of Cs-133.
Le xénon 133 se désintègre vers des niveaux excités du césium 133.

2 Nuclear Data

$$\begin{aligned} T_{1/2}(^{133}\text{Xe}) &: 5,2474 \quad (5) \quad \text{d} \\ Q^-(^{133}\text{Xe}) &: 427,4 \quad (24) \quad \text{keV} \end{aligned}$$

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,3}^-$	43,6 (24)	0,0092 (9)	Allowed	6,84
$\beta_{0,2}^-$	266,8 (24)	0,87 (8)	Allowed	7,31
$\beta_{0,1}^-$	346,4 (24)	99,12 (8)	Allowed	5,62

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{2,1}(\text{Cs})$	79,6142 (12)	0,78 (8)	M1+1,54%E2	1,495 (21)	0,217 (6)	0,0447 (12)	1,768 (26)
$\gamma_{1,0}(\text{Cs})$	80,9979 (11)	99,8 (12)	M1+E2	1,429 (20)	0,214 (3)	0,0442 (6)	1,698 (24)
$\gamma_{2,0}(\text{Cs})$	160,6120 (16)	0,088 (10)	M1+E2	0,234 (4)	0,0471 (13)	0,0099 (3)	0,294 (5)
$\gamma_{3,2}(\text{Cs})$	223,2368 (13)	0,00019 (7)	M1+E2	0,0836 (12)	0,01103 (16)	0,00226 (3)	0,0975 (14)
$\gamma_{3,1}(\text{Cs})$	302,8508 (5)	0,0061 (8)	M1+0,05%E2	0,0373 (5)	0,00484 (7)	0,000988 (14)	0,0434 (6)
$\gamma_{3,0}(\text{Cs})$	383,8485 (12)	0,0029 (4)	E2	0,01684 (24)	0,00269 (4)	0,000559 (8)	0,0202 (3)

3 Atomic Data

3.1 Cs

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,894 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,104 \quad (5) \\ n_{KL} &: 0,895 \quad (4)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	30,6254	54,13
K α_1	30,9731	100
K β_3	34,9197	}
K β_1	34,9873	}
K β_5''	35,252	}
K β_2	35,822	}
K β_4	35,907	}
KO _{2,3}	35,972	}
X _L		
L ℓ	3,795	
L α	4,273 – 4,287	
L η	4,142	
L β	4,62 – 4,988	
L γ	5,131 – 5,553	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	24,411 – 25,804	100
KLX	28,991 – 30,961	47,2
KXY	33,55 – 35,96	5,56
Auger L	2,5 – 5,6	

4 Electron Emissions

		Energy keV		Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Cs)	2,5	-	5,6
e _{AK}	(Cs)			49,9 (3)
	KLL	24,411	-	25,804
	KLX	28,991	-	30,961
	KXY	33,55	-	35,96
ec _{2,1} K	(Cs)	43,6295	(19)	0,419 (45)
ec _{1,0} T	(Cs)	45,0133 - 80,9865		62,8 (10)
ec _{1,0} K	(Cs)	45,0133	(11)	52,9 (9)
ec _{2,1} L	(Cs)	73,8998 - 74,6022		0,061 (7)
ec _{1,0} L	(Cs)	75,2836 - 75,9860		7,92 (13)
ec _{1,0} M	(Cs)	79,7808 - 80,2724		1,635 (26)
ec _{1,0} N	(Cs)	80,7671 - 80,9214		0,3441 (46)
$\beta_{0,3}^-$	max:	43,6	(24)	0,0092 (9)
$\beta_{0,3}^-$	avg:	11,1	(7)	
$\beta_{0,2}^-$	max:	266,8	(24)	0,87 (8)
$\beta_{0,2}^-$	avg:	75,2	(8)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	346,4	(24)	99,12 (8)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	100,6	(8)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Cs)	3,795 — 5,553	5,79 (11)
XK α_2	(Cs)	30,6254	13,54 (24) } K α
XK α_1	(Cs)	30,9731	25,0 (5) }
XK β_3	(Cs)	34,9197	}
XK β_1	(Cs)	34,9873	}
XK β_5''	(Cs)	35,252	}
XK β_2	(Cs)	35,822	}
XK β_4	(Cs)	35,907	}
XKO _{2,3}	(Cs)	35,972	1,78 (6) K' β_2

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{2,1}(\text{Cs})$	79,6142 (12)	0,28 (3)
$\gamma_{1,0}(\text{Cs})$	80,9979 (11)	37,0 (3)
$\gamma_{2,0}(\text{Cs})$	160,6120 (16)	0,068 (8)
$\gamma_{3,2}(\text{Cs})$	223,2368 (13)	0,00017 (6)
$\gamma_{3,1}(\text{Cs})$	302,8508 (5)	0,0058 (8)
$\gamma_{3,0}(\text{Cs})$	383,8485 (12)	0,0028 (4)


6 Main Production Modes

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fission product()} \\ \text{Possible impurities : Xe - 129, Xe - 131, Xe - 135 } \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Te - 130}(\alpha, n)\text{Xe - 133} \\ \text{Possible impurities : Xe - 125, Xe - 127, Xe - 135 } \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Xe - 132}(\text{n},\gamma)\text{Xe - 133} \quad \sigma : 0,4 \text{ barns} \\ \text{Cs - 133}(\text{n},\text{p})\text{Xe - 133} \\ \text{Possible impurities : Xe - 135, Xe - 137 } \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ba - 136}(\text{n},\alpha)\text{Xe - 133} \\ \text{Possible impurities : Xe - 135, Xe - 137 } \end{array} \right.$

7 References

- C.S.WU. Phys. Rev. 58 (1940) 926
(Production modes)
- E.P.CLANCY. Phys. Rev. 60 (1941) 87
(Production modes)
- C.S.WU, E.SEGRÉ. Phys. Rev. 67 (1945) 142
(Production modes)
- J.MACNAMARA, C.B.COLLINS, H.G.THODE. Phys. Rev. 78 (1950) 129
(Half-life)
- I. BERGSTROM. Ark. Fysik 5 (1952) 191
(Gamma-ray emission probabilities, Beta emission probabilities)
- R.L. GRAHAM, R.E.BELL. Can. J. Phys. 31 (1953) 377
(Half-life level, K ICC, K/L ratio)
- I. BERGSTROM, S.THULIN, A.H.WAPSTRA, B.ASTRÖM. Ark. Fysik 7 (1954) 255
(K ICC, K/L ratio)
- P.LEHMAN, J.MILLER. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 240 (1955) 1525
(Half-life level)
- T.ALVAGER, B.JOHANSSON, W.ZUK. Ark. Fysik 14 (1958) 373
(Half-life level)
- E.BODENSTEDT, H.J.KORNER, E.MATTHIAS. Nucl. Phys. 11 (1959) 584
(Half-life level)
- P.ERMAN, Z.SUJKOVSKI. Ark. Fysik 20 (1961) 209
(Gamma-ray emission probabilities)

- P.THIEBERGER. Ark. Fysik 22 (1962) 127
(Half-life level)
- I.M.GOVIL, C.S.KHURANA, H.S.HANS. Nucl. Phys. 45 (1963) 60
(Half-life level)
- J.S.GEIGER, R.L.GRAHAM, I.BERGSTROM, F.BROWN. Nucl. Phys. 68 (1965) 352
(Half-life level)
- J.E.THUN, S.TORNKVIST, K.B.NIELSEN, H.SNELLMAN, F.FALK, A.MOCOROA. Nucl. Phys. 88 (1966) 289
(Mixing ratio, Multipolarities)
- P.ALEXANDER, J.P.LAU. Nucl. Phys. A121 (1968) 612
(Half-life, Gamma ray energies, Gamma-ray emission probabilities)
- J.F.EMERY, S.A.REYNOLDS, E.I.WAYTT. Nucl. Sci. Eng. 48 (1972) 319
(Half-life)
- L.M.CAVALLO, F.J.SCHIMA, M.P.UNTERWEGER. Phys. Rev. C10 (1974) 2631
(Half-life)
- J.FONTANILLA, A.L.PRINDLE, J.H.LANDRUM, R.A.MEYER. Bull. Am .Phys. Soc. 19 (1974) 501
(Half-life)
- D.C.HOFFMAN, J.W.BARNES, B.J.DROPESKI; F.O.LAWRENCE, G.M.KELLY, M.A.OTT. J. Inorg. Nucl. Chem. 37 (1975) 2336
(Half-life)
- M.J.WOODS, I.W.GOODIER, S.E.M.LUCAS. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 26 (1975) 485
(Half-life)
- K.S.KRANE. At. Data Nucl. Data Tables 19 (1977) 363
(Mixing ratio)
- P.RAGHAVAN. At. Data Nucl. Data Tables 42 (1989) 189
(Nuclear moments)
- M.P.UNTERWEGER, D.D.HOPPES, F.J.SCHIMA. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 349
(Half-life)
- R.H.MARTIN, N.A.KELLER. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 43 (1992) 463
(Gamma-ray emission probabilities)
- S.RAB. Nucl. Data Sheets 75 (1995) 491
(Decay scheme)
- E.SCHÖNFELD, H.JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods A369 (1996) 527
(Atomic Data)
- R.G.HELMER, C.VAN DER LEUN. Appl. Rad. Isotopes 52 (2000) 601
(Gamma ray energies)
- I.M.BAND, M.B.TRZHASKOVSKAYA, C.W.NESTOR. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)
- M.P.UNTERWEGER. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A56 (2002) 125
(Half-life)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q)





1 Decay Scheme

Xe-133m disintegrates by a strong converted gamma transition to the ground state of Xe-133.
Le Xénon 133 métastable se déexcite selon une transition gamma fortement convertie.

2 Nuclear Data

$$\begin{aligned} T_{1/2}(^{133}\text{Xe}^m) &: 2,198 \quad (13) \quad \text{d} \\ T_{1/2}(^{133}\text{Xe}) &: 5,256 \quad (9) \quad \text{d} \end{aligned}$$

2.1 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T	
$\gamma_{1,0}(\text{Xe})$	233,219 (15)	100	M4	6,25 (9)	2,04 (3)	0,453 (7)	8,84 (13)

3 Atomic Data

3.1 Xe

$$\begin{aligned} \omega_K &: 0,888 \quad (5) \\ \bar{\omega}_L &: 0,097 \quad (5) \\ n_{KL} &: 0,902 \quad (4) \end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	29,459	53,98
K α_1	29,779	100
K β_3	33,562	}
K β_1	33,625	}
K β_5''	33,881	}
		28,99
K β_2	34,415	}
K β_4	34,496	}
KO _{2,3}	34,552	}
X _L		
L ℓ	3,638	
L α	4,098 – 4,11	
L η	3,958	
L β	4,418 – 4,776	
L γ	4,895 – 5,296	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	23,512 – 24,842	100
KLX	27,897 – 29,770	46,5
KXY	32,27 – 34,54	5,41
Auger L	2,4 – 5,2	

4 Electron Emissions

		Energy keV		Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Xe)	2,4 - 5,2		70,4 (10)
e _{AK}	(Xe)			7,1 (4)
	KLL	23,512 - 24,842	}	
	KLX	27,897 - 29,770	}	
	KXY	32,27 - 34,54	}	
ec _{1,0} K	(Xe)	198,655 (15)		63,5 (12)
ec _{1,0} L	(Xe)	227,766 - 228,437		20,73 (40)
ec _{1,0} M	(Xe)	232,070 - 232,542		4,60 (8)
ec _{1,0} N	(Xe)	233,006 - 233,152		0,943 (18)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV		Photons per 100 disint.
XL	(Xe)	3,638 — 5,296		7,6 (4)
XK α_2	(Xe)	29,459	16,0 (4)	} K α
XK α_1	(Xe)	29,779	29,7 (6)	}
XK β_3	(Xe)	33,562	}	
XK β_1	(Xe)	33,625	8,61 (20)	K' β_1
XK β_5''	(Xe)	33,881	}	
XK β_2	(Xe)	34,415	}	
XK β_4	(Xe)	34,496	2,03 (7)	K' β_2
XKO _{2,3}	(Xe)	34,552		

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV		Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Xe})$	233,219 (15)	10,16 (13)	


6 Main Production Modes

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fission product} \\ \text{Possible impurities : Xe - 127, Xe - 131m, Xe - 131, Xe - 133, Xe - 135} \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Xe - 132(n,}\gamma\text{)Xe - 133m} \quad \sigma : 0,05 \text{ (1) barns} \\ \text{Possible impurities : Xe - 125, Xe - 129m, Xe - 133, Xe - 135, Xe - 135m, Xe - 137} \end{array} \right.$

7 References

- I.BERGSTROM. Phys. Rev. 81 (1951) 638
(Half-life, Gamma ray energies, K/L ratio)
- I.BERGSTROM. Ark. Fysik 5 (1952) 191
(Half-life, Gamma ray energies)
- I.BERGSTROM. Ark. Fysik 7 (1954) 255
(K ICC, K/L ratio)
- P.ERMAN, Z.SUJKOVVSKI. Ark. Fysik 20 (1961) 209
(Half-life)
- P.ALEXANDER, J.P.LAU. Nucl. Phys. A121 (1968) 612
(Half-life, K ICC)
- K.J.FRANSSON, P.ERMAN. Ark. Fysik 39 (1969) 7
(M4 transition)
- E.ACHTERBERG, F.C.IGLESIAS, A.E.JECH, J.A.MORAGUES, D.OTERO, M.L.PÉREZ, A.N.PROTO, J.J.ROSSI, W.SCHEUER, J.F.SUAREZ, R.A. MEYER. Phys. Rev. C5 (1972) 1759
(K ICC, Gamma ray energies, Multipolarities)
- J.FONTANILLA, A.L.PRINDLE, J.H.LANDRUM, R.A.MEYER. Bull. Am .Phys. Soc. 19 (1974) 501
(Half-life)
- D.C.HOFFMAN, J.W.BARNES, B.J.DROPESKI, F.O.LAWRENCE, G.M.KELLY, M.A.OTT. J. Inorg. Nucl. Chem. 37 (1975) 2336
(Half-life)
- R.A.MEYER, F.F.MOMYER, E.A.HENRY, R.P.YAFFE, W.B.WALTERS. Phys. Rev. C14 (1976) 1152
(Gamma ray energies)
- P.RAGHAVAN. At. Data Nucl. Data Tables 42 (1989) 189
(Nuclear moments)
- S.RAB. Nucl. Data Sheets 75 (1995) 491
(Decay scheme)
- E.SCHÖNFELD, H.JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic Data)
- I.M.BAND, M.B.TRZHASKOVSKAYA. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)





1 Decay Scheme

Xe-135 metastable mainly disintegrates by isomeric transition to Xe-135. A weak beta minus transition to Cs-135 has been observed.

Le xénon 135 metastable se déexcite vers le niveau fondamental de xénon 135 principalement. Une faible transition bêta moins vers le césum 135 a été observée.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{135}\text{Xe}^m)$:	15,30	(3)	min
$T_{1/2}(^{135}\text{Cs})$:	2300000	(300000)	a
$T_{1/2}(^{135}\text{Xe})$:	9,14	(2)	h
$Q^-(^{135}\text{Xe}^m)$:	1692	(4)	keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	lg ft
$\beta_{0,4}^-$	334 (4)	0,00016		8,7
$\beta_{0,3}^-$	500 (4)	0,000032		9,9
$\beta_{0,2}^-$	559 (4)	0,00024		9,2
$\beta_{0,1}^-$	905,1 (40)	0,0036 (18)	1st Forbidden	8,7

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Xe})$	526,570 (5)	96,996 (2)	M4	0,1908 (27)	0,0364 (5)	0,0077 (1)	0,237 (3)
$\gamma_{1,0}(\text{Cs})$	786,91	0,0036 (18)	E2				
$\gamma_{2,0}(\text{Cs})$	1133	0,00024					

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{3,0}(\text{Cs})$	1192	0,000032					
$\gamma_{4,0}(\text{Cs})$	1358	0,00016	E1				

3 Atomic Data

3.1 Xe

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,888 \quad (5) \\ \bar{\omega}_L &: 0,097 \quad (5) \\ n_{KL} &: 0,902 \quad (4)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	29,459	53,98
K α_1	29,779	100
K β_3	33,562	{}
K β_1	33,625	{}
K β_5''	33,881	{}
		28,99
K β_2	34,415	{}
K β_4	34,496	{}
KO _{2,3}	34,552	{}
X _L		
L ℓ	3,6378	
L α	4,0977 – 4,1103	
L η	3,9576	
L β	4,4176 – 4,7758	
L γ	4,895 – 5,2960	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	23,512 – 24,842	100
KLX	27,897 – 29,770	46,5
KXY	32,27 – 34,54	5,41
Auger L	2,5 – 5,3	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Xe)	2,5 - 5,3	15,21 (9)
e _{AK}	(Xe)		1,73 (8)
	KLL	23,512 - 24,842	}
	KLX	27,897 - 29,770	}
	KXY	32,27 - 34,54	}
ec _{1,0 T}	(Xe)	492,006 - 526,560	19,16 (25)
ec _{1,0 K}	(Xe)	492,006 (5)	15,42 (22)
ec _{1,0 L}	(Xe)	521,12 - 521,79	2,943 (41)
ec _{1,0 M}	(Xe)	525,42 - 525,89	0,622 (8)
ec _{1,0 N}	(Xe)	526,36 - 526,50	0,1283 (18)
$\beta_{0,4}^-$	max:	334 (4)	0,00016
$\beta_{0,4}^-$	avg:	96,4 (13)	
$\beta_{0,3}^-$	max:	500 (4)	0,000032
$\beta_{0,3}^-$	avg:	152,8 (15)	
$\beta_{0,2}^-$	max:	559 (4)	0,00024
$\beta_{0,2}^-$	avg:	173,9 (15)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	905,1 (40)	0,0036 (18)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	306 (17)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Xe)	3,6378 — 5,2960	1,637 (30)
XK α_2	(Xe)	29,459	3,90 (7) }
XK α_1	(Xe)	29,779	7,22 (12) }
XK β_3	(Xe)	33,562	}
XK β_1	(Xe)	33,625	}
XK β_5''	(Xe)	33,881	}
XK β_2	(Xe)	34,415	}
XK β_4	(Xe)	34,496	}
XKO _{2,3}	(Xe)	34,552	0,494 (14) K' β_2

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Xe})$	526,570 (5)	80,84 (20)
$\gamma_{1,0}(\text{Cs})$	786,89	0,0036 (18)
$\gamma_{2,0}(\text{Cs})$	1133	0,00024
$\gamma_{3,0}(\text{Cs})$	1192	0,000032
$\gamma_{4,0}(\text{Cs})$	1358	0,00016

6 Main Production Modes


- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Xe} - 136(n,2n)\text{Xe} - 135m \\ \text{Possible impurities : Xe} - 135, \text{Xe} - 134, \text{Xe} - 133, \text{Xe} - 133m, \text{Xe} - 131 \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Xe} - 134(n,\gamma)\text{Xe} - 135m \\ \text{Possible impurities : Xe} - 135, \text{Xe} - 134, \text{Xe} - 133, \text{Xe} - 133m, \text{Xe} - 131 \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ba} - 138(n,\alpha)\text{Xe} - 135m \\ \text{Possible impurities : Xe} - 135, \text{Xe} - 134, \text{Xe} - 133, \text{Xe} - 133m, \text{Xe} - 131 \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Xe} - 136(d,t)\text{Xe} - 135m \\ \text{Possible impurities : Xe} - 135, \text{Xe} - 134, \text{Xe} - 133, \text{Xe} - 133m, \text{Xe} - 131 \end{array} \right.$
- $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fission product ()} \\ \text{Possible impurities : Xe} - 135, \text{Xe} - 134, \text{Xe} - 133, \text{Xe} - 133m, \text{Xe} - 131 \end{array} \right.$

7 References

- T.ALVAGER. Ark. Fysik 17 (1960) 521
(Half-life, Gamma ray energies, K ICC, K/L ratio)
- K.KOTAJIMA, H.MORINAGA. Nucl. Phys. 16 (1960) 231
(Half-life, Gamma ray energies)
- J.J. MOMYER, JR. "The radiochemistry of rare gases", NAS-NS 3025 Report, U.S. Atomic Energy Commission Publisher (1960)
(Modes of Production)
- R.S.HAGER, E.C.SELTZER. Nucl. Data A4 (1968) 1
(Theoretical ICC)
- P.ALEXANDER, J.P.LAU. Nucl. Phys. A121 (1968) 612
(Half-life)
- K.TOMURA, N.MIYAJI. Radiochim. Acta 10 (1968) 173
(Half-life)
- N.B.GOVE, M.MARTIN. At. Data Nucl. Data Tables A10 (1971) 205
(lg ft)
- R.C.HAWKINGS, W.J.EDWARDS, W.J.OLMSTEAD. Can. J. Phys. 49 (1971) 785
(Half-life)
- E.ACHTERBERG, F.C.IGLESIAS, A.E.JECH, J.A.MORAGUES, D.OTERO, M.L.PEREZ, A.N.PROTO, J.J.ROSSI, W.SCHEUER, J.F.SUAREZ.. Phys. Rev. C5 (1972) 1759
(Gamma ray energies, K ICC, Multipolarities)
- J.FONTANILLA, A.L.PRINDLE, J.H.LANDRUM, R.A.MEYER. Bull. Am .Phys. Soc. 19 (1974) 501
(lg ft)
- R.A.MEYER. private communication (1974)
(Gamma ray energies, Gamma-ray emission probabilities, Beta minus emission probability)

- T.FUKUDA, S.OMORI. J. At. Energy Soc. Jap 17 (1975) 177
(Half-life)
- H.FEUERSTEIN, J.OSCHINSKI. J. Inorg. Nucl. Chem. 12 (1976) 243
(Beta minus emission probability)
- H.G.BORNER, W.F.DAVIDSON, J.ALMEIDA, J.BLACHOT, J.A.PINSTON, P.H.M.VAN ASSCHE. Nucl. Instrum. Methods 164 (1979) 579
(Gamma ray energies)
- W.B.WALTERS, S.M.LANE, N.L.SMITH, R.J.NAGLE, R.A.MEYER. Phys. Rev. C26 (1982) 2273
(Gamma ray energies, Beta minus emission probability)
- P.RAGHAVAN. At. Data Nucl. Data Tables 42 (1989) 189
(Nuclear moments)
- E.SCHÖNFELD, H.JASSEN. Nucl. Instrum. Methods A369 (1996) 527
(Atomic Data)
- I.M.BAND, M.B.TRZHASKOVSKAYA,C.W.NESTOR. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA,C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q)
- B.SINGH, A.A.RODIONOV, Y.L.KAZHOV. Nucl. Data Sheets 109 (2008) 517
(Level scheme, Beta minus emission probability)







1 Decay Scheme

Ce-139 disintegrates by electron capture to La-139.

If asymmetric uncertainties are used, the probability of capture to the 165 keV level is 99,9973 (+27-53) and that to the ground state is less than 0,008%.

Le céryum 139 se désintègre par capture électronique vers le lanthane 139. La probabilité de capture vers le niveau fondamental est inférieure à 0,008 %.

2 Nuclear Data

$$\begin{aligned} T_{1/2}(^{139}\text{Ce}) &: 137,641 \quad (20) \quad \text{d} \\ Q^+(^{139}\text{Ce}) &: 270 \quad (3) \quad \text{keV} \end{aligned}$$

2.1 Electron Capture Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$	P_K	P_L	P_M
$\epsilon_{0,1}$	104,1 (30)	99,9973 (27)	Allowed	5,42	0,716 (7)	0,217 (5)	0,0669 (18)
$\epsilon_{0,0}$	270 (3)	0,008	2nd Forbidden	10,6			

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{La})$	165,8576 (11)	100,00 (4)	M1	0,2146 (10)	0,0288 (6)	0,0060 (2)	0,2516 (7)

3 Atomic Data

3.1 La

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,905 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,117 \quad (5) \\ n_{KL} &: 0,882 \quad (4)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	33,0344	54,44
K α_1	33,4421	100
K β_3	37,7206	}
K β_1	37,8015	}
K β_5''	38,084	}
K β_2	38,7303	}
K β_4	38,828	}
KO _{2,3}	38,91	}
X _L		
L ℓ	4,117	
L α	4,634 – 4,65	
L η	4,525	
L β	5,041 – 5,381	
L γ	5,62 – 6,072	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	26,240 – 27,795	100
KLX	31,231 – 33,428	48,3
KXY	36,2 – 38,9	5,84
Auger L	2,7 – 6,2	

4 Electron Emissions

		Energy keV		Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(La)	2,7 - 6,2		90,1 (6)
e _{AK}	(La)			8,4 (4)
	KLL	26,240 - 27,795	}	
	KLX	31,231 - 33,428	}	
	KXY	36,2 - 38,9	}	
ec _{1,0 T}	(La)	126,933 - 165,843		20,10 (6)
ec _{1,0 K}	(La)	126,9330 (11)		17,15 (8)
ec _{1,0 L}	(La)	159,591 - 160,375		2,30 (5)
ec _{1,0 M}	(La)	164,496 - 165,026		0,479 (16)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV		Photons per 100 disint.
XL	(La)	4,117 — 6,072		12,19 (18)
XK α_2	(La)	33,0344	22,80 (24)	} K α
XK α_1	(La)	33,4421	41,9 (4)	}
XK β_3	(La)	37,7206	}	
XK β_1	(La)	37,8015	12,47 (18)	K' β_1
XK β_5''	(La)	38,084	}	
XK β_2	(La)	38,7303	}	
XK β_4	(La)	38,828	3,16 (8)	K' β_2
XKO _{2,3}	(La)	38,91	}	

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV		Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{La})$	165,8575 (11)	79,90 (4)	

6 Main Production Modes


$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ce} - 138(n,\gamma)\text{Ce} - 139m \quad \sigma : 0,015 \text{ (5) barns} \\ \text{Ce} - 139m(\text{I.T.})\text{Ce} - 139 \\ \text{Possible impurities : } T_{1/2} = 56 \text{ s} \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ce} - 138(n,\gamma)\text{Ce} - 139 \quad \sigma : 1,1 \text{ (3) barns} \\ \text{Possible impurities : Ce} - 141 \end{array} \right.$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{La} - 139(d,2n)\text{Ce} - 139 \\ \text{Possible impurities : none} \end{array} \right.$
 La - 139(p,n)Ce - 139m


7 References

- M.L.POOL, N.L.KRISBERG. Phys. Rev. 73 (1948) 1035
(Half-life)
- A.C.G.MITCHELL, E.HEBB. Phys. Rev. 95 (1954) 727
(K ICC)
- R.H.NUSSBAUM, R.VAN LEISHOUT. Physica 20 (1954) 440
(K ICC)
- C.H.PRUETT, R.G.WILKINSON. Phys. Rev. 96 (1954) 1340
(K ICC)
- B.H.KETELLE, H.THOMAS, A.R.BROSI. Phys. Rev. 103 (1956) 190
(Elect.Capt. Intensity, K ICC)
- E.Y.BERLOVICH, G.M.BUKAT, Y.K.GUSER, V.V.NIKITIN, M.K.NIKITIN. Phys. Lett. 2 (1962) 344
(K ICC)
- J.G.V.TAYLOR, J.S.MERRITT. Bull. Amer. Phys. Soc. 7 (1962) 352
(K ICC)
- J.S.GEIGER, R.L.GRAHAM, I.BERGSTROM, F.BROWN. Nucl. Phys. 68 (1965) 352
(Mixing Ratio)
- S.C.ANSPACH, L.M.CAVALLO, S.B.GARFINKEL, J.M.R.HUTCHINSON, C.N.SMITH. Report NP-15663 (1965)
(Half-life)
- J.N.HAAG, D.A.SHIRLEY, D.H.TEMPLETON. Phys. Rev. 129 (1965) 1601
(Mixing Ratio)
- H.H.HANSEN, M.DELABAYE. Proc. Symp. Standardization of Radionuclides, IAEA, Vienna (1966)
(K ICC)
- H.H.HANSEN, M.DELABAYE. CONF-661012 (1967) 361
(K ICC)
- A.MARELIUS, P.SPARRMAN, S.-E.HÄGGLUND. Nucl. Phys. A95 (1967) 632
(PK)
- J.A.BEARDEN. Rev. Mod. Phys. 39 (1967) 78
(X-ray energies)
- E.VATAI, K.HOHMUTH. Atomik Koelemen. 10 (1968) 27
(PK)
- B.ADAMOWICZ, Z.MOROZ, Z.PREIBISZ, A.ZGLINSKI. Acta. Phys. Polon. 34 (1968) 529
(PK)
- E.A.ARISTOV, V.A.BAZHENOV. Meas. Tech. USSR 14 (1971) 1883
(ICC)
- W.-D.SCHMIDT-OTT, R.W.FINK. Z. Phys. 249 (1972) 286
(PK)
- J.L.CAMPBELL, L.A.MCNELLES. Nucl. Instrum. Methods 98 (1972) 433
(PK)
- J.F.EMERY, S.A.REYNOLDS, E.I.WYATT, G.I.GLEASON. Nucl. Sci. Eng. 48 (1972) 319
(Half-life)
- J.S.MERRITT, J.G.V.TAYLOR. Report AECL-4657 (1973) 30
(Half-life)

- J.LEGRAND, M.BLONDEL, P.MAGNIER, C.PERROT, J.-P.BRETHON. Rapport CEA-R-4427 (1973) (ICC)
- S.RAMAN, N.B.GOVE. Phys. Rev. C 7 (1973) 1995 (lg ft)
- J.LEGRAND, M.BLONDEL, P.MAGNIER. Nucl. Instrum. Methods 112 (1973) 101 (ICC)
- A.MORINAGA, K.HISATAKE. J. Phys. Soc. Jpn 38 (1975) 322 (K ICC)
- B.K.DASMAHAPATRA. Pramana 4,5 (1975) 218 (PK)
- A.MORINAGA, K.HISATAKE. J. Phys. Soc. Jap. 38 (1975) 322 (K ICC)
- J.PLCH, J.ZDERADICKA, O.DRAGOUN. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 26 (1975) 579 (PK)
- H.H.HANSEN, D.MOUCHEL. Z. Phys. A274 (1975) 335 (PK)
- K.F.WALZ, E.FUNK, H.M.WEISS. PTB-Jahresbericht (annual report) (1975) 242 (Gamma-ray emission intensity)
- W.HARTL, J.W.HAMMER. Z. Phys. A278 (1976) 183 (PK)
- H.H.HANSEN, D.MOUCHEL. Z. Phys. A276 (1976) 303 (Total and K ICC)
- J.S.MERRITT, J.G.V.TAYLOR, F.H.GIBSON. Report AECL-5546 (1976) 32 (Half-life)
- E.SCHÖNFELD, R.BRUST. Isotopenpraxis 13 (1977) 311 (ICC)
- R.VANINBROUKX, G.GROSSE. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 27 (1977) 727 (Half-life)
- M.RYSAVY, O.DRAGOUN, M.VINDUSKA. Czech. J. Phys. 27B (1977) 538 (Total and K ICC)
- F.LAGOUTINE, J.LEGRAND, C.BAC. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 29 (1978) 269 (Half-life)
- F.RÖSEL, H.M.FRIESS, K.ALDER, H.C.PAULI. At. Data. Nucl. Data Tables 21 (1978) 92 (K and Total ICC)
- V.A.SERGIENKO, *et al.* Conf. Nucl. Spectrom. At. Nucl. Structure, Alma-Ata, USSR 28, 28-31 March (1978) 57 (PK)
- H.H.HANSEN. Z. Phys. A291 (1979) 43 (Mixing Ratio)
- A.R.RUTLEDGE, L.V.SMITH, J.S.MERRITT. Report AECL-6692 (1980) (Half-life)
- A.R.RUTLEDGE, L.V.SMITH, J.S.MERRITT. NBS-SP-626 (1982) 5 (Half-life)
- A.RYTZ. NBS-Special publication 626 (1982) 32 (Half-life)
- D.D.HOPPES, J.M.R.HUTCHINSON, F.J.SCHIMA, M.P.UNTERWEGER. NBS-SP-626 (1982) 85 (Half-life)
- H.H.HANSEN. European App.Res.Rept.Nucl.Sci.Technol. 6,4 (1985) 777 (K and total ICC)
- R.B.BEGZHANOV, K.SH.AZIMOV, D.A.GLADYSHEV, R.D.MAGRUPOV, SH.A.MIRAKHMEDOV, A.MUKHAMMADIEV, M.NARZIKULOV, S.KH.SALIMOV. Proc. 37th Ann. Conf.Nucl. Spectroscopy Struct. At. Nuclei, Yurmala (1987) 528 (PK)
- R.B.BEGZHANOV, *et al.* 37 th Conf. Nucl. Spectrom. At. Nucl. Structure, Yurmala (1987) 528 (PK)
- K.RIISAGER. J. Phys. (London) G14 (1988) 1301 (Pe)
- A.A.KONSTANTINOV, *et al.* Conf. Nucl. Spectrom. At. Nucl. Structure, Baku, USSR, 12 - 14 Apr (1988) 553 (PK)
- T.W.BURROWS. Nucl. Data Sheets 57 (1989) 337 (Spin and parity, Electron Capture Probabilities)

- M.P.UNTERWEGER, D.D.HOPPES, F.J.SCHIMA. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 349 (Half-life)
- E.SCHÖNFELD. Report PTB-6.33-95-2 (1995) (Electron Capture Probabilities)
- M.M.HINDI, R.L.KOZUB. Phys. Rev. C54 (1996) 2709 (Q)
- E.SCHÖNFELD, H.JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527 (Atomic Data)
- V.D.M.L.KALYANI. Indian J. Phys. 71A(4) (1997) 493 (PK)
- B.SINGH, *et al* .. Nucl. Data Sheets 84, 1 (1998) 487 (Log ft)
- R.G.HELMER, C.VAN DER LEUN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A450 (2000) 35 (Gamma ray energies)
- E.SCHÖNFELD, U.SCHÖTZIG. Appl. Rad. Isotopes 54 (2001) 785 (X-ray emission intensities)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 1 (Q)
- T.KIBEDI, T.W. BURROWS, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR. Proc. Intern. Conf. Nuclear Data for Science and Technology, Santa Fe, New Mexico, 26 September-1 Oc 769 (2005) 268 (ICC)





1 Decay Scheme

Tl-206 disintegrates 100% by beta minus emissions to the ground state level of Pb-206 mainly.
Le thallium 206 se désintègre par émissions beta moins essentiellement vers le niveau fondamental de plomb 206.

2 Nuclear Data

$$\begin{aligned} T_{1/2}(^{206}\text{Tl}) &: 4,202 \quad (11) \quad \text{min} \\ Q^-(^{206}\text{Tl}) &: 1532,4 \quad (6) \quad \text{keV} \end{aligned}$$

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,2}^-$	366,0 (8)	0,110 (14)	1st Forbidden	6
$\beta_{0,1}^-$	729,3 (6)	0,0051 (3)	Unique 1st Forbidden	8,6
$\beta_{0,0}^-$	1532,4 (6)	99,885 (14)	1st Forbidden	5,2

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{2,1}(\text{Pb})$	363,3 (5)	0,00015 (15)	E2	0,0414 (12)	0,0187 (6)	0,00476 (14)	0,0663 (20)
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	803,06 (3)	0,0051 (3)	E2	0,00801 (24)	0,00174 (5)	0,000419 (13)	0,01030 (31)
$\gamma_{2,0}(\text{Pb})$	1166,4	0,110 (14)	E0				

3 Atomic Data

3.1 Pb

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,963 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,379 \quad (15) \\ n_{KL} &: 0,811 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	72,8049	59,5
K α_1	74,97	100
K β_3	84,451	}
K β_1	84,937	}
K β_5''	85,47	} 34,18
K β_2	87,238	}
K β_4	87,58	} 10,32
KO _{2,3}	87,911	}
X _L		
L ℓ	9,19	
L α	10,449 – 10,551	
L η	11,349	
L β	12,144 – 12,795	
L γ	14,308 – 15,217	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	56,028 – 61,669	100
KLX	68,181 – 74,969	55,8
KXY	80,3 – 88,0	7,78
Auger L	5,2 – 15,7	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pb)	5,2 - 15,7	
e _{AK}	(Pb)		0,0034 (6)
	KLL	56,028 - 61,669	}
	KLX	68,181 - 74,969	}
	KXY	80,3 - 88,0	}
ec _{2,0 K}	(Pb)	1078,4	0,093 (11)
ec _{2,0 L}	(Pb)	1150,54 - 1151,20	0,017 (3)
$\beta_{0,2}^-$	max:	366,0 (8)	0,110 (14)
$\beta_{0,2}^-$	avg:	104,52 (25)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	729,3 (6)	0,0051 (3)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	232,39 (21)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	1532,4 (6)	99,885 (14)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	538,86 (25)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Pb)	9,190 — 15,217	0,035 (4)
XK α_2	(Pb)	72,8049	0,026 (3) }
XK α_1	(Pb)	74,97	0,044 (5) }
XK β_3	(Pb)	84,451	}
XK β_1	(Pb)	84,937	}
XK β_5''	(Pb)	85,47	}
XK β_2	(Pb)	87,238	}
XK β_4	(Pb)	87,58	}
XKO _{2,3}	(Pb)	87,911	0,0045 (6) K' β_2

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{2,1}(\text{Pb})$	363,3 (5)	0,00014 (14)
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	803,06 (3)	0,0050 (3)


6 Main Production Modes


$\text{Tl} - 205(n,\gamma)\text{Tl} - 206 \quad \sigma : 0,10 (3) \text{ barns}$
 $\text{Bi} - 210 \alpha - \text{decay}$
 $\text{Tl} - 205(d,p)\text{Tl} - 206$
 $\text{Pb} - 207(t,\alpha)\text{Tl} - 206$
 $\text{Pb} - 208(d,\alpha)\text{Tl} - 206$

7 References

- K. FAJANS, A.F. VOIGT. Phys. Rev. 60 (1941) 619
(Half-life)
- D.E. ALBURGER, G. FRIEDLANDER. Phys. Rev. 82 (1951) 977
(Maximum beta-decay energy)
- B.W. SARGENT, L. YAFFE, A.P. GRAY. Can. J. Phys. 31 (1953) 235
(Half-life)
- A. POULARIKAS, R.W. FINK. Phys. Rev. 115 (1959) 989
(Half-life)
- D.A. HOWE, L.M. LANGER. Phys. Rev. 124 (1961) 519
(Maximum beta-decay energy)
- M. NURMIA, P. KAURANEN, M. KARRAS, A. SIIVOLA, A. ISOLA, G.GRAEFFE, A. LYJJYEN. Nature 190 (1961) 427
(Half-life)
- W.H. ZOLLER, C. BOTTERON AND W.B. WALTERS. MIT-905-133 (1968)
(Gamma-ray emission probability)
- W.H. ZOLLER, W.B. WALTERS. J. Inorg. Nucl. Chem. 32 (1970) 2465
(Gamma-ray emission probability)
- D. FLOTHMANN, R. LOHKEN, W. WIESNER, H. REBEL. Phys. Rev. Lett. 25 (1970) 1719
(Half-life, Maximum beta-decay energy)
- N.B. GOVE, M.J. MARTIN. Nucl. Data Tables 10 (1971) 205
(Log ft values)
- B.I. PERSSON, I. PLESSER AND J.W. SUNIER. Nucl. Phys. A167 (1971) 470
(Half-life, Maximum beta-decay energy)
- J.C. MANTHRUTHIL, D.C. CAMP, A.V. RAMAYYA, J.H. HAMILTON, J.J. PINAJIAN, J.W. DOORNEBOS. Phys. Rev. C6 (1972) 1870
(Gamma-ray transition energies)
- L.L. COLLINS, G.D. O'KELLEY, E. EICHLER. ORNL-4791 (1972)
(Half-life)
- H.C. GRIFFIN, A.M. DONNE. Phys. Rev. Lett. 28 (1972) 107
(Half-life)
- W. WIESNER, D. FLOTHMANN, H.J. GILS, R. LOHKEN, H. REBEL. Nucl. Phys. A191 (1972) 166
(Half-life, Maximum beta-decay energy)

- J.E. DRAPER, R.J. McDONALD, N.S.P. KING. Phys. Rev. C16 (1977) 1594
(Transition energies, K/L conversion electrons subs)
- F.P. LARKINS. Atomic Data and Nuclear Data Tables. 20 (1977) 313
(Electron shells binding energies)
- W.H. TRZASKA, J. KANTELE, R. JULIN, J. KUMPULAINEN, P. VAN DUPPEN, M. HUYSE, J. WAUTERS. Z. Phys. A335 (1990) 475
(K/L conversion electrons subshell ratio)
- M.U. RAJPUT, T.D. MACMAHON. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 289
(Evaluation techniques)
- S.I.KAFALA, T.D.MACMAHON, P.W.GRAY. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A339 (1994) 151
(Evaluation techniques)
- S. RAMAN, J.B. MCGRORY, E.T. JOURNEY, J.W. STARNER. Phys. Rev. C53 (1996) 2732
(Gamma-ray transition energies)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(Fluorescence yields)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-98-1 Braunschweig (1998)
(K Auger electron energies)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1 Braunschweig (1999)
(KX-ray energies and relative emission probabilities)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 88 (1999) 29
(^{206}Tl and ^{206}Pb level schemes)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Appl. Rad. Isot. 52 (2000) 595
(Program Emission)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables. 91 (2002) 1
(ICC)
- M.-M.BÉ, R.G.HELMER, V. CHISTÉ. J. Nucl. Scien. and Techn. suppl. 2 (2002) 481
(Saisinuc & supporting software)
- G.AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Decay Q values)
- R.D. DESLATTES, E.G. KESSLER, P. INDELICATO, L. DE BILLY, E. LINDROTH, J. ANTON. Rev. Mod. Phys. 77 (2003) 35
(K and L X-ray energies)
- D. MACMAHON, A. PEARCE, P. HARRIS. Appl. Rad. Isot. 60 (2004) 275
(Evaluation techniques)
- T. KIBEDI, T.W. BURROWS, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR. Proc. Intern. Conf. Nuclear Data for Science and Technology, Santa Fe, New Mexico, 26 September-1 Oc 769 (2005) 268
(ICC)





1 Decay Scheme

Tl-210 disintegrates by beta minus emission to excited levels in Pb-210. A weak delayed neutron emission has been observed.

Le thallium 210 se désintègre par émission bêta moins vers des niveaux excités de plomb 210. Une émission de neutrons retardés de faible intensité a été mise en évidence.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{210}\text{Tl})$:	1,30	(3)	min
$T_{1/2}(^{210}\text{Pb})$:	22,23	(12)	a
$Q^-(^{210}\text{Tl})$:	5482	(12)	keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	lg ft
$\beta_{0,11}^-$	1380 (12)	~ 2		6,2
$\beta_{0,10}^-$	1603 (12)	~ 7		5,9
$\beta_{0,9}^-$	1860 (12)	~ 24		5,6
$\beta_{0,8}^-$	2024 (12)	~ 10	Allowed	6,1
$\beta_{0,7}^-$	2413 (12)	~ 10	2 Forbidden unique	6,4
$\beta_{0,3}^-$	4290 (12)	~ 31	Allowed	6,9
$\beta_{0,2}^-$	4386 (12)	~ 13	Allowed	7,3

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}}\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Pb})$	83 (30)	30 (6)	[E2]		~ 10	~ 3	~ 14

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{3,2}(\text{Pb})$	97 (30)	40 (20)	M1 + E2	~ 4	~ 3	$\sim 0,8$	~ 9
$\gamma_{2,1}(\text{Pb})$	296 (3)	89 (11)	E2	0,0671 (19)	0,0399 (17)	0,0103 (5)	0,120 (5)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Pb})$	356 (10)	5,0 (25)	[M1]	0,221 (18)	0,038 (3)	0,0088 (8)	0,270 (22)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Pb})$	382 (10)	3,7 (24)	[M1]	0,183 (14)	0,0310 (24)	0,0073 (6)	0,223 (17)
$\gamma_{11,9}(\text{Pb})$	480 (36)	2 (1)					
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Pb})$	670 (20)	2 (1)					
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	799,6 (3)	100	E2	0,00811 (24)	0,001764 (50)	0,000425 (13)	0,01042 (31)
$\gamma_{7,5}(\text{Pb})$	860 (30)	6,9 (20)					
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Pb})$	910 (30)	3 (2)					
$\gamma_{4,1}(\text{Pb})$	1070 (20)	11,9 (49)	[E1]	0,00185 (6)	0,000281 (8)	0,000065 (2)	0,00222 (7)
$\gamma_{5,2}(\text{Pb})$	1110 (20)	6,9 (20)					
$\gamma_{9,6}(\text{Pb})$	1210 (20)	16,8 (40)					
$\gamma_{6,2}(\text{Pb})$	1310 (20)	20,8 (49)					
$\gamma_{5,1}(\text{Pb})$	1410 (20)	4,9 (20)					
$\gamma_{(-1,6)}(\text{Pb})$	1490 (20)	2 (1)					
$\gamma_{(-1,7)}(\text{Pb})$	1540 (30)	2 (1)					
$\gamma_{8,4}(\text{Pb})$	1590 (30)	2 (1)					
$\gamma_{(-1,8)}(\text{Pb})$	1650 (30)	2 (1)					
$\gamma_{10,4}(\text{Pb})$	2010 (30)	6,9 (20)					
$\gamma_{(-1,9)}(\text{Pb})$	2090 (30)	4,9 (20)					
$\gamma_{7,1}(\text{Pb})$	2280 (12)	3 (2)					
$\gamma_{8,2}(\text{Pb})$	2360 (30)	7,9 (30)					
$\gamma_{9,3}(\text{Pb})$	2430 (30)	8,9 (30)					

3 Atomic Data

3.1 Pb

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,963 (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,379 (15) \\ n_{KL} &: 0,811 (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	72,805	59,5
K α_1	74,97	100
K β_3	84,451	{}
K β_1	84,937	{}
K β_5''	85,47	{ } 34,2
K β_2	87,238	{}
K β_4	87,58	{ } 10,3
KO _{2,3}	87,911	{}

	Energy keV	Relative probability
X _L		
L ℓ	9,186	
L α	10,449 – 10,551	
L η	11,349	
L β	12,144 – 13,376	
L γ	14,308 – 15,217	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{3,2} K	(Pb)	~ 9	~ 16
ec _{-1,1} L	(Pb)	67,1392 - 69,9648	~ 20
ec _{-1,1} M	(Pb)	79,1493 - 80,5160	~ 6
ec _{3,2} L	(Pb)	81,1392 - 83,9648	~ 12
ec _{3,2} M	(Pb)	93,1493 - 94,5160	~ 3,2
ec _{2,1} K	(Pb)	208 (3)	5,3 (7)
ec _{-1,2} K	(Pb)	268 (10)	0,88 (45)
ec _{2,1} L	(Pb)	280,1392 - 282,9648	3,15 (42)
ec _{2,1} M	(Pb)	292,1493 - 293,5160	0,81 (11)
ec _{-1,3} K	(Pb)	294 (10)	0,55 (37)
ec _{2,1} N	(Pb)	295,1064 - 295,8637	0,205 (27)
ec _{-1,2} L	(Pb)	340,1392 - 342,9648	0,15 (8)
ec _{-1,2} M	(Pb)	352,1493 - 353,5160	0,035 (18)
ec _{-1,3} L	(Pb)	366,1392 - 368,9648	0,09 (6)
ec _{-1,3} M	(Pb)	378,1493 - 379,5160	0,022 (15)
ec _{1,0} K	(Pb)	711,6 (3)	0,803 (12)
ec _{1,0} L	(Pb)	783,7 - 786,6	0,1746 (25)
ec _{1,0} M	(Pb)	795,7 - 797,1	0,0421 (6)
ec _{1,0} N	(Pb)	798,7 - 799,5	0,01066 (16)
ec _{4,1} K	(Pb)	982 (20)	0,022 (9)
$\beta_{0,11}^-$	max:	1380 (12)	~ 2
$\beta_{0,11}^-$	avg:	477 (13)	
$\beta_{0,10}^-$	max:	1603 (12)	~ 7
$\beta_{0,10}^-$	avg:	568 (14)	
$\beta_{0,9}^-$	max:	1860 (12)	~ 24
$\beta_{0,9}^-$	avg:	674 (10)	
$\beta_{0,8}^-$	max:	2024 (12)	~ 10
$\beta_{0,8}^-$	avg:	743 (10)	
$\beta_{0,7}^-$	max:	2413 (12)	~ 10
$\beta_{0,7}^-$	avg:	907 (7)	
$\beta_{0,3}^-$	max:	4290 (12)	~ 31
$\beta_{0,3}^-$	avg:	1721 (11)	

		Energy keV		Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,2}^-$	max:	4386	(12)	~ 13
$\beta_{0,2}^-$	avg:	1763	(5)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XK α_2	(Pb)	72,805	7 (4)	} K α
XK α_1	(Pb)	74,97	11 (6)	}
XK β_3	(Pb)	84,451	}	
XK β_1	(Pb)	84,937	}	K' β_1
XK β_5''	(Pb)	85,47	}	
XK β_2	(Pb)	87,238	}	
XK β_4	(Pb)	87,58	}	K' β_2
XKO _{2,3}	(Pb)	87,911	}	

5.2 Gamma Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Pb})$		83 (30)	1,98 (40)
$\gamma_{3,2}(\text{Pb})$		97 (30)	4 (2)
$\gamma_{2,1}(\text{Pb})$		296 (3)	79 (10)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Pb})$		356 (10)	4 (2)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Pb})$		382 (10)	3 (2)
$\gamma_{11,9}(\text{Pb})$		480 (36)	2 (1)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Pb})$		670 (20)	2 (1)
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$		799,6 (3)	98,969 (30)
$\gamma_{7,5}(\text{Pb})$		860 (30)	6,9 (20)
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Pb})$		910 (30)	3 (2)
$\gamma_{4,1}(\text{Pb})$		1070 (20)	11,9 (49)
$\gamma_{5,2}(\text{Pb})$		1110 (20)	6,9 (20)
$\gamma_{9,6}(\text{Pb})$		1210 (20)	16,8 (40)


	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{6,2}(\text{Pb})$	1310 (20)	20,8 (49)
$\gamma_{5,1}(\text{Pb})$	1410 (20)	4,9 (20)
$\gamma_{(-1,6)}(\text{Pb})$	1490 (20)	2 (1)
$\gamma_{(-1,7)}(\text{Pb})$	1540 (30)	2 (1)
$\gamma_{8,4}(\text{Pb})$	1590 (30)	2 (1)
$\gamma_{(-1,8)}(\text{Pb})$	1650 (30)	2 (1)
$\gamma_{10,4}(\text{Pb})$	2010 (30)	6,9 (20)
$\gamma_{(-1,9)}(\text{Pb})$	2090 (30)	4,9 (20)
$\gamma_{7,1}(\text{Pb})$	2280 (12)	3 (2)
$\gamma_{8,2}(\text{Pb})$	2360 (30)	7,9 (30)
$\gamma_{9,3}(\text{Pb})$	2430 (30)	8,9 (30)


6 Main Production Modes

Ra – 226 decay chain.

7 References

- M. CURIE, A. DEBIERNE, A.S. EVE, H. GEIGER, O. HAHN, S.C. LIND, ST. MEYER, E. RUTHERFORD, E. SCHWEIDLER. Rev. Mod. Phys. 3 (1931) 427
(Half-life.)
- A.V. KOGAN, L.I. RUSINOV. Sov. Phys. - JETP 5 (1957) 365
(Half-life, neutron emission.)
- G. STETTER. TID-14880 (1961)
(Neutron emission probability.)
- P. WEINZIERL, E. UJLAKI, G. PREINREICH, G. EDER. Phys. Rev. 134 (1964) B257
(Half-life, beta emission energies and probabilities, gamma-ray energies and emission probabilities.)
- B. HARMATZ. Nucl. Data Sheets 34 (1981) 735
(Spin, parity, energy level, beta and gamma probabilities.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 99 (2003) 483
(Spin, parity, energy level, beta and gamma probabilities.)





1 Decay Scheme

Pb-210 disintegrates by beta minus emission to the excited level and to the ground state level of Bi-210. A weak alpha transition to the Hg-206 ground state has been observed.

Le plomb 210 se désintègre par émission bêta moins vers le niveau excité et le niveau fondamental de bismuth 210. Une transition alpha de très faible intensité (1,9(4) E-6 %) vers le niveau fondamental de mercure 206 a été mise en évidence.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{210}\text{Pb})$:	22,23	(12)	a
$T_{1/2}(^{210}\text{Bi})$:	5,012	(5)	d
$T_{1/2}(^{206}\text{Hg})$:	8,15	(10)	min
$Q^-(^{210}\text{Pb})$:	63,5	(5)	keV
$Q^\alpha(^{210}\text{Pb})$:	3792	(20)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,0}$	3792 (20)	0,0000019 (4)	1

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,1}^-$	17,0 (5)	80,2 (13)	1st Forbidden	5,5
$\beta_{0,0}^-$	63,5 (5)	19,8 (13)	1st Forbidden	7,8

2.3 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}} \times 100$	Multipolarity	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Bi})$	46,539 (1)	80,2 (13)	M1	13,64 (19)	3,21 (5)	17,86 (25)

3 Atomic Data

3.1 Bi

ω_K	:	0,964	(4)
$\bar{\omega}_L$:	0,391	(16)
$\bar{\omega}_M$:	0,0365	(20)
n_{KL}	:	0,809	(5)
\bar{n}_{LM}	:	1,29	(4)

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	74,8157	59,77
K α_1	77,1088	100
K β_3	86,835	}
K β_1	87,344	}
K β_5''	87,862	}
		34,25
K β_2	89,732	}
K β_4	90,074	}
KO _{2,3}	90,421	}
X _L		
L ℓ	9,4207	
L α	10,7308 – 10,8387	
L η	11,7127	
L β	12,4814 – 13,8066	
L γ	14,7735 – 15,7084	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger L	5,3 – 10,7	

3.2 Hg

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,962 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,355 \quad (14) \\ n_{KL} &: 0,813 \quad (4)\end{aligned}$$

3.2.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	68,895	58,99
K α_1	70,82	100
K β_3	79,823	{}
K β_1	80,254	{}
K β_5''	80,762	{}
		33,94
K β_2	82,435	{}
K β_4	82,776	{}
KO _{2,3}	83,028	{}
		9,94

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,0}$	3720 (20)	0,0000019 (4)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Bi)	5,3 - 10,7	36,0 (9)
e _{AK}	(Bi)		
e _{c_{1,0} L}	(Bi)	30,152 - 33,120	58 (1)
e _{c_{1,0} M}	(Bi)	42,540 - 43,959	13,65 (25)
e _{c_{1,0} N}	(Bi)	45,601 - 46,382	3,50 (6)
$\beta_{0,1}^-$	max:	17,0 (5)	80,2 (13)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	4,3 (1)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	63,5 (5)	19,8 (13)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	16,3 (1)	

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Bi)	9,4207 — 15,7084	22,0 (5)

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Bi})$	46,539 (1)	4,252 (40)


7 Main Production Modes

Ra – 226 decay chain()



8 References

- I. CURIE. J. Phys. Radium 10 (1929) 388
(Half-life.)
- P. CURIE, I. CURIE. J. Phys. Radium 10 (1929) 385
(Half-life.)
- M. CURIE, A. DEBIERNE, A.S. EVE, H. GEIGER, O. HAHN, S.C. LIND, ST. MEYER, E. RUTHERFORD, E. SCHWEIDLER. Rev. Mod. Phys. 3 (1931) 427
(Half-life.)
- F. WAGNER. ANL - 4490 (1950) 5
(Half-life.)
- D.K. BUTT, W.D. BRODIE. Proc. Phys. Soc. (London) 64A (1951) 791
(Gamma-ray intensity.)
- C.S. WU, F. BOEHM, E. NAGEL. Phys. Rev. 91 (1953) 319
(Gamma-ray intensity.)
- P.E. DAMON, R.R. EDWARDS. Phys. Rev. 95 (1954) 1698
(Gamma-ray intensity.)
- J. TOBAILEM. J. Phys. Radium 16 (1955) 235
(Half-life.)
- W. STANNERS, M.A.S. ROSS. Proc. Phys. Soc. 69A (1956) 836
(Beta intensity.)
- W.F. MERRITT, P.J. CAMPION, R.C. HAWKINGS. Can. J. Phys. 35 (1957) 16
(Half-life.)
- J. TOUSSET. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 245 (1957) 1617
(Beta intensity.)
- R.W. FINK. Phys. Rev. 106 (1957) 266
(Gamma-ray intensity.)
- J. TOUSSET. J. Phys. Radium 19 (1958) 39
(Beta intensity.)
- I.Y. KRAUSE. Z. Physik 152 (1958) 586
(Gamma-ray intensity.)
- G. HABORTTLE. J. Inorg. Nucl. Chem. 12 (1959) 6
(Half-life.)
- B.D. PATE, D.C. SANTRY, L. YAFFE. Can. J. Phys. 37 (1959) 1000
(Half-life.)
- W.R. ECKELMANN, W.S. BROECKER, J.L. KULP. Phys. Rev. 118 (1960) 698
(Half-life.)
- M. NURMIA, P. KAURANEN, M. KARRAS, A. SIIVOLA, A. ISOLA, G. GRAEFFE, A. LYJJYNNEN. Nature 190 (1961) 427
(Alpha branching ratio.)
- P. KAURANEN. Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A VI 96 (1962)
(Alpha branching ratio.)
- L. IMRE, G. FABRY, I. DEZSI. Nucl. Sci. Abstr. 17 (1963) 4186
(Half-life.)
- G.K. WOLF, F. LUX, H.J. BORN. Radiochim. Acta 3 (1964) 206
(Alpha branching ratio.)
- H. RAMTHUN. Z. Naturforsch. 19a (1964) 1064
(Half-life.)
- H.R. VON GUNTEN, A. WYTTEBACH, H. DULAKAS. J. Inorg. Nucl. Chem. 29 (1967) 2826
(Half-life.)
- A. HÖHNDORF. Z. Naturforsch. 24a (1969) 612
(Half-life.)
- K.YA. GROMOV, B.M. SABIROV, J.J. URBANETS. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 33 (1970) 1510
(Gamma-ray intensity.)

- R. J. GEHRKE, R.A. LOKKEN. Nucl. Instrum. Methods 97 (1971) 219
(L x-rays.)
- R.G. HELMER, A.J. CAFFREY, R.J. GEHRKE, R.C. GREENWOOD. Nucl. Instrum. Meth. 188 (1981) 671
(Gamma-ray energy.)
- K. DEBERTIN, W. PESSARA. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 34 (1983) 515
(Gamma-ray intensity.)
- D. METHA, B. CHAND, S. SINGH, M.L. GARG, N. SINGH, T.S. CHEEMA, P.N. TREHAN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A260 (1987) 157
(L x-rays.)
- R.G. HELMER, M.A. LEE. Nucl. Data Sheets 61 (1990) 93
(Spin, parity, level energy.)
- Y. HINO, Y. KAWADA. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A286 (1990) 543
(Gamma-ray intensity.)
- U. SCHÖTZIG. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A286 (1990) 523
(Gamma-ray intensity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 88 (1999) 29
(Spin, parity, level energy.)
- R.G. HELMER, C. VAN DER LEUN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A450 (2000) 35
(Gamma-ray energy.)
- G.A. RECH, E. BROWNE, I.D. GOLDMAN, F.J. SCHIMA, E.B. NORMAN. Phys. Rev. C65 (2002) 057302
(Half-life.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C. W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 99 (2003) 483
(Spin, parity, level energy.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)



γ Emission intensities
per 100 disintegrations





1 Decay Scheme

Bi-210 mainly disintegrates by beta minus emission to the Po-210 fundamental level. Two weak alpha emissions to excited levels of Tl-206 have been pointed out.

Le bismuth 210 se désintègre principalement par émission bêta moins vers le niveau fondamental de polonium 210. Des transitions alpha de très faible intensité vers les niveaux excités de 304,8 keV et 265,7 keV de thalium 206 ont été mises en évidence.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{210}\text{Bi})$:	5,012	(5)	d
$T_{1/2}(^{210}\text{Po})$:	138,3763	(17)	d
$T_{1/2}(^{206}\text{Tl})$:	4,202	(11)	min
$Q^-(^{210}\text{Bi})$:	1162,1	(8)	keV
$Q^\alpha(^{210}\text{Bi})$:	5042,7	(18)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,2}$	4740 (4)	0,000084 (9)	49
$\alpha_{0,1}$	4778 (4)	0,000056 (6)	58

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,0}^-$	1162,1 (8)	99,99986 (2)	1st Forbidden	8

2.3 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Tl})$	265,832 (5)	0,000056 (6)	E2	0,0855 (12)	0,0561 (8)	0,01440 (21)	0,1603 (23)
$\gamma_{2,0}(\text{Tl})$	304,896 (6)	0,000084 (9)	M1	0,307 (5)	0,0519 (8)	0,01210 (17)	0,375 (6)

3 Atomic Data

3.1 Tl

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,967 \quad (15) \\ \bar{\omega}_L &: 0,40 \quad (4) \\ n_{KL} &: 0,81 \quad (3)\end{aligned}$$

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,2}$	4650 (4)	0,000084 (9)
$\alpha_{0,1}$	4687 (4)	0,000056 (6)

5 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,0}^-$	max: 1162,1 (8)	99,99986 (2)
$\beta_{0,0}^-$	avg: 389,2 (3)	

6 Photon Emissions

6.1 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Tl})$	265,832 (5)	0,000048 (5)

Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{2,0}(\text{Tl})$	304,896 (6) 0,000061 (7)


7 Main Production Modes

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ra} - 226 \text{ decay chain} \\ \text{Possible impurities : Bi} - 214 \end{array} \right.$

8 References

- A. POMPÉI. J. Phys. Radium 6 (1935) 471
(Half-life.)
- A. FLAMMERSFELD. Z. Phys. 112 (1939) 727
(End point energy.)
- G.J. NEARY. Proc. Roy. Soc. (London) 175A (194) 71
(End point energy.)
- N. HOLE. Ark. Mat., Astron. Fys. 31B (1944) 1
(Half-life.)
- E. BRODA, N. FEATHER. Proc. Roy. Soc. (London) 191A (1947) 1
(Alpha branching ratio.)
- F. BEGEMANN, F.G. HOUTERMANS. Z. Naturforsch. 7a (1952) 143
(Half-life.)
- E.E. LOCKETT, R.H. THOMAS. Nucleonics 11 (1953) 14
(Half-life.)
- E.A. PLASSMANN, L.M. LANGER. Phys. Rev. 96 (1954) 1593
(End point energy.)
- J. ROBERT, J. TOBAILEM. J. Phys. Radium 17 (1956) 440
(Half-life.)
- R.W. FINK, G.W. WAREN, B.L. ROBINSON, R.R. EDWARDS. Bull. Am .Phys. Soc. 1 (1956) 171
(Alpha branching ratio.)
- J. ROBERT. Ann. Phys. (Paris) 4 (1959) 89
(Half-life.)
- R.J. WALEN, G. BASTIN-SCOFFIER. J. Phys. Radium 20 (1959) 589
(Alpha branching ratio.)
- R.J. WALEN, G. BASTIN-SCOFFIER. Nucl. Phys. 16 (1960) 246
(Alpha branching ratio and energy.)
- M. NURMIA, P. KAURANEN, M. KARRAS, A. SIVOLA, A. ISOLA, G. GRAEFFE, A. LYJJYNNEN. Nature 190 (1961) 427
(Alpha branching ratio.)
- L.I. RUSINOV, YU.N. ANDREEV, S.V. GOLENETSKII, M.I. KISLOV, YU.I. FILIMONOV. Sov. Phys. - JETP 13 (1961) 707
(Spin, parity and multipolarity.)
- H. DANIEL. Nucl. Phys. 31 (1962) 293
(End point energy.)
- P. KAURANEN. Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A VI 96 (1962)
(Alpha branching ratio and energy.)
- S.T. HSUE, M.U. KIM, S.M. TANG. Nucl. Phys. A94 (1967) 146
(End point energy.)
- FLOTHMANN, W. WIESNER, R. LÖHKEN, H. REBEL. Z. Phys. 225 (1969) 164
(End point energy.)

- R.C. LANGE, G.R. HAGEE, A.R. CAMPBELL. Nucl. Phys. A133 (1969) 273
(Alpha energy.)
- A. RYTZ. At. Data Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha energy.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 88 (1999) 29
(Energy and half-life levels.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 99 (2003) 649
(Spin, parity and energy level.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)





1 Decay Scheme

Po-210 disintegrates by alpha emission to the 803-keV excited level (0,00124 (4) %) and to the ground state level of Pb-206.

Le polonium 210 se désintègre par émission alpha principalement vers le niveau fondamental du plomb 206 ainsi que vers le niveau excité de 803 keV avec une intensité de 0,00124 (4)%.

2 Nuclear Data

$$\begin{aligned} T_{1/2}(^{210}\text{Po}) &: 138,3763 \quad (17) \quad \text{d} \\ Q^\alpha(^{210}\text{Po}) &: 5407,46 \quad (7) \quad \text{keV} \end{aligned}$$

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,1}$	4604,36 (9)	0,00124 (4)	1,5
$\alpha_{0,0}$	5407,46 (7)	99,99876 (4)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	803,10 (5)	0,00124 (4)	E2	0,00804 (12)	0,001745 (25)	0,000420 (6)	0,01033 (15)

3 Atomic Data

3.1 Pb

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,963 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,379 \quad (15) \\ n_{KL} &: 0,811 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	72,805	59,5
K α_1	74,97	100
K β_3	84,451	}
K β_1	84,937	}
K β_5''	85,47	}
K β_2	87,238	}
K β_4	87,58	}
KO _{2,3}	87,911	}
X _L		
L ℓ	9,186	
L α	10,449 – 10,551	
L η	11,349	
L β	12,144 – 13,377	
L γ	14,308 – 15,217	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,1}$	4516,66 (9)	0,00124 (4)
$\alpha_{0,0}$	5304,33 (7)	99,99876 (4)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Pb)	9,186 — 15,217	0,00000384 (10)
XK α_2	(Pb)	72,805	0,00000277 (10) }
XK α_1	(Pb)	74,97	0,00000466 (17) }
XK β_3	(Pb)	84,451	}
XK β_1	(Pb)	84,937	0,00000159 (6) K' β_1
XK β_5''	(Pb)	85,47	}
XK β_2	(Pb)	87,238	}
XK β_4	(Pb)	87,58	0,000000481 (20) K' β_2
XKO _{2,3}	(Pb)	87,911	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	803,10 (5)	0,00123 (4)


6 Main Production Modes

Ra – 226 decay chain

7 References

- E.V. SCHWEIDLER. Verh. Deutsch Phys. Ges. 14 (1912) 539 (Half-life.)
- M. CURIE. J. Phys. Radium 1 (1920) 12 (Half-life.)
- A. DORABIALSKA. Roczniki Chem. (Poland) 11 (1931) 475 (Half-life)
- S. ROSENBLUM, G. DUPOUY. J. Phys. Radium 4 (1933) 262 (Alpha energy.)
- W.B. LEWIS, B.V. BOWDEN. Proc. Roy. Soc. (London) A145 (1934) 235 (Alpha energy.)
- A.S. SANIELEVICI. J. Chim. Phys. 33 (1936) 759 (Half-life.)
- W.H. BEAMER, C.R. MAXWELL. J. Chem. Phys. 17 (1949) 1293 (Half-life.)
- M.A. GRACE, R.A. ALLEN, D. WEST, H. HALBAN. Proc. Roy. Soc. (London) A64 (1951) 493 (Gamma intensity.)

- W.C. BARBER, R.H. HELM. Phys. Rev. 86 (1952) 275
(Gamma intensity.)
- M. RIOU. J. Phys. Radium 13 (1952) 244
(Gamma intensity.)
- S. DE BENEDETTI, G.H. MINTON. Phys. Rev. 85 (1952) 944
(Multipolarity.)
- M.L. CURTIS. Phys. Rev. 92 (1953) 1489
(Half-life.)
- D.C. GINNINGS, A.F. BALL, D.T. VIER. J. Res. Nat. Bur. Stand. 50 (1953) 75
(Half-life.)
- E.R. COLLINS, C.D. MCKENZIE, C.A. RAMM. Proc. Roy. Soc. (London) 216A (1953) 219
(Alpha energy.)
- G.H. BRIGGS. Rev. Mod. Phys. 26 (1954) 1
(Alpha energy.)
- J.F. EICELBERGER, K.C. JORDAN, S.R. ORR, J.R. PARKS. Phys. Rev. 96 (1954) 719
(Half-life.)
- R.W. HAYWARD, D.D. HOPPES, W.B. MANN. J. Res. Nat. Bur. Stand. 54 (1955) 47
(Gamma intensity.)
- O. ROJO, M.A. HAKEEM, M. GOODRICH. Phys. Rev. 99 (1955) 1629
(Gamma intensity.)
- A. ASCOLI, M. ASDENTE, E. GERMAGNOLI. Nuovo Cim. 4 (1956) 946
(Gamma intensity.)
- N.S. SHIMANSKAIA. Soviet Phys. JETP 4 (1957) 165
(Gamma intensity.)
- G. BASTIN-SCOFFIER, R.J. WALEN. Compt. Rend. Acad. Sci. (Paris) 247 (1958) 2333
(Alpha ratio.)
- I.I. AGAPKIN, L.L. GOL'DIN. Bull. Acad. Sci. USSR 21 (1958) 911
(Alpha energy.)
- V.V. OVECHKIN. Bull. Acad. Sci. USSR 21 (1958) 1627
(Gamma intensity.)
- F.A. WHITE, F.M. ROURKE, J.C. SHEFFIELD, R.P. SCHUMAN, J.R. HUIZENGA. Phys. Rev. 109 (1958) 437
(Alpha energy.)
- C.P. BROWNE, J.A. GALEY, J.R. ERSKINE, K.L. WARSH. Phys. Rev. 120 (1960) 905
(Alpha energy.)
- A. RYTZ, H.H. STAUB, H. WINKLER. Helv. Phys. Acta 34 (1961) 960
(Alpha energy.)
- E.H. BECKNER, R.L. BRAMBLETT, G.C. PHILLIPS, T.A. EASTWOOD. Phys. Rev. 123 (1961) 2100
(Alpha energy.)
- C.P. BROWNE. Phys. Rev. 126 (1962) 1139
(Alpha energy.)
- J.F. EICELBERGER, G.R. GROVE, L.V. JONES. MLM 1209 (1964) 11
(Half-life.)
- D.J. GORMAN, A. RYTZ. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris), Ser. B277 (1973) 29
(Alpha energy.)
- R.G. HELMER. Nucl. Data Sheets 61 (1990) 93
(Energy level, spin and parity.)
- A. RYTZ. At. Data Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha energy.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 88 (1999) 29
(Spin, parity.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables 8 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, V. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)





1 Decay Scheme

Po-213 disintegrates 100% by alpha emissions to levels in Pb-209.

Le polonium 213 se désintègre principalement vers le niveau fondamental du plomb 209.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{213}\text{Po})$:	3,70	(5)	10^{-6} s
$T_{1/2}(^{209}\text{Pb})$:	3,253	(14)	h
$Q^\alpha(^{213}\text{Po})$:	8536,1	(26)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,1}$	7760 (10)	0,0050 (5)	185
$\alpha_{0,0}$	8536,2 (25)	99,9950 (5)	1,238

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	778,8 (3) 0,0050 (5)	M1	0,0278 (4)	0,00462 (7)	0,001079 (16)	0,0339 (5)

3 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,1}$	7614 (10)	0,0050 (5)
$\alpha_{0,0}$	8375,9 (25)	99,9950 (5)

4 Photon Emissions

4.1 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	778,8 (3)	0,0048 (5)

5 Main Production Modes


Daughter of Bi – 213

Descendant of Ac – 225

6 References

- J.V.JELLEY. Can. J. Res. 26A (1948) 255
(Half-life)
- K.VALLI. Ann. Acad. Sci. Fennicae Ser.A VI, No.165 (1964)
(Alpha energies)
- C.-F.LEANG. Thesis Univ.Paris (1969)
(Alpha energies)
- J.D.BOWMAN, R.E.EPPLEY, E.K.HYDE. Phys. Rev. C25 (1982) 941
(Alpha energies)
- M.C.KOUASSI, A.HACHEM, C.ARDISSON, G.ARDISSON. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A280 (1989) 424
(Gamma-ray energies and intensities)
- A.RYTZ. At.Data Nucl.Data Tables 47 (1991) 205
(Evaluation alpha energies)
- J. WAWRYSZCZUK, M.B.YULDASHEV, K.YA. GROMOV, T.M. MUMINOV. Proc. 45th Ann. Conf. Nucl. Spectrosc. Struct. At. Nuclei St.Petersburg (1995) p.107
(Half-life)
- E.SCHÖNFELD, H.JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data)
- J. WAWRYSZCZUK, K.V. KALYAPKIN, M.B. YULDASHEV, K.YA. GROMOV, V.I. FOMINYKH. Bull. Rus. Acad. Sci. Phys. 61 (1997) 25
(Half-life)

- V.G.CHUMIN, J.K. JABBER, K.V. KALYAPKIN, S.A. KUDRYA,V.V. TSUPKO-SITNIKOV, K.YA. GROMOV, V.I. FOMINYKH, T.A. FURYAEV. Bull. Rus. Acad. Sci. Phys. 61 (1997) 1606
(Alpha emission probabilities)
- YA.VAVRYSHCHUK, K.YA.GROMOV, V.B. ZLOKAZOV, V.G.KALINNIKOV,V.A. MOROZOV, N.V. MOROZOVA, V.I. FOMINYKH, V.V. TSUPKO-SITNIKOV, I.N.CHURIN. JINR-P6-97-180 (1997)
(Half-life)
- J.WAWRYSZCZUK, K.YA. GROMOV, V.B. ZLOKAZOV, V.G. KALINNIKOV, V.A.MOROZOV, N.V. MOROZOVA, V.I. FOMINIKH, V.V. TSUPKO-SITNIKOV, I.N.CHURIN. Phys. Atomic Nuclei 61 (1998) 1322
(Half-life)
- V.A.MOROZOV, N.V.MOROZOVA, YU.V.NORSEEV, Zh. SEREETER, V.B.ZLOKAZOV. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A484 (2002) 225
(Half-life)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q)
- HUANG XIAOLONG, WANG BAOSONG. Nuclear Science and Techniques Vol.108 (2007) 261
(Evaluation)
- M.S.BASUNIA. Nucl. Data Sheets 108 (2007) 633
(NDS)





1 Decay Scheme

Pb-214 disintegrates by beta minus emission to excited levels and to the ground state level of Bi-214.
Le plomb 214 se désintègre par émission bêta moins vers des niveaux excités et le niveau fondamental du bismuth 214.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{214}\text{Pb})$:	26,8	(9)	min
$T_{1/2}(^{214}\text{Bi})$:	19,9	(4)	min
$Q^-(^{214}\text{Pb})$:	1019	(11)	keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	lg ft
$\beta_{0,9}^-$	180 (11)	2,762 (22)	Allowed	4,5
$\beta_{0,8}^-$	222 (11)	0,0196 (27)	Allowed	6,9
$\beta_{0,7}^-$	485 (11)	1,047 (17)	1st Forbidden	6,2
$\beta_{0,5}^-$	667 (11)	46,52 (37)	1st Forbidden	5,1
$\beta_{0,4}^-$	729 (11)	41,09 (39)	1st Forbidden	5,2
$\beta_{0,0}^-$	1019 (11)	9,2 (7)	1st Forbidden	6,3

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Bi})$	53,2275 (21)	14,71 (42)	M1 + E2		9,80 (29)	2,32 (7)	12,88 (39)
$\gamma_{(-1,0)}(\text{Bi})$	107,22 (9)	0,0068 (14)					
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Bi})$	137,45 (30)	0,045 (18)					
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Bi})$	141,3 (6)	0,027 (14)					

	Energy keV	$P_{\gamma+ce} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Bi})$	170,07 (6)	0,0146 (27)					
$\gamma_{3,2}(\text{Bi})$	196,17 (10)	0,069 (9)					
$\gamma_{3,1}(\text{Bi})$	205,642 (30)	0,0114 (23)					
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Bi})$	216,47 (7)	0,0100 (23)					
$\gamma_{4,1}(\text{Bi})$	241,997 (3)	13,72 (20)	M1(+E2)	0,724 (22)	0,1250 (38)	0,0295 (9)	0,888 (27)
$\gamma_{3,0}(\text{Bi})$	258,87 (3)	0,924 (13)	M1	0,601 (18)	0,1037 (31)	0,0244 (7)	0,737 (22)
$\gamma_{7,3}(\text{Bi})$	274,80 (5)	0,504 (15)	M1 + E2	0,295 (9)	0,0731 (22)	0,0179 (5)	0,392 (12)
$\gamma_{4,0}(\text{Bi})$	295,224 (2)	27,29 (26)	M1 + E2	0,390 (12)	0,0698 (21)	0,0165 (5)	0,482 (14)
$\gamma_{9,7}(\text{Bi})$	305,26 (3)	0,0324 (22)	[E1]	0,0241 (7)	0,00413 (12)	0,000971 (29)	0,0295 (9)
$\gamma_{6,2}(\text{Bi})$	314,32 (7)	0,077 (6)					
$\gamma_{6,1}(\text{Bi})$	323,83 (4)	0,0287 (32)					
$\gamma_{5,0}(\text{Bi})$	351,932 (2)	46,96 (37)	M1(+ E2)	0,260 (8)	0,0445 (13)	0,01049 (31)	0,319 (10)
$\gamma_{9,6}(\text{Bi})$	462,00 (7)	0,213 (6)					
$\gamma_{7,1}(\text{Bi})$	480,43 (2)	0,3838 (49)	M1(+E2)	0,1132 (34)	0,0192 (6)	0,00452 (14)	0,1384 (42)
$\gamma_{9,5}(\text{Bi})$	487,09 (7)	0,438 (6)	(E1)	0,00871 (26)	0,001423 (43)	0,000333 (10)	0,01058 (32)
$\gamma_{7,0}(\text{Bi})$	533,66 (2)	0,192 (10)	[M1,E2]	0,05 (3)	0,010 (4)	0,0023 (9)	0,06 (4)
$\gamma_{8,3}(\text{Bi})$	538,41 (9)	0,0196 (27)					
$\gamma_{9,4}(\text{Bi})$	543,81 (7)	0,050 (9)	E1 + M2	0,00696 (21)	0,001124 (34)	0,000262 (8)	0,00843 (25)
$\gamma_{9,3}(\text{Bi})$	580,13 (3)	0,372 (6)	(E1)	0,00611 (18)	0,000981 (29)	0,000229 (7)	0,00740 (22)
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Bi})$	765,96 (9)	0,053 (8)					
$\gamma_{9,1}(\text{Bi})$	785,96 (9)	1,068 (13)	E1	0,00341 (10)	0,000533 (16)	0,0001239 (37)	0,00410 (12)
$\gamma_{9,0}(\text{Bi})$	839,00 (4)	0,589 (8)	(E1)	0,00302 (9)	0,000470 (14)	0,0001092 (33)	0,00363 (11)

3 Atomic Data

3.1 Bi

$$\begin{aligned}
 \omega_K &: 0,964 (4) \\
 \bar{\omega}_L &: 0,391 (16) \\
 \bar{\omega}_M &: 0,031 (3) \\
 n_{KL} &: 0,809 (5) \\
 \bar{n}_{LM} &: 1,28
 \end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	74,8157	59,77
K α_1	77,1088	100
K β_3	86,835	}
K β_1	87,344	}
K β_5''	87,862	}
		34,25
K β_2	89,732	}
K β_4	90,074	}
KO _{2,3}	90,421	10,48

	Energy keV	Relative probability
X _L		
L ℓ	9,42	
L α	10,45 – 10,55	
L η	11,35	
L β	12,13 – 13,38	
L γ	14,31 – 16,36	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	57,49 – 63,42	100
KLX	70,02 – 77,10	56,2
KXY	82,45 – 90,52	9,2
Auger L	5,3 – 16,4	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Bi)	5,3 – 16,4	19,8 (3)
e _{AK}	(Bi)		0,80 (9)
	KLL	57,49 – 63,42	}
	KLX	70,02 – 77,10	}
	KXY	82,45 – 90,52	}
ec _{1,0} L	(Bi)	36,8400 – 39,8089	10,39 (31)
ec _{1,0} M	(Bi)	49,2284 – 50,6479	2,46 (8)
ec _{1,0} N	(Bi)	52,2893 – 53,0704	0,641 (20)
ec _{4,1} K	(Bi)	151,471 (3)	5,26 (16)
ec _{3,0} K	(Bi)	168,34 (3)	0,32 (1)
ec _{4,0} K	(Bi)	204,698 (2)	7,22 (23)
ec _{4,1} L	(Bi)	225,610 – 228,578	0,908 (28)
ec _{4,1} M	(Bi)	237,998 – 239,417	0,214 (7)
ec _{4,1} N	(Bi)	241,059 – 241,840	0,0560 (17)
ec _{3,0} L	(Bi)	242,48 – 245,45	0,0551 (17)
ec _{5,0} K	(Bi)	261,406 (2)	9,26 (29)
ec _{4,0} L	(Bi)	278,836 – 281,805	1,291 (40)
ec _{4,0} M	(Bi)	291,225 – 292,644	0,305 (10)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{4,0} N	(Bi)	294,286 - 295,067	0,0797 (25)
ec _{5,0} L	(Bi)	335,544 - 338,513	1,584 (46)
ec _{5,0} M	(Bi)	347,933 - 349,352	0,373 (11)
ec _{5,0} N	(Bi)	350,994 - 351,775	0,0975 (29)
$\beta_{0,9}^-$	max:	180 (11)	2,762 (22)
$\beta_{0,9}^-$	avg:	50 (3)	
$\beta_{0,8}^-$	max:	222 (11)	0,0196 (27)
$\beta_{0,8}^-$	avg:	62 (3)	
$\beta_{0,7}^-$	max:	485 (11)	1,047 (17)
$\beta_{0,7}^-$	avg:	145 (4)	
$\beta_{0,5}^-$	max:	667 (11)	46,52 (37)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	207 (4)	
$\beta_{0,4}^-$	max:	724 (11)	41,09 (39)
$\beta_{0,4}^-$	avg:	227 (4)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	1019 (11)	9,2 (7)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	337 (4)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Bi)	9,42 — 16,36	12,42 (22)
XK α_2	(Bi)	74,8157	6,26 (12) } K α
XK α_1	(Bi)	77,1088	10,47 (20) }
XK β_3	(Bi)	86,835	}
XK β_1	(Bi)	87,344	} 3,59 (9) K' β_1
XK β_5''	(Bi)	87,862	}
XK β_2	(Bi)	89,732	}
XK β_4	(Bi)	90,074	} 1,10 (4) K' β_2
XKO _{2,3}	(Bi)	90,421	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Bi})$	53,2275 (21)	1,060 (7)
$\gamma_{(-1,0)}(\text{Bi})$	107,22 (9)	0,0068 (14)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Bi})$	137,45 (30)	0,045 (18)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Bi})$	141,3 (6)	0,027 (14)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Bi})$	170,07 (6)	0,0146 (27)
$\gamma_{3,2}(\text{Bi})$	196,20 (5)	0,069 (9)
$\gamma_{3,1}(\text{Bi})$	205,68 (9)	0,0114 (23)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Bi})$	216,47 (7)	0,0100 (23)
$\gamma_{4,1}(\text{Bi})$	241,997 (3)	7,268 (22)
$\gamma_{3,0}(\text{Bi})$	258,87 (3)	0,5318 (36)
$\gamma_{7,3}(\text{Bi})$	274,80 (5)	0,362 (10)
$\gamma_{4,0}(\text{Bi})$	295,224 (2)	18,414 (36)
$\gamma_{9,7}(\text{Bi})$	305,26 (3)	0,0315 (21)
$\gamma_{6,2}(\text{Bi})$	314,32 (7)	0,077 (6)
$\gamma_{6,1}(\text{Bi})$	323,83 (4)	0,0287 (32)
$\gamma_{5,0}(\text{Bi})$	351,932 (2)	35,60 (7)
$\gamma_{9,6}(\text{Bi})$	462,00 (7)	0,213 (6)
$\gamma_{7,1}(\text{Bi})$	480,43 (2)	0,3371 (41)
$\gamma_{9,5}(\text{Bi})$	487,09 (7)	0,433 (6)
$\gamma_{7,0}(\text{Bi})$	533,66 (2)	0,182 (6)
$\gamma_{8,3}(\text{Bi})$	538,41 (8)	0,0196 (27)
$\gamma_{9,4}(\text{Bi})$	543,81 (7)	0,050 (9)
$\gamma_{9,3}(\text{Bi})$	580,13 (3)	0,369 (6)
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Bi})$	765,96 (9)	0,053 (8)
$\gamma_{9,1}(\text{Bi})$	785,96 (9)	1,064 (13)
$\gamma_{9,0}(\text{Bi})$	839,04 (9)	0,587 (8)

6 Main Production Modes


$$\begin{cases} \text{Ra} - 226 \text{ decay chain} \\ \text{Possible impurities : Pb} - 210 \end{cases}$$

7 References

- M. CURIE, A. DEBIERNE, A.S. EVE, H. GEIGER, O. HAHN, S.C. LIND, S. MEYER, E. RUTHERFORD, E. SCHWEIDLER. Rev. Mod. Phys. 3 (1931) 427
(Half-life.)
- E.E. BERLOVICH. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 16 (1952) 314
(Beta emission intensity.)
- K. SAGEYAMA. J. Phys. Soc. (Japan) 8 (1953) 689
(Beta emission intensity.)
- H. DANIEL, R. NIERHAUS. Z. Naturforsch. 11a (1956) 212
(Half-life.)

- K.O. NIELSEN, O.B. NIELSEN, M.A. WAGGONER. Nucl. Phys. 2 (1957) 476
(Beta emission intensity.)
- H. DANIEL. Z. Naturforsch. 11a (1958) 759
(Beta emission intensity.)
- G.T. EWAN, J. TAVENDALE. Can. J. Phys. 42 (1964) 2286
(Gamma-ray emission intensities.)
- E.W.A. LINGEMAN, J. KONIJN, P. POLAK, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A133 (1969) 630
(Gamma-ray emission intensities.)
- G. WALLACE, G.E. COOTE. Nucl. Instrum. Methods 74 (1969) 353
(Gamma-ray emission intensities.)
- R.S. MOWATT. Can. J. Phys. 48 (1970) 2606
(Gamma-ray emission probabilities.)
- K.YA. GROMOV, B.M. SABIROV, J.J. URBANETS. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 33 (1970) 1510
(Gamma-ray emission intensities.)
- A. HACHEM. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 281B (1975) 45
(Gamma-ray emission intensities.)
- V. ZOBEL, J. EBERTH, E. EUBE. Nucl. Instrum. Methods 141 (1977) 329
(Gamma-ray emission intensities.)
- F. RÖSEL. At. Data. Nucl. Data Tables 21 (1978) 91
(Theoretical ICC.)
- G. MOUZE. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 292 (1981) 1243
(Gamma-ray emission intensities.)
- M.A. FAROUK, A.M. AL-SORAYA. Nucl. Instrum. Methods 200 (1982) 593
(Gamma-ray emission intensities.)
- H. AKCAY, G. MOUZE, D. MAILLARD, CH. YTHIER. Radiochem. Radioanal. Lett. 51 (1982) 1
(Gamma-ray emission intensities.)
- U. SCHÖTZIG, K. DEBERTIN. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 34 (1983) 533
(Gamma-ray emission intensities.)
- D.G. OLSON. Nucl. Instrum. Methods 206 (1983) 313
(Gamma-ray emission intensities.)
- I. PENEV, W. ANDREJTSCHEFF, CH. PROTOCHRISTOW, ZH. ZELEV. Z. Physik A318 (1984) 213
(Half-life (E=53 keV).)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 55 (1988) 665
(Energy level, spin, parity, multipolarity.)
- G. MOUZE, J.F. COMANDUCCI, C. YTHIER. Rev. Roumaine Phys. 35 (1990) 337
(Gamma-ray emission intensities.)
- G. MOUZE, O. DIALLO, P. BECHLICH, J.F. COMANDUCCI, C. YTHIER. Radiochim. Acta 49 (1990) 13
(Gamma-ray emission intensities.)
- W.J.LIN, G.HARBOTTLE. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 153 (1991) 137
(Gamma-ray emission intensities.)
- O. DIALLO, G. MOUZE, C. YTHIER, J.F. COMANDUCCI. Nuovo Cim. 106A (1993) 1321
(Gamma-ray emission intensities.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 127
(Energy level, spin, parity, multipolarity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- J. MOREL, M. ETCHEVERRY, J.L. PICOL. Appl. Rad. Isotopes 49 (1998) 1387
(Gamma-ray emission intensities.)
- D. SARDARI, T.D. MACMAHON. J. Radioanal. Nucl. Chem. 244 (2000) 463
(Gamma-ray emission intensities.)
- J.U. DELGADO, J. MOREL, M. ETCHEVERRY. Appl. Rad. Isotopes 56 (2002) 137
(Gamma-ray emission intensities.)
- G.L. MOLNAR, Z.S. RÉVAY, T. BELGYA. 11th Int. Symp. On capture gamma-ray spectroscopy, 2-6 sep. 2002, Pruhonice (2002) 522
(Gamma-ray emission intensities.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)

- R.G. HELMER. IAEA - CRP To be published (2003)
(Gamma-ray emission intensities.)
- J. MOREL, S. SPEMAN, M. RASKO, E. TERECHTCHENKO, J.U. DELGADO. Appl. Rad. Isotopes 60 (2004) 341
(Gamma-ray emission intensities.)





1 Decay Scheme

Bi-214 disintegrates by beta minus emissions to the excited levels and to the ground state level of Po-214 (99,979 (13) %) and by alpha emission to the excited levels of Tl-210 (0,0210 (13) %). Some long range alpha emissions from the excited levels of Po-214 were pointed out with an intensity of 3,1 E-3 %.

Le bismuth 214 se désintègre par émission bêta moins vers des niveaux excités et le niveau fondamental de polonium 214 et par émission alpha vers les niveaux excités du thalium 210 (0,0210 (13) %). Des émissions alpha de long parcours provenant des niveaux excités de polonium 214 vers des niveaux du plomb 210, d'intensité de l'ordre de 3,1 E-3 %, ont été mises en évidence.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{214}\text{Bi})$:	19,9	(4)	min
$T_{1/2}(^{214}\text{Po})$:	162,3	(12)	10^{-6} s
$T_{1/2}(^{210}\text{Tl})$:	1,30	(3)	min
$T_{1/2}(^{210}\text{Pb})$:	22,23	(12)	a
$Q^-(^{214}\text{Bi})$:	3270	(11)	keV
$Q^\alpha(^{214}\text{Bi})$:	5621	(3)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,5}$	5035 (3)	0,000052 (3)	45
$\alpha_{0,4}$	5119 (3)	0,000045 (3)	160
$\alpha_{0,3}$	5283 (3)	0,00013 (1)	450
$\alpha_{0,2}$	5373 (9)	0,00125 (7)	130
$\alpha_{0,1}$	5556 (3)	0,0116 (7)	130
$\alpha_{0,0}$	5621 (3)	0,0082 (5)	370
$^*\alpha_{1,0}$	8442 (6)	0,00012	
$^*\alpha_{6,1}$	8694 (6)	0,00006	
$^*\alpha_{2,0}$	9108 (6)	0,00002	

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
${}^*\alpha_{4,0}$	9249 (6)	0,0022	
${}^*\alpha_{6,0}$	9494 (6)	0,00005	
${}^*\alpha_{7,0}$	9563 (8)	0,00002	
${}^*\alpha_{10,0}$	9680 (6)	0,0001	
${}^*\alpha_{14,0}$	9850 (8)	0,00004	
${}^*\alpha_{17,0}$	9981 (6)	0,00012	
${}^*\alpha_{21,0}$	10100 (6)	0,00007	
${}^*\alpha_{24,0}$	10281 (6)	0,00014	
${}^*\alpha_{26,0}$	10339 (8)	0,00002	
${}^*\alpha_{32,0}$	10532 (6)	0,00008	
${}^*\alpha_{38,0}$	10713 (10)	0,00002	

* Transitions α of long range.

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	lg ft
$\beta_{0,80}^-$	86 (11)	0,0011 (5)		6,8
$\beta_{0,79}^-$	99 (11)	0,00014 (9)	1st Forbidden	7,8
$\beta_{0,77}^-$	110 (11)	0,00079 (12)		7,2
$\beta_{0,76}^-$	121 (11)	0,00019		8
$\beta_{0,75}^-$	127 (11)	0,00118 (9)		7,3
$\beta_{0,73}^-$	176 (11)	0,00037 (4)		8,2
$\beta_{0,72}^-$	188 (11)	0,0052 (7)		7,1
$\beta_{0,70}^-$	204 (11)	0,00141 (23)	1st Forbidden	7,8
$\beta_{0,69}^-$	216 (11)	0,030 (5)		6,6
$\beta_{0,65}^-$	256 (11)	0,0252 (24)		6,9
$\beta_{0,62}^-$	270 (11)	0,0160 (16)		7,1
$\beta_{0,61}^-$	284 (11)	0,032 (5)		6,9
$\beta_{0,60}^-$	291 (11)	0,0165 (6)		7,2
$\beta_{0,58}^-$	309 (11)	0,00036 (14)	1st Forbidden	9
$\beta_{0,57}^-$	329 (11)	0,041 (7)		7
$\beta_{0,56}^-$	336 (11)	0,00216 (32)		8,3
$\beta_{0,55}^-$	341 (11)	0,0025 (9)		8,3
$\beta_{0,54}^-$	348 (11)	0,0220 (9)		7,3
$\beta_{0,53}^-$	353 (11)	0,0014 (9)	1st Forbidden	8,6
$\beta_{0,52}^-$	373 (11)	0,0046 (5)	1st Forbidden	8,1
$\beta_{0,51}^-$	376 (11)	0,022 (3)		7,5
$\beta_{0,50}^-$	390 (11)	0,0115 (16)		7,8
$\beta_{0,49}^-$	400 (11)	0,0087 (4)	1st Forbidden	7,9

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,48}^-$	409 (11)	0,0146 (20)		7,6
$\beta_{0,47}^-$	443 (11)	0,00218 (17)		8,7
$\beta_{0,44}^-$	484 (11)	0,0248 (31)		7,8
$\beta_{0,43}^-$	500 (11)	0,038 (5)		7,6
$\beta_{0,42}^-$	541 (11)	0,525 (16)		6,6
$\beta_{0,41}^-$	551 (11)	0,247 (8)		6,9
$\beta_{0,39}^-$	571 (11)	0,026 (4)		8
$\beta_{0,40}^-$	573 (11)	0,0471 (23)	1st Forbidden	7,7
$\beta_{0,38}^-$	575 (11)	0,231 (15)	1st Forbidden	7
$\beta_{0,37}^-$	608 (11)	0,098 (9)		7,5
$\beta_{0,36}^-$	639 (11)	0,0223 (21)		8,2
$\beta_{0,35}^-$	665 (11)	0,058 (4)		7,7
$\beta_{0,34}^-$	710 (11)	0,00018 (9)	1st Forbidden	10,5
$\beta_{0,32}^-$	727 (11)	0,044 (7)	1st Forbidden	8,1
$\beta_{0,31}^-$	764 (11)	0,092 (9)	1st Forbidden	7,9
$\beta_{0,30}^-$	765 (11)	0,169 (10)	1st Forbidden	7,6
$\beta_{0,29}^-$	788 (11)	1,227 (27)		6,8
$\beta_{0,28}^-$	822 (11)	2,76 (6)	Allowed	6,5
$\beta_{0,27}^-$	847 (11)	0,0620 (49)		8,1
$\beta_{0,26}^-$	909 (11)	0,0030 (8)		9,6
$\beta_{0,25}^-$	922 (11)	0,0014 (9)		9,9
$\beta_{0,24}^-$	977 (11)	0,558 (8)	1st Forbidden	7,4
$\beta_{0,23}^-$	1004 (11)	0,187 (12)	1st Forbidden	8
$\beta_{0,21}^-$	1068 (11)	5,642 (43)	1st Forbidden	6,6
$\beta_{0,20}^-$	1077 (11)	0,851 (10)	1st Forbidden	7,4
$\beta_{0,19}^-$	1124 (11)	0,433 (22)	1st Forbidden	7,8
$\beta_{0,18}^-$	1151 (11)	4,339 (18)	1st Forbidden	6,8
$\beta_{0,17}^-$	1182 (11)	0,114 (6)		8,4
$\beta_{0,16}^-$	1253 (11)	2,449 (10)	1st Forbidden	7,2
$\beta_{0,15}^-$	1261 (11)	1,430 (9)	1st Forbidden	7,4
$\beta_{0,14}^-$	1275 (11)	1,171 (18)		7,5
$\beta_{0,13}^-$	1382 (11)	1,584 (10)	1st Forbidden	7,5
$\beta_{0,12}^-$	1423 (11)	8,147 (28)	1st Forbidden	6,9
$\beta_{0,11}^-$	1506 (11)	17,10 (8)	1st Forbidden	6,6
$\beta_{0,10}^-$	1529 (11)	0,116 (16)	1st Forbidden	8,8
$\beta_{0,9}^-$	1540 (11)	17,494 (36)	1st Forbidden	6,7
$\beta_{0,8}^-$	1557 (11)	0,170 (16)		8,7
$\beta_{0,7}^-$	1609 (11)	0,65 (6)	1st Forbidden	8,2
$\beta_{0,6}^-$	1727 (11)	3,12 (4)	1st Forbidden	7,6
$\beta_{0,5}^-$	1857 (11)	0,396 (46)	1st Forbidden	8,6
$\beta_{0,4}^-$	1894 (11)	7,45 (5)	1st Forbidden	7,4
$\beta_{0,1}^-$	2661 (11)	0,62 (20)	1st Forbidden	9
$\beta_{0,0}^-$	3270 (11)	19,67 (20)	1st Forbidden	7,9

2.3 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Tl})$	62,5 (10)	0,0116 (7)	(M1)				
$\gamma_{2,1}(\text{Tl})$	191,1 (18)	0,00125 (7)					
$\gamma_{11,6}(\text{Po})$	221 (1)	0,106 (31)	[M1,E2]	0,5 (5)	0,158 (10)	0,0394 (9)	0,8 (5)
$\gamma_{(-1,0)}(\text{Po})$	230 (1)	0,0031 (11)		0,0474 (9)	0,00848 (15)	0,00200 (4)	0,0585 (11)
$\gamma_{16,11}(\text{Po})$	252,80 (6)	0,0212 (33)	[M1]	0,658 (10)	0,1154 (17)	0,0272 (4)	0,809 (12)
$\gamma_{6,3}(\text{Po})$	268,614 (26)	0,0168 (19)	[E1]	0,0329 (5)	0,00577 (9)	0,001359 (20)	0,0405 (6)
$\gamma_{29,22}(\text{Po})$	273,80 (5)	0,120 (8)					
$\gamma_{42,28}(\text{Po})$	280,95 (5)	0,062 (6)					
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Po})$	304,2 (2)	0,033 (6)		0,23 (17)	0,055 (14)	0,014 (3)	0,30 (19)
$\gamma_{14,7}(\text{Po})$	333,350 (42)	0,0646 (41)	[E1]	0,0202 (3)	0,00345 (5)	0,000811 (12)	0,0247 (4)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Po})$	334,78 (8)	0,033 (5)					
$\gamma_{11,5}(\text{Po})$	349,009 (24)	0,164 (43)	[M1]	0,272 (4)	0,0475 (7)	0,01118 (16)	0,335 (5)
$\gamma_{11,4}(\text{Po})$	386,823 (18)	0,343 (30)	[M1,E2]	0,12 (9)	0,027 (10)	0,0065 (20)	0,16 (10)
$\gamma_{18,9}(\text{Po})$	388,94 (5)	0,493 (6)	(M1)	0,203 (3)	0,0353 (5)	0,00832 (12)	0,250 (4)
$\gamma_{29,17}(\text{Po})$	394,05 (8)	0,0127 (18)					
$\gamma_{35,22}(\text{Po})$	396,01 (8)	0,0259 (18)					
$\gamma_{2,1}(\text{Po})$	405,74 (4)	0,180 (7)	[E2]	0,0344 (5)	0,01478 (21)	0,00377 (6)	0,0541 (8)
$\gamma_{28,14}(\text{Po})$	452,92 (10)	0,034 (5)	[M1,E2]	0,08 (6)	0,017 (7)	0,0040 (15)	0,10 (7)
$\gamma_{9,3}(\text{Po})$	454,850 (26)	0,292 (5)	[E1]	0,01028 (15)	0,001706 (24)	0,000399 (6)	0,01251 (18)
$\gamma_{21,10}(\text{Po})$	461,15 (20)	0,067 (9)	[M1]	0,1289 (19)	0,0223 (4)	0,00525 (8)	0,1581 (23)
$\gamma_{12,4}(\text{Po})$	469,756 (18)	0,145 (18)	[M1,E2]	0,07 (5)	0,015 (6)	0,0036 (14)	0,09 (6)
$\gamma_{21,9}(\text{Po})$	474,52 (5)	0,100 (9)	[M1,E2]	0,07 (5)	0,015 (6)	0,0035 (14)	0,09 (6)
$\gamma_{38,22}(\text{Po})$	485,92 (11)	0,021 (4)					
$\gamma_{29,14}(\text{Po})$	487,95 (13)	0,028 (9)	[E1]	0,00889 (13)	0,001463 (21)	0,000342 (5)	0,01080 (16)
$\gamma_{39,21}(\text{Po})$	494,2 (4)	0,011 (3)					
$\gamma_{31,15}(\text{Po})$	496,90 (18)	0,0068 (18)					
$\gamma_{23,11}(\text{Po})$	501,96 (15)	0,0181 (22)					
$\gamma_{42,22}(\text{Po})$	519,90 (5)	0,0166 (17)					
$\gamma_{42,21}(\text{Po})$	524,6 (2)	0,0169 (17)					
$\gamma_{6,2}(\text{Po})$	528 (1)	0,0112 (13)	[E2]	0,0198 (3)	0,00633 (10)	0,001584 (24)	0,0282 (5)
$\gamma_{23,9}(\text{Po})$	536,77 (4)	0,061 (8)					
$\gamma_{21,7}(\text{Po})$	543,0 (2)	0,093 (23)	[M1,E2]	0,05 (4)	0,010 (5)	0,0024 (10)	0,06 (4)
$\gamma_{22,7}(\text{Po})$	547,6 (3)	0,034 (3)					
$\gamma_{62,28}(\text{Po})$	551,9 (8)	0,0055 (14)					
$\gamma_{12,3}(\text{Po})$	572,76 (7)	0,072 (8)	[E1]	0,00643 (9)	0,001042 (15)	0,000243 (4)	0,00779 (11)
$\gamma_{15,5}(\text{Po})$	595,32 (7)	0,0183 (17)	[M1,E2]	0,04 (3)	0,008 (4)	0,0019 (8)	0,05 (3)
$\gamma_{41,18}(\text{Po})$	600,0 (5)	0,008 (4)					
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	609,316 (7)	46,42 (19)	E2	0,01487 (21)	0,00416 (6)	0,001030 (15)	0,0204 (3)
$\gamma_{13,3}(\text{Po})$	615,53 (10)	0,055 (7)	[E1]	0,00557 (8)	0,000898 (13)	0,000209 (3)	0,00674 (10)
$\gamma_{14,4}(\text{Po})$	617,0 (2)	0,027 (5)	[E1]	0,00555 (8)	0,000894 (13)	0,000209 (3)	0,00672 (10)
$\gamma_{51,23}(\text{Po})$	626,4 (6)	0,0041 (14)					
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Po})$	630,79 (7)	0,0166 (14)					
$\gamma_{15,4}(\text{Po})$	633,14 (10)	0,057 (3)	[M1,E2]	0,035 (21)	0,007 (3)	0,0016 (7)	0,044 (25)
$\gamma_{29,12}(\text{Po})$	634,72 (21)	0,0067 (24)	[M1,E2]	0,035 (21)	0,007 (3)	0,0016 (7)	0,043 (25)
$\gamma_{16,4}(\text{Po})$	639,62 (10)	0,035 (5)	[E2]	0,01351 (19)	0,00363 (5)	0,000895 (13)	0,0183 (3)
$\gamma_{20,6}(\text{Po})$	649,19 (7)	0,056 (7)	[M1,E2]	0,033 (20)	0,006 (3)	0,0015 (7)	0,041 (24)
$\gamma_{27,11}(\text{Po})$	658,7 (2)	0,017 (4)					
$\gamma_{21,6}(\text{Po})$	661,1 (2)	0,056 (4)	[M1,E2]	0,031 (19)	0,006 (3)	0,0014 (6)	0,039 (22)
$\gamma_{3,1}(\text{Po})$	665,445 (23)	1,539 (7)	E1	0,00479 (7)	0,000767 (11)	0,000179 (3)	0,00579 (9)
$\gamma_{38,16}(\text{Po})$	677,41 (15)	0,0055 (23)					
$\gamma_{28,11}(\text{Po})$	683,22 (6)	0,084 (6)	[E1]	0,00456 (7)	0,000728 (11)	0,00016960 (24)	0,00551 (8)
$\gamma_{39,15}(\text{Po})$	687,6 (3)	0,0066 (14)					
$\gamma_{27,9}(\text{Po})$	693,3 (5)	0,0059 (15)					
$\gamma_{8,2}(\text{Po})$	697,88 (20)	0,069 (4)	[M1,E2]	0,027 (16)	0,0051 (23)	0,0012 (6)	0,034 (19)
$\gamma_{38,14}(\text{Po})$	699,82 (18)	0,016 (5)					
$\gamma_{18,5}(\text{Po})$	703,11 (4)	0,504 (12)	[M1]	0,0424 (6)	0,00724 (11)	0,001702 (24)	0,0519 (8)
$\gamma_{28,10}(\text{Po})$	704,9 (3)	0,051 (10)	[E1]	0,00429 (6)	0,000684 (10)	0,0001593 (23)	0,00519 (8)

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{41,15}(\text{Po})$	708,8 (3)	0,0119 (20)					
$\gamma_{17,4}(\text{Po})$	710,73 (10)	0,076 (4)					
$\gamma_{14,3}(\text{Po})$	719,869 (37)	0,399 (10)	E2	0,01075 (15)	0,00264 (4)	0,000646 (9)	0,01424 (20)
$\gamma_{23,6}(\text{Po})$	722,98 (12)	0,037 (7)					
$\gamma_{42,14}(\text{Po})$	733,80 (15)	0,038 (3)					
$\gamma_{18,4}(\text{Po})$	740,73 (18)	0,0440 (23)	[M1,E2]	0,024 (14)	0,0044 (20)	0,0010 (5)	0,029 (16)
$\gamma_{29,9}(\text{Po})$	752,84 (3)	0,130 (8)	[M1,E2]	0,023 (13)	0,0042 (19)	0,0010 (5)	0,028 (16)
$\gamma_{4,1}(\text{Po})$	768,359 (14)	4,969 (19)	M1 + E2	0,0122 (18)	0,0026 (3)	0,00063 (6)	0,0157 (21)
$\gamma_{28,7}(\text{Po})$	786,1 (4)	0,31 (5)	[E1]	0,00350 (5)	0,000553 (8)	0,0001285 (18)	0,00422 (6)
$\gamma_{21,5}(\text{Po})$	788,6 (5)	0,016 (5)	[M1]	0,0315 (5)	0,00536 (8)	0,001258 (18)	0,0385 (6)
$\gamma_{5,1}(\text{Po})$	806,173 (20)	1,276 (6)	E2	0,00867 (13)	0,00197 (3)	0,000480 (7)	0,01127 (16)
$\gamma_{20,4}(\text{Po})$	814,885 (10)	0,0399 (31)	[M1,E2]	0,019 (11)	0,0034 (15)	0,0008 (4)	0,023 (13)
$\gamma_{29,7}(\text{Po})$	821,18 (3)	0,172 (10)	M1	0,0283 (4)	0,00482 (7)	0,001131 (16)	0,0346 (5)
$\gamma_{21,4}(\text{Po})$	826,46 (20)	0,133 (11)	M1	0,0279 (4)	0,00474 (7)	0,001113 (16)	0,0341 (5)
$\gamma_{12,2}(\text{Po})$	832,38 (11)	0,0354 (20)	[E2]	0,00816 (12)	0,00182 (4)	0,000442 (7)	0,01057 (15)
$\gamma_{38,12}(\text{Po})$	847,16 (11)	0,016 (6)					
$\gamma_{19,3}(\text{Po})$	873,02 (19)	0,019 (3)					
$\gamma_{24,5}(\text{Po})$	878,03 (12)	0,0120 (28)	[M1,E2]	0,016 (9)	0,0028 (13)	0,0007 (3)	0,019 (10)
$\gamma_{28,6}(\text{Po})$	904,29 (10)	0,066 (8)	[E1]	0,00271 (4)	0,000423 (6)	0,0000983 (14)	0,00326 (5)
$\gamma_{24,4}(\text{Po})$	915,74 (15)	0,023 (5)	[M1,E2]	0,014 (8)	0,0025 (11)	0,0006 (3)	0,017 (9)
$\gamma_{20,3}(\text{Po})$	917,8 (3)	0,005 (3)	[E1]	0,00263 (4)	0,000411 (6)	0,0000956 (14)	0,00317 (5)
$\gamma_{38,11}(\text{Po})$	930,2 (2)	0,043 (8)					
$\gamma_{6,1}(\text{Po})$	934,059 (16)	3,173 (11)	M1 + E2	0,0192 (8)	0,00327 (13)	0,00077 (3)	0,0234 (10)
$\gamma_{29,6}(\text{Po})$	939,6 (5)	0,016 (4)	[M1,E2]	0,013 (7)	0,0024 (11)	0,00056 (24)	0,016 (8)
$\gamma_{35,7}(\text{Po})$	943,34 (12)	0,017 (3)					
$\gamma_{37,8}(\text{Po})$	949,8 (5)	0,0055 (23)					
$\gamma_{38,10}(\text{Po})$	952,2 (8)	0,0059 (23)					
$\gamma_{30,6}(\text{Po})$	961,61 (17)	0,0101 (14)					
$\gamma_{42,11}(\text{Po})$	964,08 (3)	0,363 (12)					
$\gamma_{41,10}(\text{Po})$	976,18 (12)	0,0151 (21)					
$\gamma_{23,3}(\text{Po})$	991,49 (19)	0,011 (3)	[M1,E2]	0,012 (6)	0,0021 (9)	0,00049 (21)	0,014 (7)
$\gamma_{48,12}(\text{Po})$	1013,8 (2)	0,0087 (19)					
$\gamma_{44,11}(\text{Po})$	1021,0 (5)	0,016 (3)					
$\gamma_{28,5}(\text{Po})$	1032,37 (8)	0,061 (4)	[E1]	0,00213 (3)	0,000331 (5)	0,0000768 (11)	0,00257 (4)
$\gamma_{39,7}(\text{Po})$	1038,0 (3)	0,0086 (15)					
$\gamma_{27,4}(\text{Po})$	1045,6 (2)	0,023 (3)					
$\gamma_{7,1}(\text{Po})$	1051,964 (31)	0,328 (8)	[M1,E2]	0,010 (5)	0,0018 (8)	0,00042 (17)	0,012 (6)
$\gamma_{42,7}(\text{Po})$	1067,2 (3)	0,024 (7)					
$\gamma_{28,4}(\text{Po})$	1069,96 (8)	0,272 (10)	[E1]	0,00200 (3)	0,000310 (5)	0,0000719 (10)	0,00241 (4)
$\gamma_{8,1}(\text{Po})$	1103,61 (20)	0,107 (15)	[M1,E2]	0,009 (5)	0,0016 (7)	0,00037 (15)	0,011 (5)
$\gamma_{29,4}(\text{Po})$	1104,79 (19)	0,074 (14)	[M1,E2]	0,009 (5)	0,0016 (7)	0,00037 (15)	0,011 (5)
$\gamma_{37,6}(\text{Po})$	1118,9 (5)	0,010 (4)					
$\gamma_{9,1}(\text{Po})$	1120,295 (15)	15,14 (3)	M1 + E2	0,01246 (19)	0,00210 (3)	0,000494 (8)	0,01522 (23)
$\gamma_{31,4}(\text{Po})$	1130,29 (19)	0,036 (3)					
$\gamma_{10,1}(\text{Po})$	1133,664 (31)	0,255 (8)	[E2]	0,00462 (7)	0,000888 (13)	0,000212 (3)	0,00578 (8)
$\gamma_{11,1}(\text{Po})$	1155,182 (16)	1,657 (7)	M1+E2	0,0110 (3)	0,00187 (5)	0,000438 (11)	0,0135 (4)
$\gamma_{32,4}(\text{Po})$	1167,3 (2)	0,0123 (17)					
$\gamma_{28,3}(\text{Po})$	1172,98 (10)	0,055 (7)	[E2]	0,00434 (6)	0,000824 (12)	0,000196 (3)	0,00542 (8)
$\gamma_{29,3}(\text{Po})$	1207,70 (3)	0,455 (12)	[E1]	0,001622 (23)	0,000249 (4)	0,0000577 (8)	0,00196 (3)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Po})$	1226,7 (3)	0,018 (8)					
$\gamma_{30,3}(\text{Po})$	1230,6 (4)	0,007 (5)					
$\gamma_{12,1}(\text{Po})$	1238,115 (12)	5,901 (14)	M1 + E2	0,00983 (14)	0,001651 (24)	0,000387 (6)	0,01200 (17)
$\gamma_{13,1}(\text{Po})$	1280,97 (2)	1,451 (6)	M1	0,00901 (13)	0,001513 (22)	0,000355 (5)	0,01101 (16)
$\gamma_{37,4}(\text{Po})$	1284 (1)	0,013 (6)					
$\gamma_{41,5}(\text{Po})$	1303,76 (8)	0,105 (5)					
$\gamma_{38,4}(\text{Po})$	1316,96 (15)	0,077 (7)					
$\gamma_{35,3}(\text{Po})$	1330,0 (2)	0,0120 (14)					
$\gamma_{41,4}(\text{Po})$	1341,49 (16)	0,0214 (27)					
$\gamma_{42,4}(\text{Po})$	1351 (1)	0,0042 (11)					

	Energy keV	$P_{\gamma+ce} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{65,7}(\text{Po})$	1353,4 (8)	0,0036 (9)					
$\gamma_{4,0}(\text{Po})$	1377,675 (12)	3,984 (11)	E2	0,00324 (5)	0,000585 (9)	0,0001385 (20)	0,00404 (6)
$\gamma_{14,1}(\text{Po})$	1385,314 (31)	0,796 (5)	[E1]	0,001281 (18)	0,000196 (3)	0,0000453 (7)	0,001631 (23)
$\gamma_{43,4}(\text{Po})$	1392,5 (4)	0,0087 (19)					
$\gamma_{15,1}(\text{Po})$	1401,494 (41)	1,337 (7)	(M1 + E2)	0,0043 (7)	0,00074 (11)	0,00017 (3)	0,0053 (9)
$\gamma_{16,1}(\text{Po})$	1407,98 (4)	2,398 (8)	(E2)	0,00312 (5)	0,000559 (8)	0,0001323 (19)	0,00389 (6)
$\gamma_{38,3}(\text{Po})$	1419,7 (3)	0,0055 (10)					
$\gamma_{65,6}(\text{Po})$	1470,9 (3)	0,0094 (13)					
$\gamma_{17,1}(\text{Po})$	1479,15 (14)	0,051 (4)					
$\gamma_{18,1}(\text{Po})$	1509,236 (15)	2,144 (10)	M1+E2	0,00591 (9)	0,000988 (14)	0,000232 (4)	0,00732 (11)
$\gamma_{51,4}(\text{Po})$	1515,5 (3)	0,0072 (21)					
$\gamma_{19,1}(\text{Po})$	1538,46 (6)	0,401 (22)					
$\gamma_{6,0}(\text{Po})$	1543,375 (14)	0,303 (13)	[E2]	0,00265 (4)	0,000463 (7)	0,0001093 (16)	0,00333 (5)
$\gamma_{20,1}(\text{Po})$	1583,244 (40)	0,712 (5)	M1 +E2	0,00513 (14)	0,000858 (23)	0,000201 (6)	0,00642 (18)
$\gamma_{21,1}(\text{Po})$	1594,81 (8)	0,276 (15)	[M1]	0,00514 (8)	0,000859 (12)	0,000201 (3)	0,00644 (9)
$\gamma_{22,1}(\text{Po})$	1599,31 (6)	0,322 (15)					
$\gamma_{65,4}(\text{Po})$	1636,3 (2)	0,0111 (16)					
$\gamma_{23,1}(\text{Po})$	1657,00 (19)	0,047 (5)					
$\gamma_{7,0}(\text{Po})$	1661,28 (6)	1,051 (9)	E2	0,00232 (4)	0,000399 (6)	0,0000940 (14)	0,00296 (5)
$\gamma_{57,3}(\text{Po})$	1665,8 (2)	0,015 (6)					
$\gamma_{24,1}(\text{Po})$	1683,99 (4)	0,217 (3)					
$\gamma_{61,3}(\text{Po})$	1711,0 (8)	0,023 (5)					
$\gamma_{9,0}(\text{Po})$	1729,611 (13)	2,852 (10)	E2	0,00216 (3)	0,000368 (6)	0,0000866 (13)	0,00278 (4)
$\gamma_{26,1}(\text{Po})$	1751,4 (8)	0,0009 (5)					
$\gamma_{11,0}(\text{Po})$	1764,498 (14)	15,39 (5)	M1	0,00397 (6)	0,000661 (10)	0,0001548 (22)	0,00511 (8)
$\gamma_{27,1}(\text{Po})$	1813,73 (14)	0,0108 (9)					
$\gamma_{28,1}(\text{Po})$	1838,36 (5)	0,343 (10)					
$\gamma_{12,0}(\text{Po})$	1847,431 (25)	2,025 (12)					
$\gamma_{29,1}(\text{Po})$	1873,16 (6)	0,212 (8)					
$\gamma_{13,0}(\text{Po})$	1890,29 (15)	0,078 (4)					
$\gamma_{30,1}(\text{Po})$	1895,92 (14)	0,146 (8)					
$\gamma_{31,1}(\text{Po})$	1898,7 (4)	0,049 (8)					
$\gamma_{32,1}(\text{Po})$	1935,6 (2)	0,032 (7)					
$\gamma_{35,1}(\text{Po})$	1994,6 (6)	0,0024 (5)					
$\gamma_{15,0}(\text{Po})$	2010,81 (12)	0,0434 (17)					
$\gamma_{36,1}(\text{Po})$	2021,6 (2)	0,0214 (21)					
$\gamma_{37,1}(\text{Po})$	2052,95 (12)	0,069 (4)					
$\gamma_{38,1}(\text{Po})$	2085,1 (2)	0,0082 (5)					
$\gamma_{40,1}(\text{Po})$	2089,7 (2)	0,0443 (22)					
$\gamma_{41,1}(\text{Po})$	2109,94 (12)	0,084 (3)					
$\gamma_{18,0}(\text{Po})$	2118,552 (30)	1,162 (5)	M1	0,00248 (4)	0,000412 (6)	0,0000964 (14)	0,00356 (5)
$\gamma_{19,0}(\text{Po})$	2147,9 (2)	0,0134 (13)					
$\gamma_{43,1}(\text{Po})$	2160,4 (3)	0,007 (5)					
$\gamma_{44,1}(\text{Po})$	2176,5 (2)	0,0033 (6)					
$\gamma_{20,0}(\text{Po})$	2192,56 (16)	0,038 (3)					
$\gamma_{21,0}(\text{Po})$	2204,21 (4)	4,929 (23)	M1	0,00224 (4)	0,000372 (6)	0,0000870 (13)	0,00333 (5)
$\gamma_{48,1}(\text{Po})$	2251,6 (2)	0,0055 (5)					
$\gamma_{49,1}(\text{Po})$	2260,3 (2)	0,0087 (4)					
$\gamma_{23,0}(\text{Po})$	2266,52 (19)	0,0165 (8)					
$\gamma_{50,1}(\text{Po})$	2270,9 (4)	0,0014 (3)					
$\gamma_{51,1}(\text{Po})$	2284,3 (2)	0,0050 (4)					
$\gamma_{52,1}(\text{Po})$	2287,65 (23)	0,0046 (5)					
$\gamma_{24,0}(\text{Po})$	2293,40 (12)	0,306 (4)					
$\gamma_{53,1}(\text{Po})$	2310,2 (3)	0,0014 (9)					
$\gamma_{54,1}(\text{Po})$	2312,4 (2)	0,0086 (8)					
$\gamma_{55,1}(\text{Po})$	2319,3 (3)	0,0014 (9)					
$\gamma_{56,1}(\text{Po})$	2325,0 (3)	0,0017 (3)					
$\gamma_{57,1}(\text{Po})$	2331,3 (2)	0,026 (4)					
$\gamma_{25,0}(\text{Po})$	2348,3 (13)	0,0014 (9)					

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{58,1}(\text{Po})$	2353,5 (7)	0,00036 (14)					
$\gamma_{26,0}(\text{Po})$	2361,00 (19)	0,0021 (6)					
$\gamma_{60,1}(\text{Po})$	2369,0 (4)	0,0028 (4)					
$\gamma_{61,1}(\text{Po})$	2376,9 (2)	0,0086 (8)					
$\gamma_{62,1}(\text{Po})$	2390,8 (2)	0,00156 (14)					
$\gamma_{65,1}(\text{Po})$	2405,1 (5)	0,0011 (7)					
$\gamma_{27,0}(\text{Po})$	2423,27 (13)	0,0048 (6)					
$\gamma_{69,1}(\text{Po})$	2444,7 (8)	0,008 (4)					
$\gamma_{28,0}(\text{Po})$	2447,86 (10)	1,550 (7)	E1	0,000503 (7)	0,0000751 (11)	0,00001735 (25)	0,001424 (20)
$\gamma_{70,1}(\text{Po})$	2459,0 (8)	0,00141 (23)					
$\gamma_{29,0}(\text{Po})$	2482,8 (4)	0,00096 (18)					
$\gamma_{30,0}(\text{Po})$	2505,4 (2)	0,0056 (6)					
$\gamma_{77,1}(\text{Po})$	2550,7 (7)	0,00032 (9)					
$\gamma_{34,0}(\text{Po})$	2562,0 (6)	0,00018 (9)					
$\gamma_{79,1}(\text{Po})$	2564,0 (6)	0,00014 (9)					
$\gamma_{35,0}(\text{Po})$	2604,6 (5)	0,00036 (9)					
$\gamma_{36,0}(\text{Po})$	2630,9 (3)	0,00086 (23)					
$\gamma_{37,0}(\text{Po})$	2662,5 (10)	0,000200 (41)					
$\gamma_{38,0}(\text{Po})$	2694,8 (2)	0,033 (3)					
$\gamma_{40,0}(\text{Po})$	2699,4 (3)	0,00282 (23)					
$\gamma_{41,0}(\text{Po})$	2719,3 (2)	0,00170 (17)					
$\gamma_{43,0}(\text{Po})$	2769,9 (2)	0,0225 (8)					
$\gamma_{44,0}(\text{Po})$	2785,9 (2)	0,0055 (5)					
$\gamma_{47,0}(\text{Po})$	2827,0 (2)	0,00218 (17)					
$\gamma_{48,0}(\text{Po})$	2861,1 (4)	0,00041 (13)					
$\gamma_{50,0}(\text{Po})$	2880,3 (2)	0,0101 (16)					
$\gamma_{51,0}(\text{Po})$	2893,6 (2)	0,0057 (5)					
$\gamma_{54,0}(\text{Po})$	2921,9 (2)	0,0134 (5)					
$\gamma_{55,0}(\text{Po})$	2928,6 (3)	0,00109 (9)					
$\gamma_{56,0}(\text{Po})$	2934,6 (3)	0,00046 (12)					
$\gamma_{60,0}(\text{Po})$	2978,9 (2)	0,0137 (4)					
$\gamma_{62,0}(\text{Po})$	3000,0 (2)	0,0089 (7)					
$\gamma_{69,0}(\text{Po})$	3053,9 (2)	0,022 (3)					
$\gamma_{72,0}(\text{Po})$	3081,7 (3)	0,0052 (7)					
$\gamma_{73,0}(\text{Po})$	3094,0 (4)	0,00037 (4)					
$\gamma_{75,0}(\text{Po})$	3142,6 (4)	0,00118 (9)					
$\gamma_{76,0}(\text{Po})$	3149,0 (5)	0,00019					
$\gamma_{77,0}(\text{Po})$	3160,6 (6)	0,00047 (8)					
$\gamma_{80,0}(\text{Po})$	3183,6 (4)	0,0011 (5)					

3 Atomic Data

3.1 Po

$$\begin{aligned}
 \omega_K &: 0,97 & (2) \\
 \bar{\omega}_L &: 0,43 & (4) \\
 \bar{\omega}_M &: 0,0328 \\
 n_{KL} &: 0,805 & (40) \\
 \bar{n}_{LM} &: 1,267
 \end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	76,8641	59,7
K α_1	79,2912	100
K β_3	89,2579	}
K β_1	89,8098	}
K β_5''	90,3073	}
K β_5'	90,4215	}
K β_2	92,32	}
K β_4	92,6199	}
KO _{2,3}	92,983	}
X _L		
L ℓ	9,66	
L α	11,016 – 11,13	
L η	12,085	
L β	12,824 – 14,248	
L γ	15,251 – 16,21	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	58,97 – 65,20	100
KLX	71,93 – 76,60	56,5
KXY	84,72 – 93,04	9,27
Auger L	5,4 – 16,8	

3.2 Pb

ω_K : 0,968 (13)
 $\bar{\omega}_L$: 0,40 (4)
 n_{KL} : 0,806 (40)

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,5}$	4941 (3)	0,000052 (3)
$\alpha_{0,4}$	5023 (3)	0,000045 (3)
$\alpha_{0,3}$	5184 (3)	0,00013 (1)
$\alpha_{0,2}$	5273 (9)	0,00125 (7)
$\alpha_{0,1}$	5452 (3)	0,0116 (7)
$\alpha_{0,0}$	5516 (3)	0,0082 (5)
$^*\alpha_{1,0}$	8287 (6)	0,00012
$^*\alpha_{6,1}$	8430 (6)	0,00006
$^*\alpha_{2,0}$	8950 (6)	0,00002
$^*\alpha_{4,0}$	9080 (6)	0,0022
$^*\alpha_{6,0}$	9320 (6)	0,00005
$^*\alpha_{7,0}$	9378 (8)	0,00002
$^*\alpha_{10,0}$	9500 (6)	0,0001
$^*\alpha_{14,0}$	9670 (8)	0,00004
$^*\alpha_{17,0}$	9802 (6)	0,00012
$^*\alpha_{21,0}$	9907 (6)	0,00007
$^*\alpha_{24,0}$	10082 (6)	0,00014
$^*\alpha_{26,0}$	10150 (8)	0,00002
$^*\alpha_{32,0}$	10332 (6)	0,00008
$^*\alpha_{38,0}$	10505 (10)	0,00002

* α of long range.

5 Electron Emissions

		Energy keV			Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Po)	5,4	-	16,8	0,934 (16)
e _{AK}	(Po)				0,053 (7)
	KLL	58,97	-	65,20	}
	KLX	71,93	-	76,60	}
	KXY	84,72	-	93,04	}
ec _{18,9} K	(Po)	295,84	(5)		0,0800 (16)
ec _{1,0} K	(Po)	516,216	(7)		0,676 (10)
ec _{1,0} L	(Po)	592,388	-	595,510	0,1892 (28)
ec _{4,1} K	(Po)	675,259	(14)		0,060 (9)
ec _{6,1} K	(Po)	840,959	(16)		0,0595 (25)
ec _{9,1} K	(Po)	1027,195	(15)		0,1858 (29)
ec _{12,1} K	(Po)	1145,015	(12)		0,0573 (8)
ec _{11,0} K	(Po)	1671,398	(14)		0,0608 (9)
$\beta_{0,80}^-$	max:	86	(11)		0,0011 (5)
$\beta_{0,80}^-$	avg:	23	(3)		
$\beta_{0,79}^-$	max:	97	(11)		0,00014 (9)
$\beta_{0,79}^-$	avg:	26	(3)		
$\beta_{0,77}^-$	max:	110	(11)		0,00079 (12)
$\beta_{0,77}^-$	avg:	29	(3)		
$\beta_{0,76}^-$	max:	121	(11)		0,00019
$\beta_{0,76}^-$	avg:	32	(3)		
$\beta_{0,75}^-$	max:	127	(11)		0,00118 (9)
$\beta_{0,75}^-$	avg:	34	(3)		
$\beta_{0,73}^-$	max:	176	(11)		0,00037 (4)
$\beta_{0,73}^-$	avg:	48	(3)		
$\beta_{0,72}^-$	max:	188	(11)		0,0052 (7)
$\beta_{0,72}^-$	avg:	51	(3)		
$\beta_{0,70}^-$	max:	202	(11)		0,00141 (23)
$\beta_{0,70}^-$	avg:	55	(3)		
$\beta_{0,69}^-$	max:	216	(11)		0,030 (5)
$\beta_{0,69}^-$	avg:	59	(3)		
$\beta_{0,65}^-$	max:	256	(11)		0,0252 (24)
$\beta_{0,65}^-$	avg:	71	(3)		
$\beta_{0,62}^-$	max:	270	(11)		0,0160 (16)
$\beta_{0,62}^-$	avg:	75	(3)		
$\beta_{0,61}^-$	max:	284	(11)		0,032 (5)
$\beta_{0,61}^-$	avg:	80	(3)		
$\beta_{0,60}^-$	max:	291	(11)		0,0165 (6)
$\beta_{0,60}^-$	avg:	82	(3)		

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,58}^-$	max:	307	(11) 0,00036 (14)
$\beta_{0,58}^-$	avg:	87	(3)
$\beta_{0,57}^-$	max:	329	(11) 0,041 (7)
$\beta_{0,57}^-$	avg:	93	(3)
$\beta_{0,56}^-$	max:	336	(11) 0,00216 (32)
$\beta_{0,56}^-$	avg:	95	(3)
$\beta_{0,55}^-$	max:	341	(11) 0,0025 (9)
$\beta_{0,55}^-$	avg:	97	(3)
$\beta_{0,54}^-$	max:	348	(11) 0,0220 (9)
$\beta_{0,54}^-$	avg:	99	(3)
$\beta_{0,53}^-$	max:	350	(11) 0,0014 (9)
$\beta_{0,53}^-$	avg:	100	(3)
$\beta_{0,52}^-$	max:	373	(11) 0,0046 (5)
$\beta_{0,52}^-$	avg:	107	(3)
$\beta_{0,51}^-$	max:	376	(11) 0,022 (3)
$\beta_{0,51}^-$	avg:	108	(3)
$\beta_{0,50}^-$	max:	390	(11) 0,0115 (16)
$\beta_{0,50}^-$	avg:	113	(3)
$\beta_{0,49}^-$	max:	400	(11) 0,0087 (4)
$\beta_{0,49}^-$	avg:	116	(3)
$\beta_{0,48}^-$	max:	409	(11) 0,0146 (20)
$\beta_{0,48}^-$	avg:	119	(4)
$\beta_{0,47}^-$	max:	443	(11) 0,00218 (17)
$\beta_{0,47}^-$	avg:	130	(4)
$\beta_{0,44}^-$	max:	484	(11) 0,0248 (31)
$\beta_{0,44}^-$	avg:	143	(4)
$\beta_{0,43}^-$	max:	500	(11) 0,038 (5)
$\beta_{0,43}^-$	avg:	149	(4)
$\beta_{0,42}^-$	max:	541	(11) 0,525 (16)
$\beta_{0,42}^-$	avg:	162	(4)
$\beta_{0,41}^-$	max:	551	(11) 0,247 (8)
$\beta_{0,41}^-$	avg:	166	(4)
$\beta_{0,40}^-$	max:	571	(11) 0,0471 (23)
$\beta_{0,40}^-$	avg:	172	(4)
$\beta_{0,39}^-$	max:	571	(11) 0,026 (4)
$\beta_{0,39}^-$	avg:	173	(4)
$\beta_{0,38}^-$	max:	575	(11) 0,231 (15)
$\beta_{0,38}^-$	avg:	174	(4)
$\beta_{0,37}^-$	max:	608	(11) 0,098 (9)
$\beta_{0,37}^-$	avg:	185	(4)
$\beta_{0,36}^-$	max:	639	(11) 0,0223 (21)
$\beta_{0,36}^-$	avg:	196	(4)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,35}^-$	max:	665	(11) 0,058 (4)
$\beta_{0,35}^-$	avg:	205	(4)
$\beta_{0,34}^-$	max:	708	(11) 0,00018 (9)
$\beta_{0,34}^-$	avg:	220	(4)
$\beta_{0,32}^-$	max:	725	(11) 0,044 (7)
$\beta_{0,32}^-$	avg:	226	(4)
$\beta_{0,31}^-$	max:	762	(11) 0,092 (9)
$\beta_{0,31}^-$	avg:	240	(4)
$\beta_{0,30}^-$	max:	765	(11) 0,169 (10)
$\beta_{0,30}^-$	avg:	241	(4)
$\beta_{0,29}^-$	max:	788	(11) 1,227 (27)
$\beta_{0,29}^-$	avg:	249	(3)
$\beta_{0,28}^-$	max:	822	(11) 2,76 (6)
$\beta_{0,28}^-$	avg:	262	(4)
$\beta_{0,27}^-$	max:	847	(11) 0,0620 (49)
$\beta_{0,27}^-$	avg:	271	(4)
$\beta_{0,26}^-$	max:	909	(11) 0,0030 (8)
$\beta_{0,26}^-$	avg:	294	(4)
$\beta_{0,25}^-$	max:	922	(11) 0,0014 (9)
$\beta_{0,25}^-$	avg:	298	(4)
$\beta_{0,24}^-$	max:	977	(11) 0,558 (8)
$\beta_{0,24}^-$	avg:	319	(4)
$\beta_{0,23}^-$	max:	1004	(11) 0,187 (12)
$\beta_{0,23}^-$	avg:	329	(4)
$\beta_{0,21}^-$	max:	1066	(11) 5,642 (43)
$\beta_{0,21}^-$	avg:	353	(4)
$\beta_{0,20}^-$	max:	1077	(11) 0,851 (10)
$\beta_{0,20}^-$	avg:	357	(4)
$\beta_{0,19}^-$	max:	1122	(11) 0,433 (22)
$\beta_{0,19}^-$	avg:	375	(4)
$\beta_{0,18}^-$	max:	1151	(11) 4,339 (18)
$\beta_{0,18}^-$	avg:	386	(4)
$\beta_{0,17}^-$	max:	1182	(11) 0,114 (6)
$\beta_{0,17}^-$	avg:	398	(4)
$\beta_{0,16}^-$	max:	1253	(11) 2,449 (10)
$\beta_{0,16}^-$	avg:	425	(4)
$\beta_{0,15}^-$	max:	1259	(11) 1,430 (9)
$\beta_{0,15}^-$	avg:	428	(4)
$\beta_{0,14}^-$	max:	1275	(11) 1,171 (18)
$\beta_{0,14}^-$	avg:	434	(4)
$\beta_{0,13}^-$	max:	1380	(11) 1,584 (10)
$\beta_{0,13}^-$	avg:	476	(4)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,12}^-$	max:	1423	(11) 8,147 (28)
$\beta_{0,12}^-$	avg:	493	(4)
$\beta_{0,11}^-$	max:	1506	(11) 17,10 (8)
$\beta_{0,11}^-$	avg:	526	(4)
$\beta_{0,10}^-$	max:	1527	(11) 0,116 (16)
$\beta_{0,10}^-$	avg:	535	(4)
$\beta_{0,9}^-$	max:	1540	(11) 17,494 (36)
$\beta_{0,9}^-$	avg:	540	(4)
$\beta_{0,8}^-$	max:	1557	(11) 0,170 (16)
$\beta_{0,8}^-$	avg:	547	(4)
$\beta_{0,7}^-$	max:	1609	(11) 0,65 (6)
$\beta_{0,7}^-$	avg:	568	(4)
$\beta_{0,6}^-$	max:	1727	(11) 3,12 (4)
$\beta_{0,6}^-$	avg:	616	(5)
$\beta_{0,5}^-$	max:	1855	(11) 0,396 (46)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	669	(5)
$\beta_{0,4}^-$	max:	1892	(11) 7,45 (5)
$\beta_{0,4}^-$	avg:	685	(5)
$\beta_{0,1}^-$	max:	2661	(11) 0,62 (20)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	1008	(5)
$\beta_{0,0}^-$	max:	3270	(11) 19,67 (20)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	1270	(5)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Po)	9,66 — 16,21	0,627 (15)	
XK α_2	(Po)	76,8641	0,426 (13)	} K α
XK α_1	(Po)	79,2912	0,710 (22)	}
XK β_3	(Po)	89,2579	}	
XK β_1	(Po)	89,8098	0,244 (9)	K' β_1
XK β_5''	(Po)	90,3073	}	
XK β'_5	(Po)	90,4215	}	
XK β_2	(Po)	92,32	}	
XK β_4	(Po)	92,6199	0,0760 (29)	K' β_2
XKO _{2,3}	(Po)	92,983	}	

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Tl})$	62,5 (10)	0,0116 (7)
$\gamma_{2,1}(\text{Tl})$	191,1 (18)	0,00125 (7)
$\gamma_{11,6}(\text{Po})$	221 (1)	0,059 (6)
$\gamma_{(-1,0)}(\text{Po})$	230 (1)	0,0029 (10)
$\gamma_{16,11}(\text{Po})$	252,80 (6)	0,0117 (18)
$\gamma_{6,3}(\text{Po})$	268,8 (2)	0,0161 (18)
$\gamma_{29,22}(\text{Po})$	273,80 (5)	0,120 (8)
$\gamma_{42,28}(\text{Po})$	280,95 (5)	0,062 (6)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Po})$	304,2 (2)	0,0255 (23)
$\gamma_{14,7}(\text{Po})$	333,350 (42)	0,063 (4)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Po})$	334,78 (8)	0,033 (5)
$\gamma_{11,5}(\text{Po})$	348,92 (6)	0,123 (32)
$\gamma_{11,4}(\text{Po})$	386,77 (5)	0,296 (5)
$\gamma_{18,9}(\text{Po})$	388,88 (5)	0,394 (5)
$\gamma_{29,17}(\text{Po})$	394,05 (8)	0,0127 (18)
$\gamma_{35,22}(\text{Po})$	396,01 (8)	0,0259 (18)
$\gamma_{2,1}(\text{Po})$	405,74 (3)	0,171 (7)
$\gamma_{28,14}(\text{Po})$	452,92 (10)	0,031 (4)
$\gamma_{9,3}(\text{Po})$	454,770 (12)	0,288 (5)
$\gamma_{21,10}(\text{Po})$	461,0 (2)	0,058 (8)
$\gamma_{12,4}(\text{Po})$	469,76 (7)	0,133 (15)
$\gamma_{21,9}(\text{Po})$	474,41 (5)	0,092 (6)
$\gamma_{38,22}(\text{Po})$	485,92 (11)	0,021 (4)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{29,14}(\text{Po})$	487,95 (13)	0,028 (9)
$\gamma_{39,21}(\text{Po})$	494,2 (4)	0,011 (3)
$\gamma_{31,15}(\text{Po})$	496,90 (18)	0,0068 (18)
$\gamma_{23,11}(\text{Po})$	501,96 (15)	0,0181 (22)
$\gamma_{42,22}(\text{Po})$	519,90 (5)	0,0166 (17)
$\gamma_{42,21}(\text{Po})$	524,6 (2)	0,0169 (17)
$\gamma_{6,2}(\text{Po})$	528 (1)	0,0109 (13)
$\gamma_{23,9}(\text{Po})$	536,77 (4)	0,061 (8)
$\gamma_{21,7}(\text{Po})$	543,0 (2)	0,088 (21)
$\gamma_{22,7}(\text{Po})$	547,6 (3)	0,034 (3)
$\gamma_{62,28}(\text{Po})$	551,9 (8)	0,0055 (14)
$\gamma_{12,3}(\text{Po})$	572,76 (7)	0,071 (8)
$\gamma_{15,5}(\text{Po})$	595,23 (7)	0,0174 (15)
$\gamma_{41,18}(\text{Po})$	600,0 (5)	0,008 (4)
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	609,312 (7)	45,49 (19)
$\gamma_{13,3}(\text{Po})$	615,73 (10)	0,055 (7)
$\gamma_{14,4}(\text{Po})$	617,0 (2)	0,027 (5)
$\gamma_{51,23}(\text{Po})$	626,4 (6)	0,0041 (14)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Po})$	630,79 (7)	0,0166 (14)
$\gamma_{15,4}(\text{Po})$	633,14 (10)	0,055 (3)
$\gamma_{29,12}(\text{Po})$	634,72 (21)	0,0064 (23)
$\gamma_{16,4}(\text{Po})$	639,67 (10)	0,034 (5)
$\gamma_{20,6}(\text{Po})$	649,18 (7)	0,054 (7)
$\gamma_{27,11}(\text{Po})$	658,7 (2)	0,017 (4)
$\gamma_{21,6}(\text{Po})$	661,1 (2)	0,054 (4)
$\gamma_{3,1}(\text{Po})$	665,453 (22)	1,530 (7)
$\gamma_{38,16}(\text{Po})$	677,41 (15)	0,0055 (23)
$\gamma_{28,11}(\text{Po})$	683,22 (6)	0,084 (6)
$\gamma_{39,15}(\text{Po})$	687,6 (3)	0,0066 (14)
$\gamma_{27,9}(\text{Po})$	693,3 (5)	0,0059 (15)
$\gamma_{8,2}(\text{Po})$	697,90 (25)	0,067 (4)
$\gamma_{38,14}(\text{Po})$	699,82 (18)	0,016 (5)
$\gamma_{18,5}(\text{Po})$	703,11 (4)	0,479 (11)
$\gamma_{28,10}(\text{Po})$	704,9 (3)	0,051 (10)
$\gamma_{41,15}(\text{Po})$	708,8 (3)	0,0119 (20)
$\gamma_{17,4}(\text{Po})$	710,67 (10)	0,076 (4)
$\gamma_{14,3}(\text{Po})$	719,86 (3)	0,393 (10)
$\gamma_{23,6}(\text{Po})$	722,98 (12)	0,037 (7)
$\gamma_{42,14}(\text{Po})$	733,80 (15)	0,038 (3)
$\gamma_{18,4}(\text{Po})$	740,73 (18)	0,0428 (21)
$\gamma_{29,9}(\text{Po})$	752,84 (3)	0,126 (8)
$\gamma_{4,1}(\text{Po})$	768,356 (10)	4,892 (16)
$\gamma_{28,7}(\text{Po})$	786,1 (4)	0,31 (5)
$\gamma_{21,5}(\text{Po})$	788,6 (5)	0,015 (5)
$\gamma_{5,1}(\text{Po})$	806,174 (18)	1,262 (6)
$\gamma_{20,4}(\text{Po})$	815,0 (1)	0,039 (3)
$\gamma_{29,7}(\text{Po})$	821,18 (3)	0,166 (10)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{21,4}(\text{Po})$	826,3 (2)	0,129 (11)
$\gamma_{12,2}(\text{Po})$	832,39 (11)	0,035 (2)
$\gamma_{38,12}(\text{Po})$	847,16 (11)	0,016 (6)
$\gamma_{19,3}(\text{Po})$	873,07 (19)	0,019 (3)
$\gamma_{24,5}(\text{Po})$	878,03 (12)	0,0118 (27)
$\gamma_{28,6}(\text{Po})$	904,29 (10)	0,066 (8)
$\gamma_{24,4}(\text{Po})$	915,74 (15)	0,023 (5)
$\gamma_{20,3}(\text{Po})$	917,8 (3)	0,005 (3)
$\gamma_{38,11}(\text{Po})$	930,2 (2)	0,043 (8)
$\gamma_{6,1}(\text{Po})$	934,061 (12)	3,10 (1)
$\gamma_{29,6}(\text{Po})$	939,6 (5)	0,016 (4)
$\gamma_{35,7}(\text{Po})$	943,34 (12)	0,017 (3)
$\gamma_{37,8}(\text{Po})$	949,8 (5)	0,0055 (23)
$\gamma_{38,10}(\text{Po})$	952,2 (8)	0,0059 (23)
$\gamma_{30,6}(\text{Po})$	961,61 (17)	0,0101 (14)
$\gamma_{42,11}(\text{Po})$	964,08 (3)	0,363 (12)
$\gamma_{41,10}(\text{Po})$	976,18 (12)	0,0151 (21)
$\gamma_{23,3}(\text{Po})$	991,49 (19)	0,011 (3)
$\gamma_{48,12}(\text{Po})$	1013,8 (2)	0,0087 (19)
$\gamma_{44,11}(\text{Po})$	1021,0 (5)	0,016 (3)
$\gamma_{28,5}(\text{Po})$	1032,37 (8)	0,061 (4)
$\gamma_{39,7}(\text{Po})$	1038,0 (3)	0,0086 (15)
$\gamma_{27,4}(\text{Po})$	1045,6 (2)	0,023 (3)
$\gamma_{7,1}(\text{Po})$	1051,96 (3)	0,324 (8)
$\gamma_{42,7}(\text{Po})$	1067,2 (3)	0,024 (7)
$\gamma_{28,4}(\text{Po})$	1069,96 (8)	0,271 (10)
$\gamma_{8,1}(\text{Po})$	1103,64 (19)	0,106 (15)
$\gamma_{29,4}(\text{Po})$	1104,79 (19)	0,073 (14)
$\gamma_{37,6}(\text{Po})$	1118,9 (5)	0,010 (4)
$\gamma_{9,1}(\text{Po})$	1120,287 (10)	14,91 (3)
$\gamma_{31,4}(\text{Po})$	1130,29 (19)	0,036 (3)
$\gamma_{10,1}(\text{Po})$	1133,66 (3)	0,254 (8)
$\gamma_{11,1}(\text{Po})$	1155,19 (2)	1,635 (7)
$\gamma_{32,4}(\text{Po})$	1167,3 (2)	0,0123 (17)
$\gamma_{28,3}(\text{Po})$	1172,98 (10)	0,055 (7)
$\gamma_{29,3}(\text{Po})$	1207,68 (3)	0,454 (12)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Po})$	1226,7 (3)	0,018 (8)
$\gamma_{30,3}(\text{Po})$	1230,6 (4)	0,007 (5)
$\gamma_{12,1}(\text{Po})$	1238,111 (12)	5,831 (14)
$\gamma_{13,1}(\text{Po})$	1280,96 (2)	1,435 (6)
$\gamma_{37,4}(\text{Po})$	1284 (1)	0,013 (6)
$\gamma_{41,5}(\text{Po})$	1303,76 (8)	0,105 (5)
$\gamma_{38,4}(\text{Po})$	1316,96 (15)	0,077 (7)
$\gamma_{35,3}(\text{Po})$	1330,0 (2)	0,0120 (14)
$\gamma_{41,4}(\text{Po})$	1341,49 (16)	0,0214 (27)
$\gamma_{42,4}(\text{Po})$	1351 (1)	0,0042 (11)
$\gamma_{65,7}(\text{Po})$	1353,4 (8)	0,0036 (9)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{4,0}(\text{Po})$	1377,669 (12)	3,968 (11)
$\gamma_{14,1}(\text{Po})$	1385,31 (3)	0,795 (5)
$\gamma_{43,4}(\text{Po})$	1392,5 (4)	0,0087 (19)
$\gamma_{15,1}(\text{Po})$	1401,50 (4)	1,330 (7)
$\gamma_{16,1}(\text{Po})$	1407,98 (4)	2,389 (8)
$\gamma_{38,3}(\text{Po})$	1419,7 (3)	0,0055 (10)
$\gamma_{65,6}(\text{Po})$	1470,9 (3)	0,0094 (13)
$\gamma_{17,1}(\text{Po})$	1479,15 (14)	0,051 (4)
$\gamma_{18,1}(\text{Po})$	1509,228 (15)	2,128 (10)
$\gamma_{51,4}(\text{Po})$	1515,5 (3)	0,0072 (21)
$\gamma_{19,1}(\text{Po})$	1538,50 (6)	0,401 (22)
$\gamma_{6,0}(\text{Po})$	1543,32 (6)	0,302 (13)
$\gamma_{20,1}(\text{Po})$	1583,22 (4)	0,707 (5)
$\gamma_{21,1}(\text{Po})$	1594,73 (8)	0,274 (15)
$\gamma_{22,1}(\text{Po})$	1599,31 (6)	0,322 (15)
$\gamma_{65,4}(\text{Po})$	1636,3 (2)	0,0111 (16)
$\gamma_{23,1}(\text{Po})$	1657,00 (19)	0,047 (5)
$\gamma_{7,0}(\text{Po})$	1661,28 (6)	1,048 (9)
$\gamma_{57,3}(\text{Po})$	1665,8 (2)	0,015 (6)
$\gamma_{24,1}(\text{Po})$	1683,99 (4)	0,217 (3)
$\gamma_{61,3}(\text{Po})$	1711,0 (8)	0,023 (5)
$\gamma_{9,0}(\text{Po})$	1729,595 (15)	2,844 (10)
$\gamma_{26,1}(\text{Po})$	1751,4 (8)	0,0009 (5)
$\gamma_{11,0}(\text{Po})$	1764,494 (14)	15,31 (5)
$\gamma_{27,1}(\text{Po})$	1813,73 (14)	0,0108 (9)
$\gamma_{28,1}(\text{Po})$	1838,36 (5)	0,343 (10)
$\gamma_{12,0}(\text{Po})$	1847,420 (25)	2,025 (12)
$\gamma_{29,1}(\text{Po})$	1873,16 (6)	0,212 (8)
$\gamma_{13,0}(\text{Po})$	1890,30 (15)	0,078 (4)
$\gamma_{30,1}(\text{Po})$	1895,92 (14)	0,146 (8)
$\gamma_{31,1}(\text{Po})$	1898,7 (4)	0,049 (8)
$\gamma_{32,1}(\text{Po})$	1935,5 (2)	0,032 (7)
$\gamma_{35,1}(\text{Po})$	1994,6 (6)	0,0024 (5)
$\gamma_{15,0}(\text{Po})$	2010,78 (12)	0,0434 (17)
$\gamma_{36,1}(\text{Po})$	2021,6 (2)	0,0214 (21)
$\gamma_{37,1}(\text{Po})$	2052,94 (12)	0,069 (4)
$\gamma_{38,1}(\text{Po})$	2085,1 (2)	0,0082 (5)
$\gamma_{40,1}(\text{Po})$	2089,7 (2)	0,0443 (22)
$\gamma_{41,1}(\text{Po})$	2109,92 (12)	0,084 (3)
$\gamma_{18,0}(\text{Po})$	2118,55 (3)	1,158 (5)
$\gamma_{19,0}(\text{Po})$	2147,9 (2)	0,0134 (13)
$\gamma_{43,1}(\text{Po})$	2160,4 (3)	0,007 (5)
$\gamma_{44,1}(\text{Po})$	2176,5 (2)	0,0033 (6)
$\gamma_{20,0}(\text{Po})$	2192,58 (16)	0,038 (3)
$\gamma_{21,0}(\text{Po})$	2204,21 (4)	4,913 (23)
$\gamma_{48,1}(\text{Po})$	2251,6 (2)	0,0055 (5)
$\gamma_{49,1}(\text{Po})$	2260,3 (2)	0,0087 (4)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{23,0}(\text{Po})$	2266,51 (13)	0,0165 (8)
$\gamma_{50,1}(\text{Po})$	2270,9 (4)	0,0014 (3)
$\gamma_{51,1}(\text{Po})$	2284,3 (2)	0,0050 (4)
$\gamma_{52,1}(\text{Po})$	2287,65 (23)	0,0046 (5)
$\gamma_{24,0}(\text{Po})$	2293,40 (12)	0,306 (4)
$\gamma_{53,1}(\text{Po})$	2310,2 (3)	0,0014 (9)
$\gamma_{54,1}(\text{Po})$	2312,4 (2)	0,0086 (8)
$\gamma_{55,1}(\text{Po})$	2319,3 (3)	0,0014 (9)
$\gamma_{56,1}(\text{Po})$	2325,0 (3)	0,0017 (3)
$\gamma_{57,1}(\text{Po})$	2331,3 (2)	0,026 (4)
$\gamma_{25,0}(\text{Po})$	2348,0 (13)	0,0014 (9)
$\gamma_{58,1}(\text{Po})$	2353,5 (7)	0,00036 (14)
$\gamma_{26,0}(\text{Po})$	2361,00 (19)	0,0021 (6)
$\gamma_{60,1}(\text{Po})$	2369,0 (4)	0,0028 (4)
$\gamma_{61,1}(\text{Po})$	2376,9 (2)	0,0086 (8)
$\gamma_{62,1}(\text{Po})$	2390,8 (2)	0,00156 (14)
$\gamma_{65,1}(\text{Po})$	2405,1 (5)	0,0011 (7)
$\gamma_{27,0}(\text{Po})$	2423,27 (13)	0,0048 (6)
$\gamma_{69,1}(\text{Po})$	2444,7 (8)	0,008 (4)
$\gamma_{28,0}(\text{Po})$	2447,86 (10)	1,548 (7)
$\gamma_{70,1}(\text{Po})$	2459,0 (8)	0,00141 (23)
$\gamma_{29,0}(\text{Po})$	2482,8 (4)	0,00096 (18)
$\gamma_{30,0}(\text{Po})$	2505,4 (2)	0,0056 (6)
$\gamma_{77,1}(\text{Po})$	2550,7 (7)	0,00032 (9)
$\gamma_{34,0}(\text{Po})$	2562,0 (6)	0,00018 (9)
$\gamma_{79,1}(\text{Po})$	2564,0 (6)	0,00014 (9)
$\gamma_{35,0}(\text{Po})$	2604,5 (5)	0,00036 (9)
$\gamma_{36,0}(\text{Po})$	2630,9 (3)	0,00086 (23)
$\gamma_{37,0}(\text{Po})$	2662,4 (10)	0,000200 (41)
$\gamma_{38,0}(\text{Po})$	2694,7 (2)	0,033 (3)
$\gamma_{40,0}(\text{Po})$	2699,4 (3)	0,00282 (23)
$\gamma_{41,0}(\text{Po})$	2719,3 (2)	0,00170 (17)
$\gamma_{43,0}(\text{Po})$	2769,9 (2)	0,0225 (8)
$\gamma_{44,0}(\text{Po})$	2785,9 (2)	0,0055 (5)
$\gamma_{47,0}(\text{Po})$	2826,98 (20)	0,00218 (17)
$\gamma_{48,0}(\text{Po})$	2861,08 (40)	0,00041 (13)
$\gamma_{50,0}(\text{Po})$	2880,3 (2)	0,0101 (16)
$\gamma_{51,0}(\text{Po})$	2893,5 (2)	0,0057 (5)
$\gamma_{54,0}(\text{Po})$	2921,9 (2)	0,0134 (5)
$\gamma_{55,0}(\text{Po})$	2928,6 (3)	0,00109 (9)
$\gamma_{56,0}(\text{Po})$	2934,6 (3)	0,00046 (12)
$\gamma_{60,0}(\text{Po})$	2978,9 (2)	0,0137 (4)
$\gamma_{62,0}(\text{Po})$	2999,98 (20)	0,0089 (7)
$\gamma_{69,0}(\text{Po})$	3053,88 (20)	0,022 (3)
$\gamma_{72,0}(\text{Po})$	3081,7 (3)	0,0052 (7)
$\gamma_{73,0}(\text{Po})$	3093,98 (40)	0,00037 (4)
$\gamma_{75,0}(\text{Po})$	3142,58 (40)	0,00118 (9)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{76,0}(\text{Po})$	3149,0 (5)	0,00019
$\gamma_{77,0}(\text{Po})$	3160,6 (6)	0,00047 (8)
$\gamma_{80,0}(\text{Po})$	3183,57 (40)	0,0011 (5)



7 Main Production Modes


$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ra} - 226 \text{ decay chain} \\ \text{Possible impurities : Bi} - 210 \end{array} \right.$

8 References

- W.B. LEWIS, B.V. BOWDEN. Proc. Roy. Soc. (London) A145 (1934) 235
(Alpha emission energies and probabilities.)
- J.M. CORK, C.E. BRANYAN, A.E. STODDARD, H.B. KELLER, J.M. LE BLANC, W.J. CHILDS. Phys. Rev. 83 (1951) 681
(Alpha emission energies.)
- G.H. BRIGGS. Red. Mod. Phys. 26 (1954) 1
(Alpha emission energies and probabilities.)
- H. DANIEL, R. NIERHAUS. Z. Naturforsch 11a (1956) 212
(Half-life.)
- R.J. WALLEN, G. BASTIN-SCOFFIER. Nucl. Phys. 16 (1960) 246
(Alpha emission energies and probabilities.)
- C.F. LEANG. Compt. Rend. Ac. Sci. (Paris) 260 (1965) 3037
(Alpha emission (long range) energies and probabilities .)
- R. GUNNINK, J.B. NIDAY, R.P. ANDERSON, R.A. MEYER. LRL-UCID-15439 (1969)
(Gamma-ray emission probabilities.)
- E.W.A. LINGEMAN, J. KONIJN, P. POLAK, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A133 (1969) 630
(Gamma-ray energies and emission probabilities.)
- G. WALLACE, G.E. COOTE. Nucl. Instrum. Methods 74 (1969) 353
(Gamma-ray emission probabilities.)
- K.YA. GROMOV, B.M. SABIROV V, J.J. URBANETS. Bull. Ac. Sci. USSR. Phys. Ser. 33 (1970) 1510
(Gamma-ray emission probabilities.)
- A. HACHEM, H. MARIA, J. DALMASSO, C. YTHIER. Compt. Rend. Ac. Sci. (Paris) 279, 2 (1974) 555
(Gamma-ray energies and emission probabilities.)
- A. HACHEM. Compt. Rend. Ac. Sci. (Paris) 281B (1975) 45
(Gamma-ray emission probabilities and energies.)
- V. ZOBEL, J. EBERTH, U. EBERTH, E. EUBE. Nucl. Instrum. Methods 141 (1977) 329
(Gamma-ray energies and emission probabilities.)
- F. RÖSEL, H.M. FRIESS, K. ALDER, H.C. PAULI. At. Data. Nucl. Data Tables 21 (1978) 92
(Theoretical internal conversion coefficients.)
- R.G. HELMER, R.J. GEHRKE, R.C. GREENWOOD. Nucl. Instrum. Methods 166 (1979) 547
(Gamma-ray energies.)
- B. BENGTSON, H.L. NIELSEN, N. RUD. Nucl. Phys. A319 (1979) 21
(Half-life and gamma transition probabilities)
- G. MOUZE. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 292 (1981) 1243
(Gamma-ray emission probabilities.)
- H. AKCAY, G. MOUZE, D. MAILLARD, C. YTHIER. Radiochem. Radioanal. Lett. 51 (1982) 1
(Gamma-ray energies and emission probabilities.)


- M.A. FAROUK, A.M. AL-SORAYA. Nucl. Instrum. Methods 200 (1982) 593
(Gamma-ray emission probabilities.)
- U. SCHÖTZIG, K. DEBERTIN. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 34,2 (1983) 533
(Gamma-ray emission intensities, X-ray emission intensities.)
- D.G. OLSON. Nucl. Instrum. Methods 206 (1983) 313
(Gamma-ray emission probabilities.)
- G. MOUZE, O. DIALLO, P. BECHLICH, C. YTHIER, J.F. COMANDUCCI. Radiochim. Acta 49 (1990) 13
(Gamma-ray emission probabilities.)
- N. COURSOL, F. LAGOUTINE, B.DUCHEMIN. Nucl. Instrum. Methods A286 (1990) 589
(Gamma-ray emission probabilities.)
- G. MOUZE, C. YTHIER, J.F. COMANDUCCI. Rev. Roumaine Phys. 35 (1990) 337
(Gamma-ray emission probabilities.)
- W.J. LIN, G. HARBOTTLE. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 153 (1991) 137
(Gamma-ray emission intensities.)
- O. DIALLO, G. MOUZE, C. YTHIER, J.F. COMANDUCCI. Nuovo Cim. 106A (1993) 1321
(Gamma-ray emission probabilities.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 127
(Energy level, spin, parity, multipolarity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- J. MOREL, M. ETCHEVERRY, J.L. PICOLO. Appl. Rad. Isotopes 49 (1998) 1387
(Gamma-ray emission intensities.)
- D. SARDARI, T.D. MACMAHON. J. Radioanal. Nucl. Chem. 244 (2000) 463
(Gamma-ray emission probabilities.)
- I.M. BAND, M. B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical internal conversion coefficients.)
- J.U. DELGADO, J. MOREL, M. ETCHEVERRY. Appl. Rad. Isotopes 56 (2002) 137
(Gamma-ray emission intensities, X-ray emission intensities.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 99 (2003) 483
(Energy level, spin, parity and multipolarity.)
- G.L. MOLNAR, ZS. RÉVAY, T. BELGYA. 11th Int. Symp. On Capture gamma-ray Spectroscopy, 2-6 Sep 2002, Pruhonice To be published (2003)
(Gamma-ray emission intensities)
- R.G. HELMER. IAEA - CRP To be published (2003)
(Gamma-ray emission intensities.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)
- J. MOREL, S. SPEMAN, M. RASKO, E. TERECHTCHENKO, J.U. DELGADO. Appl. Rad. Isotopes 60 (2004) 341
(Gamma-ray emission probabilities.)








LNE-LNHB/CEA - Table de Radionucléides


$^{214}_{83}\text{Bi}_{131}$
















1 Decay Scheme

Po-214 decays by alpha emission mainly to the Pb-210 ground state level.

Le polonium 214 se désintègre par émission alpha principalement vers le niveau fondamental du plomb 210.

2 Nuclear Data

$$T_{1/2}(^{214}\text{Po}) : 162,3 \quad (12) \quad 10^{-6} \text{ s}$$

$$T_{1/2}(^{210}\text{Pb}) : 22,23 \quad (12) \quad \text{a}$$

$$Q^\alpha(^{214}\text{Po}) : 7833,46 \quad (6) \quad \text{keV}$$

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,2}$	6735,8 (10)	0,000058 (2)	400
$\alpha_{0,1}$	7033,76 (21)	0,0105 (7)	27
$\alpha_{0,0}$	7833,46 (6)	99,9895 (7)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{2,1}(\text{Pb})$	298 (1)	0,000058 (20)	E2	0,0661 (11)	0,0389 (8)	0,00999 (20)	0,1180 (21)
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	799,7 (1)	0,0105 (7)	E2	0,00810 (12)	0,001763 (25)	0,000425 (6)	0,01042 (15)

3 Atomic Data

3.1 Pb

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,963 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,379 \quad (15) \\ n_{KL} &: 0,811 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	72,8049	59,5
K α_1	74,97	100
K β_3	84,451	}
K β_1	84,937	}
K β_5''	85,47	} 34,2
K β_2	87,238	}
K β_4	87,58	} 10,3
KO _{2,3}	87,911	}
X _L		
L ℓ	9,19	
L α	10,4495 – 10,5512	
L η	11,3495	
L β	12,1443 – 12,7953	
L γ	14,3078 – 15,22	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,2}$	6610,1 (10)	0,000058 (2)
$\alpha_{0,1}$	6902,6 (3)	0,0105 (7)
$\alpha_{0,0}$	7686,82 (6)	99,9895 (7)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Pb)	9,19 — 15,22	0,0000347 (13)
XK α_2	(Pb)	72,8049	0,0000246 (15) }
XK α_1	(Pb)	74,97	0,0000414 (25) }
XK β_3	(Pb)	84,451	}
XK β_1	(Pb)	84,937	0,0000141 (9) K' β_1
XK β_5''	(Pb)	85,47	}
XK β_2	(Pb)	87,238	}
XK β_4	(Pb)	87,58	0,00000427 (27) K' β_2
XKO _{2,3}	(Pb)	87,911	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{2,1}(\text{Pb})$	298 (1)	0,000052 (18)
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	799,7 (1)	0,0104 (6)


6 Main Production Modes

Ra – 226 decay chain

7 References

- J.V. DUNWORTH. Nature (London) 144 (1939) 152
(Half-life.)
- J. ROTBLAT. Proc. Roy. Soc. (London) A177 (1941) 260
(Half-life.)
- A.G. WARD. Proc. Roy. Soc. (London) A181 (1942) 183
(Half-life.)
- J.C. JACOBSEN, T. SIGURGEIRSSON. Kgl. D. Vid. Selsk. Medd. 20 (1943) 11
(Half-life.)
- G. VON DARDEL. Phys. Rev. 79 (1950) 734
(Half-life.)
- R. BALLINI. Ann. Phys. (Paris) 8 (1953) 441
(Half-life.)

- K.W. OGILVIE. Proc. Phys. Soc. (London) 76 (1960) 299
(Half-life.)
- A. RYTZ. Helv. Phys. Acta 34 (1961) 240
(Alpha transitions.)
- T. DOBROWOLSKI, J. YOUNG. Proc. Phys. Soc. (London) 77 (1961) 1219
(Half-life.)
- A. PEGHAIRE. Nucl. Instrum. Methods 75 (1969) 66
(Gamma intensity.)
- B. GRENNBERG, A. RYTZ. Metrologia 7 (1971) 65
(Alpha transitions.)
- A. ERLIK, J. FELSTEINER, H. LINDEMAN, M. TATCHER. Nucl. Instrum. Methods 92 (1971) 45
(Half-life.)
- W. KURCEWICZ, N. KAFFRELL, N. TRAUTMANN, A. PLOCHOCKI, J. ZYLCZ, K. STRYCZNIEWICZ, I. YUTLANDOV. Nucl. Phys. A270 (1976) 175
(Gamma intensity and energy, alpha intensity.)
- N.E. HOLDEN. Pure Appl. Chem. 62 (1990) 941
(Half-life.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 65 (1992) 209
(Energy level, spin, parity.)
- J.W. ZHOU, P. DE MARCILLAC, N. CORON, S. WANG, H.H. STROKE, O. REDI, J. LEBLANC, G. DAMBIER, M. BARTHELEMY, J.P. TORRE, O. TESTARD, G. BEYER, H. RAVN, J. MANGIN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A335 (1993) 443
(Half-life.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47 (1995) 205
(Alpha energy and intensity.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 127
(Energy level, spin, parity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 84 (1998) 1
(Alpha energy and intensity.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 99 (2003) 483
(Energy level, spin, parity.)





1 Decay Scheme

Alpha decay of Rn-217 occurs directly to the ground state level of Po-213.

Le radon 217 se désintègre par émission alpha à 100% vers le niveau fondamental de polonium 213.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{217}\text{Rn})$:	0,54	(5)	10^{-3} s
$T_{1/2}(^{213}\text{Po})$:	3,70	(5)	10^{-6} s
$Q^\alpha(^{217}\text{Rn})$:	7887	(3)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,0}$	7887 (3)	100	1,49

3 α Emissions



	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,0}$	7742 (3)	100


4 Main Production Modes

Descendant of Th – 229

5 References

- W.W.MEINKE, A.GHIORSO, G.T.SEABORG. Phys.Rev. 81 (1951) 782
(Half-life)
- C.P.RUIZ. UCRL-9511 (1961)
(Half-life,Alpha energy)
- J.D.BOWMAN, R.E.EPPLEY, E.K.HYDE. Phys.Rev. C25 (1982) 941
(Alpha energy)
- A.RYTZ. At.Data Nucl.Data Tables 47 (1991) 205
(Evaluation alpha energies)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q)
- M.S.BASUNIA. Nucl.Data Sheets 108 (2007) 633
(NDS)





1 Decay Scheme

Po-218 disintegrates mainly (99,978 (3) %) by alpha emission to the Pb-214 ground state. A weak beta minus emission (0,022 (3) %) to At-218 has been pointed out.

Le polonium 218 se désintègre par émission alpha principalement (99,978 (3) %) vers le niveau fondamental de plomb 214. Une désintégration bêta moins vers l'astate 218 de probabilité 0,022 (3) % a été mise en évidence.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{218}\text{Po})$:	3,094	(6)	min
$T_{1/2}(^{218}\text{At})$:	1,4	(2)	s
$T_{1/2}(^{214}\text{Pb})$:	26,8	(9)	min
$Q^-(^{218}\text{Po})$:	260	(12)	keV
$Q^\alpha(^{218}\text{Po})$:	6114,68	(9)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,1}$	5277,68 (9)	0,0011 (11)	7,5
$\alpha_{0,0}$	6114,68 (9)	99,9769 (32)	1

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\beta_{0,0}^-$	260 (12)	0,022 (3)

2.3 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	837 (2)	0,0011 (11)	(E2)

3 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,1}$	5181 (2)	0,0011 (11)
$\alpha_{0,0}$	6002,35 (9)	99,9769 (32)

4 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,0}^-$	max: 260 (12)	0,022 (3)
$\beta_{0,0}^-$	avg: 73 (4)	

5 Photon Emissions

5.1 Gamma Emissions


	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pb})$	836 (2)	0,0011 (11)

6 Main Production Modes

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ra} - 226 \text{ decay chain} \\ \text{Possible impurities : Po} - 214, \text{Po} - 210. \end{array} \right.$

7 References

- M. BLAU. Akad. Wiss. Wien, Berlin 133 (1924) 17
(Half-life.)
- M. CURIE, A. DEBIERNE, A.S. EVE, H. GEIGER, O. HAHN, S.C. LIND, ST. MEYER, E. RUTHERFORD, E. SCHWEIDLER. Rev. Mod. Phys. 3 (1931) 427
(Half-life (Pb-214).)
- R.J. WALEN. J. Phys. Radium 10 (1949) 95
(Beta emission probabilities and half-life (At-218).)
- F. HIESSBERGER, B. KARLIK. Stizber. Akad. Wiss. Wien, Math-Naturw. Kl. Abt. Iia 161 (1952) 51
(Branching ratio.)
- R.J. WALEN, G. BASTIN. Compt. Rend. Cong. Phys. Nucl. Paris (1958) 910
(Alpha emission energies and probabilities, beta emission probabilities.)
- G. BASTIN-SCOFFIER, C.F. LEANG, R.J. WALEN. J. Phys. (Paris) 24 (1963) 854
(Alpha energy.)
- B. GRENNBERG, A. RYTZ. Metrologia 7 (1971) 65
(Alpha energy.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 23 (1979) 507
(Alpha emission energy and probabilities.)
- J.R. VAN HISE, D.E. MARTZ, R.A. JACKSON, D.Y. KUNIHIRA, E. BOLTON. Phys. Rev. C25 (1982) 2802
(Half-life.)
- G.V. POTAPOV, P.S. SOLOSHENKOV. Sov. At. Energ. 60 (1986) 345
(Half-life.)
- Y.A. ELLIS-AKOVALI. Nucl. Data Sheets 52 (1987) 789
(Energy level, spin, parity, multipolarity.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha emission energy and probabilities.)
- P. BALTZER, K.G. GÖRSTEN, A. BÄCKLIN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A317 (1992) 357
(Alpha energy.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 127
(Energy level, spin, parity, multipolarity.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 457
(Energy level and half-life.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 84 (1998) 1
(Branching ratio.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR,JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)
- A.K. JAIN, B. SINGH. Nucl. Data Sheets 107 (2006) 1027
(Energy level and haf-life.)





1 Decay Scheme

At-218 disintegrates by alpha emission to Bi-214 mainly . Gamma transitions between the Bi-214 levels have not been observed. The disintegration by beta minus emission to Rn-218 was measured.

L'astate 218 se désintègre principalement par émission alpha vers des niveaux excités et le niveau fondamental de bismuth 214. Des transitions gamma entre les niveaux de bismuth 214 n'ont pas été mises en évidence. Une désintégration par émission bêta moins d'intensité 0,1% vers le radon 218 a été mesurée.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{218}\text{At})$:	1,4	(2)	s
$T_{1/2}(^{218}\text{Rn})$:	36,0	(19)	10^{-3} s
$T_{1/2}(^{214}\text{Bi})$:	19,9	(4)	min
$Q^-(^{218}\text{At})$:	2881	(12)	keV
$Q^\alpha(^{218}\text{At})$:	6874	(3)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,2}$	6771 (7)	6,4 (1)	38
$\alpha_{0,1}$	6811 (3)	90,0 (1)	3,9
$\alpha_{0,0}$	6874 (3)	3,6 (1)	150

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\beta_{0,0}^-$	2881 (12)	0,1 (1)

3 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,2}$	6653 (5)	6,4 (1)
$\alpha_{0,1}$	6694 (3)	90,0 (1)
$\alpha_{0,0}$	6756 (5)	3,6 (1)

4 Electron Emissions


	Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,0}^-$	max: 2881 (12)	0,1 (1)
$\beta_{0,0}^-$	avg: 1095 (12)	

5 Main Production Modes

Ra – 226 decay chain

6 References

- R.J. WALEN. Comp. Rend. Acad. Sci. (Paris) 227 (1948) 1090
(Branching ratio.)
- R.J. WALEN. J. Phys. Radium 10 (1949) 95
(Beta emission probabilities, half-life.)
- R.J. WALEN, G. BASTIN-SCOFFIER. Compt. Rend. Cong. Phys. Nucl., Paris (1958) 910
(Alpha emission energies and probabilities, beta emission probabilities.)
- R.J. WALEN, G. BASTIN-SCOFFIER. Priv. Comm., quoted by 1964Hy02. (1963)
(Branching ratio.)
- E.K. HYDE, I. PERLMAN, G.T. SEABORG. The Nuclear properties of the heavy elements, Vol. II, Pretence-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. (1964) 460
(Branching ratio.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 23 (1979) 507
(Alpha emission energies and probabilities.)
- Y. A. ELLIS-AKOVALI. Nucl. Data Sheets 52 (1987) 789
(Alpha emission probabilities and energies, spin and parity.)
- D.G. BURKE, H. FOLGER, H. GABELMANN, E. HAGEBO, P. HILL, P. HOFF, O. JONSSON, N. KAFFRELL, W. KURCEWICZ, G. LOVHOIDEN, K. NYBO, G. NYMAN, H. RAVN, K. RIISAGER, J. ROGOWSKI, K. STEFFENSEN, T.F. THORSTEINSEN, AND ISOLDE COLLABORATION. Z. Physik A333 (1989) 131
(Half-life.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha emission energies and probabilities.)
- Y. A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 457
(Alpha emission probabilities and energies, spin and parity.)
- Y. A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 127
(Alpha emission probabilities and energies, spin and parity.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)
- A.K. JAIN, B. SINGH. Nucl. Data Sheets 107 (2006) 1027
(Alpha emission probabilities and energies, spin and parity.)





1 Decay Scheme

Rn-218 disintegrates by alpha emission to the 609 keV level (0,127 (7) %) and to the ground state (99,873 (7) %) of Po-214.

Le radon 218 se désintègre par émission alpha vers le niveau excité de 609 keV (0,126 (8) %) et le fondamental (99,874 (8) %) du polonium 214.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{218}\text{Rn})$:	36,0	(19)	10^{-3} s
$T_{1/2}(^{214}\text{Po})$:	162,3	(12)	10^{-6} s
$Q^\alpha(^{218}\text{Rn})$:	7262,5	(19)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,1}$	6653,2 (19)	0,127 (7)	4,8
$\alpha_{0,0}$	7262,5 (19)	99,873 (7)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}}\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T	
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	609,31 (6)	0,127 (7)	E2	0,01487 (21)	0,00416 (6)	0,001030 (15)	0,0204 (3)

3 Atomic Data

3.1 Po

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,965 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,403 \quad (16) \\ n_{KL} &: 0,807 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	76,864	60,05
K α_1	79,293	100
K β_3	89,256	}
K β_1	89,807	}
K β_5''	90,363	} 34,43
K β_2	92,263	}
K β_4	92,618	} 10,71
KO _{2,3}	92,983	}
X _L		
L ℓ	9,66	
L α	11,0161 – 11,1303	
L η	12,0847	
L β	12,8239 – 13,6358	
L γ	15,251 – 16,21	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,1}$	6531,1 (19)	0,127 (7)
$\alpha_{0,0}$	7129,2 (19)	99,873 (7)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Po)	9,66 — 16,21	0,00080 (3)	
XK α_2	(Po)	76,864	0,00052 (4)	} K α
XK α_1	(Po)	79,293	0,00086 (6)	}
XK β_3	(Po)	89,256	}	
XK β_1	(Po)	89,807	0,000296 (21)	K' β_1
XK β_5''	(Po)	90,363	}	
XK β_2	(Po)	92,263	}	
XK β_4	(Po)	92,618	0,000092 (7)	K' β_2
XKO _{2,3}	(Po)	92,983	}	

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.	
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	609,31 (6)	0,124 (7)	


6 Main Production Modes


Ra – 226 decay chain

7 References

- F. ASARO, I. PERLMAN. Phys. Rev. 104 (1956) 91
(Alpha energy.)
- P. A. TOVE. Ark. Fysik 13 (1958) 549
(Half-life.)
- C.P. RUIZ. UCRL - 9511 (1961)
(Half-life.)
- H. DIAMOND, J.E. GINDLER. J. Inorg. Nucl. Chem. 25 (1963) 143
(Half-life.)
- A. PEGHAIRE. Nucl. Instrum. Methods 75 (1969) 66
(Gamma intensity.)
- A. ERLIK, J. FELSTEINER, H. LINDEMAN, M. TATCHER. Nucl. Instrum. Methods 92 (1971) 45
(Half-life.)
- W. KURCEWICZ, N. KAFFRELL, N. TRAUTMANN, A. PLOCHOCKI, J. ZYLCZ, K. STRYCZNIEWICZ, I. YUTLANDOV. Nucl. Phys. A270 (1976) 175
(Gamma energy and intensity, alpha intensity.)

- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 23 (1979) 507
(Alpha energy and intensity.)
- J.D. BOWMAN, R.E. EPPLER, E.K. HYDE. Phys. Rev. C25 (1982) 941
(Alpha energy.)
- Y.A. ELLIS-AKOVALI. Nucl. Data Sheets 52 (1987) 789
(Alpha energy and intensity, gamma energy and intensity.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha energy and intensity.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 127
(Alpha energy and intensity, gamma energy and intensity, spin, parity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 84 (1998) 1
(Alpha energy and intensity, gamma energy and intensity, spin, parity.)
- I.M. BAND, M. B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)





1 Decay Scheme

Fr-221 disintegrates 99.9952(15)% by alpha emission to levels in At-217 and 0.0048(15)% by beta minus emission to levels in Ra-221. The beta minus decay scheme of Fr-221 has not been studied.

Le francium 221 se désintègre par transitions alpha vers des niveaux excités d'astate 217. Un faible branchement bêta moins n'est pas inclus ici.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{221}\text{Fr})$:	4,79	(2)	min
$T_{1/2}(^{221}\text{Ra})$:	28	(2)	s
$T_{1/2}(^{217}\text{At})$:	32,3	(4)	10^{-3} s
$Q^-(^{221}\text{Fr})$:	314	(6)	keV
$Q^\alpha(^{221}\text{Fr})$:	6457,8	(14)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,14}$	5601 (40)	0,000038 (10)	61
$\alpha_{0,13}$	5632 (25)	0,00010 (2)	60
$\alpha_{0,12}$	5794 (3)	0,0025 (5)	111
$\alpha_{0,11}$	5802 (4)	0,0003	828
$\alpha_{0,10}$	5882 (3)	0,064 (4)	11,7
$\alpha_{0,9}$	5890 (4)	0,0031 (6)	290
$\alpha_{0,8}$	5920 (3)	0,006 (1)	197
$\alpha_{0,7}$	6034 (3)	0,0285 (24)	143
$\alpha_{0,6}$	6048,4 (20)	0,128 (3)	36,4
$\alpha_{0,5}$	6075,9 (25)	0,064 (16)	117
$\alpha_{0,4}$	6090,1 (20)	0,39 (7)	27
$\alpha_{0,3}$	6187,9 (20)	0,15 (3)	65

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,2}$	6239,2 (15)	15,1 (2)	2,2
$\alpha_{0,1}$	6358 (2)	1,34 (7)	120
$\alpha_{0,0}$	6458,0 (13)	82,8 (2)	3,44

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{3,2}(\text{At})$	53,81 (3)	0,220 (38)	M1		10,79 (15)	2,56 (4)	14,17 (20)
$\gamma_{4,3}(\text{At})$	96,3 (3)	0,046 (26)	M1+E2		4,1 (18)	1,1 (5)	5,6 (24)
$\gamma_{1,0}(\text{At})$	100,25 (2)	2,02 (17)	M1	9,66 (14)	1,758 (25)	0,416 (6)	11,97 (17)
$\gamma_{2,1}(\text{At})$	117,82 (3)	0,19 (14)	M1	6,13 (9)	1,104 (16)	0,261 (4)	7,58 (11)
$\gamma_{4,2}(\text{At})$	150,21 (3)	0,216 (12)	M1	3,08 (5)	0,550 (8)	0,1303 (19)	3,80 (5)
$\gamma_{3,1}(\text{At})$	171,83 (3)	0,129 (17)	E2	0,226 (4)	0,471 (7)	0,1257 (18)	0,863 (12)
$\gamma_{10,4}(\text{At})$	208,3 (6)	0,0073 (14)	[E2]	0,1519 (24)	0,206 (4)	0,0547 (11)	0,430 (8)
$\gamma_{2,0}(\text{At})$	218,12 (2)	15,61 (21)	E2	0,1375 (20)	0,1701 (24)	0,0451 (7)	0,367 (5)
$\gamma_{12,5}(\text{At})$	282,12 (9)						
$\gamma_{5,1}(\text{At})$	282,12 (9)	0,0097 (20)	[M1,E2]	0,30 (23)	0,077 (17)	0,019 (4)	0,41 (25)
$\gamma_{7,1}(\text{At})$	324,10 (6)	0,0252 (17)	M1	0,362 (5)	0,0639 (9)	0,01510 (22)	0,446 (6)
$\gamma_{10,2}(\text{At})$	359,86 (4)	0,0514 (20)	M1	0,272 (4)	0,0479 (7)	0,01133 (16)	0,335 (5)
$\gamma_{5,0}(\text{At})$	382,34 (4)	0,0437 (18)	M1	0,231 (4)	0,0406 (6)	0,00960 (14)	0,284 (4)
$\gamma_{6,0}(\text{At})$	410,64 (5)	0,1270 (26)	E2	0,0344 (5)	0,01528 (22)	0,00392 (6)	0,0548 (8)
$\gamma_{8,1}(\text{At})$	437,00 (5)	0,0010 (1)					
$\gamma_{12,2}(\text{At})$	446,30 (8)	0,0017 (4)	E1 + M2				
$\gamma_{9,1}(\text{At})$	468,3 (7)	0,0018 (3)					
$\gamma_{8,0}(\text{At})$	537,8 (8)	0,0045 (8)					
$\gamma_{12,1}(\text{At})$	562,3 (12)	0,005 (5)					
$\gamma_{9,0}(\text{At})$	568,5 (3)	0,0012 (4)					
$\gamma_{10,0}(\text{At})$	576,9 (4)	0,0033 (7)	[M1]	0,0772 (11)	0,01342 (19)	0,00317 (5)	0,0948 (13)
$\gamma_{11,0}(\text{At})$	652 (2)	0,0004 (4)					
$\gamma_{12,0}(\text{At})$	665 (2)	0,0009 (9)					
$\gamma_{13,0}(\text{At})$	809,3 (2)	0,00010 (2)					
$\gamma_{14,0}(\text{At})$	891,9 (3)	0,000038 (10)					

3 Atomic Data

3.1 At

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,966 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,416 \quad (17) \\ n_{KL} &: 0,805 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	78,94	60,33
K α_1	81,51	100
K β_3	91,73	}
K β_1	92,315	}
K β_5''	92,883	} 34,63
K β_2	94,846	}
K β_4	95,211	} 10,9
KO _{2,3}	95,595	}
X _L		
L ℓ	9,8964	
L γ	– 16,7291	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	60,489 – 67,031	100
KLX	73,811 – 81,516	56,8
KXY	87,10 – 95,72	8,07
Auger L	5,6 – 17,4	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,14}$	5500 (40)	0,000038 (10)
$\alpha_{0,13}$	5530 (25)	0,00010 (2)
$\alpha_{0,12}$	5689 (3)	0,0025 (5)
$\alpha_{0,11}$	5697 (4)	0,0003
$\alpha_{0,10}$	5776 (3)	0,064 (4)
$\alpha_{0,9}$	5783 (4)	0,0031 (6)
$\alpha_{0,8}$	5813 (3)	0,006 (1)
$\alpha_{0,7}$	5925 (3)	0,0285 (24)
$\alpha_{0,6}$	5938,9 (20)	0,128 (3)
$\alpha_{0,5}$	5965,9 (25)	0,064 (16)
$\alpha_{0,4}$	5979,9 (20)	0,39 (7)
$\alpha_{0,3}$	6075,9 (20)	0,15 (3)
$\alpha_{0,2}$	6126,3 (15)	15,1 (2)
$\alpha_{0,1}$	6243 (2)	1,34 (7)
$\alpha_{0,0}$	6341,0 (13)	82,8 (2)

5 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(At) 5,6 - 17,4	3,05 (10)
e _{AK}	(At) 60,489 - 67,031 } KLL 73,811 - 81,516 } KXY 87,10 - 95,72 }	0,114 (6)
ec _{1,0} K	(At) 4,53 (2)	1,51 (13)
ec _{2,1} K	(At) 22,10 (3)	0,13 (10)
ec _{3,2} L	(At) 36,33 - 39,60	0,156 (27)
ec _{4,2} K	(At) 54,49 (3)	0,138 (8)
ec _{1,0} L	(At) 82,77 - 86,04	0,274 (23)
ec _{1,0} M	(At) 95,94 - 97,47	0,065 (5)
ec _{2,0} T	(At) 122,40 - 218,08	4,19 (8)
ec _{2,0} K	(At) 122,40 (2)	1,570 (31)
ec _{2,0} L	(At) 200,64 - 203,91	1,943 (37)
ec _{2,0} M	(At) 213,81 - 215,34	0,515 (10)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(At)	9,8964 — 16,7291	2,18 (7)	
XK α_2	(At)	78,94	0,96 (5)	} K α
XK α_1	(At)	81,51	1,59 (9)	}
XK β_3	(At)	91,73	}	
XK β_1	(At)	92,315	0,55 (6)	K' β_1
XK β_5''	(At)	92,883	}	
XK β_2	(At)	94,846	}	
XK β_4	(At)	95,211	0,18 (2)	K' β_2
XKO _{2,3}	(At)	95,595	}	

6.2 Gamma Emissions


	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{3,2}(\text{At})$	53,81 (3)	0,0145 (25)
$\gamma_{4,3}(\text{At})$	96,3 (3)	0,007 (3)
$\gamma_{1,0}(\text{At})$	100,25 (2)	0,156 (13)
$\gamma_{2,1}(\text{At})$	117,82 (3)	0,022 (16)
$\gamma_{4,2}(\text{At})$	150,21 (3)	0,0449 (25)
$\gamma_{3,1}(\text{At})$	171,83 (3)	0,069 (9)
$\gamma_{10,4}(\text{At})$	208,3 (6)	0,0051 (10)
$\gamma_{2,0}(\text{At})$	218,12 (2)	11,42 (15)
$\gamma_{5,1}(\text{At})$	282,12 (9)	0,0069 (7)
$\gamma_{7,1}(\text{At})$	324,10 (6)	0,0174 (12)
$\gamma_{10,2}(\text{At})$	359,86 (4)	0,0385 (15)
$\gamma_{5,0}(\text{At})$	382,34 (4)	0,0340 (14)
$\gamma_{6,0}(\text{At})$	410,64 (5)	0,1204 (25)
$\gamma_{8,1}(\text{At})$	437,00 (5)	0,0010 (1)
$\gamma_{12,2}(\text{At})$	446,30 (8)	0,0017 (4)
$\gamma_{9,1}(\text{At})$	468,3 (7)	0,0018 (3)
$\gamma_{8,0}(\text{At})$	537,8 (8)	0,0045 (8)
$\gamma_{12,1}(\text{At})$	562,3 (12)	0,005 (5)
$\gamma_{9,0}(\text{At})$	568,5 (3)	0,0012 (4)
$\gamma_{10,0}(\text{At})$	576,9 (4)	0,0030 (6)
$\gamma_{11,0}(\text{At})$	652 (2)	0,0004 (4)
$\gamma_{12,0}(\text{At})$	665 (2)	0,0009 (9)
$\gamma_{13,0}(\text{At})$	809,3 (2)	0,00010 (2)
$\gamma_{14,0}(\text{At})$	891,9 (3)	0,000038 (10)

7 Main Production Modes

Descendant Th – 229

8 References

- A.C.ENGLISH, T.E.CRANSHAW, P.DEMERS, J.A.HARVEY, E.P. HINCKS, J.V. JELLEY, A.N. MAY. Phys.Rev. 72 (1947) 253
(Half-life)
- F.HAGEMANN, L.I.KATZIN, M.H. STUDIER, G.T. SEABORG, A. GHIORSO. Phys.Rev. 79 (1950) 435
(Half-life)
- B.S.DZHELEPOV, R.B.IVANOV, M.A.MIKHAIOVA, L.N.MOSKVIN, O.M.NAZARENKO, V.F.RODIONOV. Izv. Akad. Nauk SSSR Ser.Fiz. 31 (1967) 568
(Alpha energies and intensities)
- W.LOURENS. Thesis Technische Hogeschoo (1967)
(Half-life)
- C.-F.LEANG, G.BASTIN-SCOFFIER. Compt.Rend. 266B (1968) 629
(Alpha energies and intensities, Gamma-ray energies and intensities)
- J.K.DICKENS, J.W.MCCONNELL. Radiochem. Radioanal. Lett. 47 (1981) 331
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- R.G.HELMER, C.W.REICH, M.A.LEE. Int. J.Appl. Radiat. Isotop. 37 (1986) 139
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- Y.A.AKOVALI. Nucl.Data Sheets 61 (1990) 623
(NDS)
- A.RYTZ. At.Data Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Evaluation alpha energies)
- G.ARDISSON, V.BARCI, O.EL SAMAD. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A339 (1994) 168
(Gamma-ray energies and intensities)
- V.G.CHUMIN, S.S.ELISEEV, K.YA.GROMOV, YU.V. NORSEEV, V.I. FOMINYKH, V.V. TSUPKO-SITNIKOV. Bull. Acad. Sci. USSR 59 (1995) 1854
(Beta minus decay branching ratio)
- Yu.S.BUTABAEV, I.ADAM, K.YA.GROMOV, S.S.ELISEEV, R.A.NIYAZOV,YU.V. NORSEEV, V.I. FOMINYKH, A.KH. KholmatoV, V.V. TSUPKO-SITNIKOV, V.G. CHUMIN, M.B. YULDASHEV. Bull. Acad. Sci. USSR 59 (1995) 5
(Gamma-ray energies and intensities)
- R.K.SHELING, C.F.LIANG, P.PARIS. Phys.Rev. C51 (1995) 1192
(Gamma-ray energies, intensities and emission probabilities)
- E.SCHÖNFELD, H.JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data)
- V.G.CHUMIN, J.K.JABBER, K.V.KALYAPKIN, S.A. KUDRYA,V.V. TSUPKO-SITNIKOV, K.YA. GROMOV, V.I. FOMINYKH, T.A. FURYAEV. Bull. Acad. Sci. USSR 61 (1997) 1606
(Beta minus decay branching ratio)
- K.YA.GROMOV, J.K.JABBER, SH.R. MALIKOV, V.I. FOMINYKH, YU.V. Kholnov, V.V. TSUPKO-SITNIKOV, V.G. CHUMIN. Bull. Acad. Sci. USSR 63 (1999) 685
(Gamma-ray energies, intensities and emission probabilities)
- J.GASPARRO, G.ARDISSON, V.BARCI, R.K. SHELING. Phys.Rev. C62 (2000) 064305
(Gamma-ray emission probabilities)
- K.YA.GROMOV, S.A.KUDRYA, SH.R.MALIKOV, V.A. SERGIENKO, V.I. FOMINYKH,V.V. TSUPKO-SITNIKOV, V.G. CHUMIN. Bull. Acad. Sci. USSR 66 (2002) 1519
(Alpha energies and intensities, Gamma-ray energies and intensities)
- Y.A.AKOVALI. Nucl. Data Sheets 100 (2003) 141
(NDS)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q)
- H.B.JEPPESEN, J.BYSKOV-NIELSEN, P.WRIGHT, J.G. CORREIA, L.M. FRAILE, H.O.U.FYNBO, K.JOHNSTON, K. RIISAGER. Eur.Phys.J. A32 (2007) 31
(Half-life)
- M.S.BASUNIA. Nucl. Data Sheets 108 (2007) 633
(NDS)





1 Decay Scheme

Rn-222 disintegrates mainly to the ground state level in Rn-222.

Le radon 222 se désintègre par émission alpha principalement vers le niveau fondamental du polonium 218.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{222}\text{Rn})$:	3,8232 (8)	d
$T_{1/2}(^{218}\text{Po})$:	3,094 (6)	min
$Q^\alpha(^{222}\text{Rn})$:	5590,3 (3)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,2}$	4915 (5)	$\approx 0,0005$	≈ 30
$\alpha_{0,1}$	5080 (2)	0,078	1,9
$\alpha_{0,0}$	5590,3 (3)	99,92 (1)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	511 (2)	0,078	[E2]	0,0213 (4)	0,00704 (13)	0,00177 (4)	0,0306 (6)

3 Atomic Data

3.1 Po

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,965 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,403 \quad (16) \\ n_{KL} &: 0,807 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	76,864	60,05
K α_1	79,293	100
K β_3	89,256	}
K β_1	89,807	}
K β_5''	90,363	} 34,43
K β_2	92,263	}
K β_4	92,618	} 10,71
KO _{2,3}	92,983	}
X _L		
L ℓ	9,66	
L α	11,0161 – 11,1303	
L η	12,0847	
L β	12,8239 – 14,2476	
L γ	15,251 – 16,21	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,2}$	4827 (4)	$\approx 0,0005$
$\alpha_{0,1}$	4987 (1)	0,078
$\alpha_{0,0}$	5489,48 (30)	99,92 (1)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Po)	9,66 — 16,21	0,000766 (15)
XK α_2	(Po)	76,864	0,000469 (10) }
XK α_1	(Po)	79,293	0,000781 (16) }
XK β_3	(Po)	89,256	}
XK β_1	(Po)	89,807	0,000269 (7) K' β_1
XK β_5''	(Po)	90,363	}
XK β_2	(Po)	92,263	}
XK β_4	(Po)	92,618	0,0000837 (25) K' β_2
XKO _{2,3}	(Po)	92,983	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Po})$	510 (2)	0,076


6 Main Production Modes


Ra – 226 decay chain()

7 References

- W. BOTHE. Z. Phys. 16 (1923) 266
(Half-life.)
- I. CURIE, C. CHAMIÉ. J. Phys. Radium 5 (1924) 238
(Half-life.)
- J. TOBAILEM. Compt. Rend. (Paris) 233 (1951) 1360
(Half-life.)
- L. MADANSKY, F. RASETTI. Phys. Rev. 102 (1956) 464
(Gamma energy.)
- P.C. MARIN. Brit. J. Appl. Phys. 7 (1956) 188
(Half-life.)
- J. ROBERT. J. Phys. Radium 17 (1956) 605
(Half-life.)
- N.S. SHIMANSKAYA. Instr. Experiments Techniques 2 (1958) 283
(Half-life.)
- R.J. WALEN, G. BASTIN. Comp. Rend. Congrès Int. Nucl. Phys., Paris (1959) 910
(Alpha energy and probability.)

- B. GRENNBERG, A. RYTZ. Metrologia 7 (1971) 65
(Alpha energy.)
- D.K. BUTT, A.R. WILSON. J. Phys. (London) A5 (1972) 1248
(Half-life.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 23 (1979) 507
(Alpha energy and probabilities.)
- Y. A. ELLIS-AKOVALI. Nucl. Data Sheets 52 (1987) 789
(Spin and parity.)
- N.E. HOLDEN. Pure Appl. Chem. 62 (1990) 941
(Half-life.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha energy and probabilities.)
- R. COLLÉ. Radioact. Radiochem. 6 (1995) 16
(Half-life.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 76 (1995) 457
(Spin and parity.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 77 (1996) 271
(Spin and parity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A729 (2003) 129
(Q.)
- H. SCHRADER. Appl. Rad. Isotopes 60 (2004) 317
(Half-life.)
- R.G. HELMER. IAEA - CRP report to be published (2004)
(Gamma intensity.)
- A.K. JAIN, B. SINGH. Nucl. Data Sheets 107 (2006) 1027
(Spin, parity and multipolarity.)





1 Decay Scheme

Ra-226 disintegrates by alpha emission mainly to the 186 keV level and to the ground state level of Rn-222.

Le radium 226 se désintègre par émission alpha principalement vers le niveau excité de 186 keV et le niveau fondamental de radon 222.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{226}\text{Ra})$:	1600	(7)	a
$T_{1/2}(^{222}\text{Rn})$:	3,8232	(8)	d
$Q^\alpha(^{226}\text{Ra})$:	4870,62	(25)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,4}$	4235,15 (29)	0,0002	8,65
$\alpha_{0,3}$	4269,96 (26)	0,0008	4,5
$\alpha_{0,2}$	4422,25 (28)	0,0066 (22)	10,4
$\alpha_{0,1}$	4684,41 (25)	5,95 (4)	0,96
$\alpha_{0,0}$	4870,62 (25)	94,038 (40)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}}\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Rn})$	186,211 (13)	5,962 (48)	E2	0,190 (3)	0,360 (5)	0,0963 (14)	0,677 (10)
$\gamma_{2,1}(\text{Rn})$	262,27 (5)	0,0066 (22)	[E2]	0,0923 (14)	0,0868 (14)	0,0230 (4)	0,209 (4)
$\gamma_{3,1}(\text{Rn})$	414,60 (5)	0,0003	[E1]	0,01329 (19)	0,00228 (4)	0,000537 (8)	0,01628 (23)
$\gamma_{4,1}(\text{Rn})$	449,37 (10)	0,0002	[E1]	0,01123 (16)	0,00191 (3)	0,000449 (7)	0,01373 (20)
$\gamma_{3,0}(\text{Rn})$	600,66 (5)	0,0005	[E1]	0,00627 (9)	0,001034 (15)	0,000243 (4)	0,00762 (11)

3 Atomic Data

3.1 Rn

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,967 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,428 \quad (17) \\ n_{KL} &: 0,804 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	81,07	60,62
K α_1	83,78	100
K β_3	94,247	}
K β_1	94,868	}
K β_5''	95,449	} 34,68
K β_2	97,48	}
K β_4	97,853	} 11,1
KO _{2,3}	98,357	}
X _L		
L ℓ	10,14	
L α	11,5981 – 11,7259	
L η	12,8551	
L β	13,5219 – 15,1631	
L γ	16,2398 – 17,26	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,4}$	4160 (2)	0,0002
$\alpha_{0,3}$	4191 (2)	0,0008
$\alpha_{0,2}$	4340 (1)	0,0066 (22)
$\alpha_{0,1}$	4601 (1)	5,95 (4)
$\alpha_{0,0}$	4784,34 (25)	94,038 (40)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{1,0} T	(Rn)	87,814 - 186,168	2,407 (36)
ec _{1,0} K	(Rn)	87,814 (13)	0,675 (11)
ec _{1,0} L	(Rn)	168,163 - 171,600	1,280 (18)
ec _{1,0} M	(Rn)	181,738 - 183,327	0,342 (5)
ec _{1,0} N	(Rn)	185,120 - 185,989	0,0892 (14)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Rn)	10,14 — 17,26	0,807 (14)
XK α_2	(Rn)	81,07	0,192 (4) } K α
XK α_1	(Rn)	83,78	0,317 (6) }
XK β_3	(Rn)	94,247	}
XK β_1	(Rn)	94,868	} 0,1098 (25) K' β_1
XK β_5''	(Rn)	95,449	}
XK β_2	(Rn)	97,48	}
XK β_4	(Rn)	97,853	} 0,0351 (10) K' β_2
XKO _{2,3}	(Rn)	98,357	}

6.2 Gamma Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}$ (Rn)		186,211 (13)	3,555 (19)
$\gamma_{2,1}$ (Rn)		262,27 (5)	0,0055 (18)
$\gamma_{3,1}$ (Rn)		414,60 (5)	0,0003
$\gamma_{4,1}$ (Rn)		449,37 (10)	0,0002
$\gamma_{3,0}$ (Rn)		600,66 (5)	0,0005


7 Main Production Modes

U – 238 decay chain

8 References

- I. CURIE, F. JOLIOT. Compt. Rend. (Paris) 187 (1928) 43
(Half-life.)
- H.J.J. BRADDICK, H.M. CAVE. Proc. Roy. Soc. A 121 (1928) 367
(Half-life.)
- S.W. WATSON, M. C. HENDERSON. Proc. Roy. Soc. A 118 (1928) 318
(Half-life.)
- F.A.B. WARD, C. E. WYNN-WILLIAMS, H.M. CAVE. Proc. Roy. Soc. A 125 (1929) 713
(Half-life.)
- L. MEITNER, W. ORTMANN. Z. Phys. 60 (1930) 143
(Half-life.)
- E. GLEITSCH, E. FOEYN. Am. J. Sci. 29 (1935) 253
(Half-life.)
- P. GÜNTHER. Z. Phys. Chem. A 185 (1939) 367
(Half-life.)
- T.P. KOHMAN, D.P. AMES, J. SEDET. NNES 14B (1949) 1675
(Half-life.)
- W. SEBAOUN. Ann. Phys. (Paris) 1 (1956) 680
(Half-life.)
- G.R. MARTIN, D.G. TUCK. Int. J. Appl. Radiat. Isot. 5 (1959) 141
(Half-life.)
- G.V. GORSHKOV, Z.G. GRETCHENKO, A.T. IL'INSKAYA, B.S. KUZNETSOV, N.S. SHIMANSKAYA. At. Energ. (USSR) 7 (1959) 912
(Half-life.)
- F.S. STEPHENS, F. ASARO, I. PERLMAN. Phys. Rev. 119 (1960) 796
(Gamma intensity.)
- G. BASTIN-SCOFFIER, C.F. LEANG, R.J. WALEN. J. Phys. 24 (1963) 854
(Alpha intensity.)
- H. RAMTHUN. Nucleonik 8 (1966) 244
(Half-life.)
- G. WALLACE, G. E. COOTE. Nucl. Instrum. Methods 74 (1969) 353
(Gamma intensity.)
- E.W.A. LINGEMAN, J. KONIJN, P. POLAK, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A 133 (1969) 630
(Gamma intensity.)
- R.S. MOWATT. Can. J. Phys. 48 (1970) 2606
(Gamma intensity.)
- K.YA. GROMOV, B.M. SABIROV , J.J. URBANETS. Bull. Acad. Sci. USSR., Phys. Ser. 33 (1970) 1510
(Gamma intensity.)
- W. LOURENS, A.H. WAPSTRA. Z. Phys. 247 (1971) 147
(Gamma intensity.)
- A. G. DE PINHO, M. WESKLER. Z. Naturforsch. 28a (1973) 1635
(X-ray emission intensities.)
- V.S. ALEKSANDROV. JINR-PL-7308 (1973)
(Gamma intensity.)
- A. HACHEM. Compt. Rend. (Paris) 281B (1975) 45
(Gamma intensity.)
- V. ZOBEL, E. EUBE, J. EBERTH, U. EBERTH. Nucl. Instr. Meth. 141 (1977) 329
(Gamma intensity.)
- G. MOUZE. Compt. Rend. (Paris) 292 (1981) 1243
(Gamma intensity.)
- H. AKCAY, G. MOUZE, D. MAILLARD, CH. YTHIER. Radiochem. Radioanal. Lett 51 (1982) 1
(Gamma intensity.)

- M.A. FAROUK, A.M. AL-SORAYA. Nucl. Instrum. Meth. 200 (1982) 593
(Gamma intensity.)
- D.G. OLSON. Nucl. Instrum. Meth. 206 (1983) 313
(Gamma intensity.)
- U. SCHÖTZIG, K. DEBERTIN. Int. J. Appl. Radiat. Isot. 34 (1983) 533
(Gamma intensity.)
- G. MOUZE, C. YTHIER, J.F. COMANDUCCI. Rev. Roumaine Phys. 35 (1990) 337
(Gamma intensity.)
- N.E. HOLDEN. Pure Appl. Chem. 62 (1990) 941
(Half-life.)
- W.-J. LIN, G. HARBOTTLE. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 153 (1991) 137
(Gamma intensity.)
- A. RYTZ. At. Data Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha emission energies and probabilities.)
- O. DIALLO, G. MOUZE, C. YTHIER, J.F. COMANDUCCI. Nuovo Cim. 106A (1993) 1321
(Gamma intensity.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 77 (1996) 433
(Spin, parity and multipolarity.)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 77 (1996) 271
(Spin, parity and multipolarity.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 369 (1996) 527
(Atomic data.)
- J. MOREL, M. ETCHEVERRY, J.L. PICOLO. Appl. Radiat. Isot. 49 (1998) 1387
(Gamma intensity.)
- D. SARDARI, T.D. MACMAHON. J. Radioanal. Nucl. Chem. 244 (2000) 463
(Gamma intensity.)
- S.P. LAMONT, R.J. GEHRKE, S.E. GLOVER, R.H. FILBY. J. Radioanal. Nucl. Chem. 248 (2001) 247
(Alpha intensity.)
- J.U. DELGADO, J. MOREL, M. ETCHEVERRY. Appl. Radiat. Isot. 56 (2002) 137
(Gamma intensity.)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR., P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data. Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A 729 (2003) 129
(Q.)
- G.L. MOLNAR, Z.S. RÉVAY, T. BELGYA. 11th Int. Symp. on capture gamma-ray Spectroscopy, 2-6 sep. 2002, Pruhonice (2003) 522
(Gamma intensity)
- J. MOREL, S. SPEMAN, M. RASKO, E. TERECHTCHENKO, J.U. DELGADO. Appl. Radiat. Isot. 60 (2004) 341
(Gamma intensity.)
- R.G. HELMER. IAEA - CPR report to be published
(Gamma intensity.)





1 Decay Scheme

Ac-227 disintegrates mainly by beta minus transitions to excited levels in Th-227 and, by weak alpha transitions to Fr-223.

L'actinium 227 se désintègre principalement par transitions bêta vers des niveaux excités du thorium 227, et pour une faible partie par transitions alpha vers le francium 223.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{227}\text{Ac})$:	21,772	(3)	a
$T_{1/2}(^{227}\text{Th})$:	18,718	(5)	d
$T_{1/2}(^{223}\text{Fr})$:	22,00	(7)	min
$Q^\alpha(^{227}\text{Ac})$:	5042,19	(14)	keV
$Q^-(^{227}\text{Ac})$:	44,8	(8)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,24}$	4441,19 (16)	$\approx 0,00004$	8
$\alpha_{0,23}$	4501,45 (29)	$\approx 0,00008$	12
$\alpha_{0,22}$	4526,99 (26)	$\approx 0,0007$	2,1
$\alpha_{0,21}$	4539 (7)	$\approx 0,00007$	26
$\alpha_{0,20}$	4593 (5)	$\approx 0,00004$	108
$\alpha_{0,19}$	4663 (7)	$\approx 0,00004$	340
$\alpha_{0,18}$	4676,72 (17)	$\approx 0,0003$	65
$\alpha_{0,16}$	4797,53 (21) ↑		
$\alpha_{0,15}$	4798,34 (19)		
$\alpha_{0,14}$	4799,56 (16) ↓	0,006 (3)	23
$\alpha_{0,13}$	4819,44 (17) ↑		
$\alpha_{0,12}$	4822,58 (17) ↓	0,0012	142
$\alpha_{0,11}$	4853,09 (16) ↑		
$\alpha_{0,10}$	4855,01 (17) ↓	0,025 (7)	11

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,9}$	4870,11 (15)	0,0011	329
$\alpha_{0,8}$	4881,71 (16)	0,014 (7)	31
$\alpha_{0,6}$	4907,68 (15)	0,001	663
$\alpha_{0,5}$	4941,19 (15) ↑		
$\alpha_{0,4}$	4942,56 (15) ↓	0,08 (1)	13
$\alpha_{0,3}$	4960,06 (15)	0,087 (7)	16
$\alpha_{0,2}$	4987,22 (16)	0,0015	1360
$\alpha_{0,1}$	5029,30 (15)	0,546 (17)	7
$\alpha_{0,0}$	5042,19 (14)	0,658 (14)	7

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,3}^-$	6,9 (8)	0,3	allowed	6,9
$\beta_{0,2}^-$	20,5 (8)	≈ 10	1st forbidden	6,8
$\beta_{0,1}^-$	35,5 (8)	≈ 35	1st forbidden	7
$\beta_{0,0}^-$	44,8 (8)	≈ 53	1st forbidden	7,1

2.3 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Th})$	9,3	≈ 36	E2			244000 (5000)	326000
$\gamma_{1,0}(\text{Fr})$	12,9 (1)	0,698	(E2)			37740 (800)	49860 (1000)
$\gamma_{2,1}(\text{Th})$	15,2 (1)	$\approx 0,15$	M1			177 (4)	238 (5)
$\gamma_{2,0}(\text{Th})$	24,33 (5)	$\approx 9,5$	M1+E2		254 (8)	64,0 (23)	340 (11)
$\gamma_{8,6}(\text{Fr})$	25,95	0,00000055					
$\gamma_{3,1}(\text{Th})$	28,57 (5)	$\approx 0,18$	E1		2,42 (5)	0,616 (13)	3,24 (7)
$\gamma_{6,5}(\text{Fr})$	33,5 (1)	0,00033 (9)	[E1]		1,50 (3)	0,371 (8)	1,99 (4)
$\gamma_{6,4}(\text{Fr})$	35,0 (2)	0,000078 (28)	[E1]		1,34 (3)	0,330 (7)	1,77 (4)
$\gamma_{3,0}(\text{Th})$	37,90 (3)	$\approx 0,12$	E1		1,16 (3)	0,288 (6)	1,54 (3)
$\gamma_{4,2}(\text{Fr})$	44,7 (1)	0,025 (23)	[M1+E2]		165 (150)	44 (40)	223 (200)
$\gamma_{13,9}(\text{Fr})$	51,06	0,00000028					
$\gamma_{10,6}(\text{Fr})$	52,32	0,0000014					
$\gamma_{14,11}(\text{Fr})$	53,7 (2)	0,000064 (16)	[E1]		0,427 (9)	0,104 (2)	0,563 (11)
$\gamma_{2,0}(\text{Fr})$	55,0 (1)	0,0077 (14)	M1+E2		12,5 (6)	2,98 (16)	16,4 (8)
$\gamma_{16,11}(\text{Fr})$	55,80 (5)	0,0000039					
$\gamma_{16,10}(\text{Fr})$	57,56 (5)	0,0000032					
$\gamma_{8,5}(\text{Fr})$	59,4 (2)	0,000059 (14)	[E1]		0,326 (7)	0,0790 (16)	0,430 (9)
$\gamma_{8,4}(\text{Fr})$	60,6 (3)	0,000058 (14)	[E1]		0,309 (6)	0,0749 (15)	0,408 (9)

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{3,1} (Fr)	69,28 (8)	0,076 (14)	M1+E2		13,7 (14)	3,6 (4)	18,4 (19)
γ _{14,10} (Fr)	70,6 (2)	0,0023 (18)	[M1+E2]		20 (14)	5 (4)	27 (19)
γ _{9,4} (Fr)	72,5 (2)	0,000086 (38)	[E1]		0,191 (4)	0,0462 (10)	0,252 (5)
γ _{16,9} (Fr)	72,5 (2)	0,000086 (38)	[E1]		0,191 (4)	0,0462 (10)	0,252 (5)
γ _{6,2} (Fr)	79,54 (8)	0,00132 (12)	E1		0,149 (3)	0,0360 (7)	0,197 (4)
γ _{3,0} (Fr)	82,2 (1)	0,0192 (23)	E2		16,25 (30)	4,40 (9)	22,1 (5)
γ _{15,8} (Fr)	83,0 (1)	0,0000014					
γ _{12,6} (Fr)	85,0 (5)	0,000011					
γ _{10,5} (Fr)	86,1 (1)	0,00047					
γ _{4,1} (Fr)	86,7 (2)	0,034 (20)	[M1+E2]		8 (5)	2,1 (14)	11 (7)
γ _{11,5} (Fr)	88,1 (1)	0,0076 (43)	[M1+E2]		8 (5)	2,0 (13)	10 (6)
γ _{5,1} (Fr)	88,1 (1)	0,0076 (43)	[M1+E2]		8 (5)	2,0 (13)	10 (6)
γ _{13,6} (Fr)	88,5 (6)	0,00000097					
γ _{9,3} (Fr)	90,0 (1)	0,00021 (8)	[E1]		0,107 (2)	0,0259 (5)	0,142 (3)
γ _{4,0} (Fr)	99,6 (1)	0,036 (16)	M1+E2		4,4 (22)	1,2 (7)	6 (3)
γ _{5,0} (Fr)	101,0 (1)	0,0048 (29)	[M1+E2]		4,1 (21)	1,1 (6)	6 (3)
γ _{10,3} (Fr)	105,0 (2)	0,0046 (16)	M1	9,96 (20)	1,86 (4)	0,443 (9)	12,4 (25)
γ _{11,3} (Fr)	106,85 (10)	0,0110 (34)	M(+E2)		5 (2)	3,2 (15)	0,8 (4)
γ _{14,6} (Fr)	108,0 (3)	0,00041 (16)	[M1+E2]		5 (2)	3,1 (15)	0,8 (4)
γ _{12,5} (Fr)	118,7 (4)	0,000054 (13)	[E1]		0,244 (5)	0,0516 (11)	0,0124 (3)
γ _{6,1} (Fr)	121,6 (1)	0,00155 (39)	[E1]		0,231 (5)	0,0485 (10)	0,0116 (3)
γ _{18,15} (Fr)	121,6 (1)	0,00155 (39)	[E1]		0,231 (5)	0,0485 (10)	0,0116 (3)
γ _{6,0} (Fr)	134,5 (1)	0,00068 (12)	E1		0,182 (4)	0,0372 (8)	0,00891 (18)
γ _{12,3} (Fr)	137,4 (1)	0,00050 (12)	[E1]		0,172 (4)	0,0352 (7)	0,00843 (17)
γ _{13,3} (Fr)	140,9 (1)	0,00025 (7)	[E1]		0,162 (4)	0,0330 (7)	0,00789 (16)
γ _{18,13} (Fr)	143,0 (1)	0,0013 (6)	[M1+E2]		2,2 (11)	1,0 (5)	0,26 (13)
γ _{14,4} (Fr)	143,0 (1)	0,00034 (7)	[E1]		0,157 (3)	0,0317 (7)	0,00759 (15)
γ _{16,5} (Fr)	143,65 (5)	0,00015886	M1		4,12 (8)	0,755 (15)	0,180 (4)
γ _{18,12} (Fr)	146,0 (2)	0,0000088					
γ _{8,1} (Fr)	147,61 (8)	0,00296 (36)	E1		0,145 (3)	0,0292 (6)	0,00699 (14)
γ _{7,0} (Fr)	149,3 (3)	0,000014					
γ _{9,1} (Fr)	159,2 (1)	0,00063 (12)	[E1]		0,121 (3)	0,0240 (5)	0,00574 (11)
γ _{8,0} (Fr)	160,49 (10)	0,00506 (46)	E1		0,119 (3)	0,0235 (5)	0,00562 (11)
γ _{15,3} (Fr)	161,4 (4)	0,00049 (23)	[M1+E2]		1,6 (15)	0,64 (9)	0,16 (4)
γ _{16,3} (Fr)	162,6 (2)	0,00019 (12)	M1,E2		1,6 (15)	0,62 (9)	0,16 (4)
γ _{9,0} (Fr)	172,0 (1)	0,00109 (11)	E1		0,101 (2)	0,0197 (4)	0,0047 (1)
γ _{10,1} (Fr)	174,3 (1)	0,00081 (35)	[M1+E2]		1,3 (11)	0,48 (4)	0,122 (17)
γ _{18,11} (Fr)	176,1 (1)	0,000370 (45)	[E1]		0,095 (2)	0,0185 (4)	0,00443 (9)
γ _{11,1} (Fr)	176,1 (1)	0,00096 (40)	M1,E2		1,3 (11)	0,46 (4)	0,117 (17)
γ _{12,1} (Fr)	206,8 (1)	0,00105 (11)	E1		0,0651 (13)	0,0124 (3)	0,00294 (6)
γ _{17,1} (Fr)	216,6 (3)	0,00011 (7)	[M1+E2]		0,7 (6)	0,221 (20)	0,0556 (18)
γ _(-1,1) (Fr)	219,2 (4)	0,0000140 (4)					
γ _{14,1} (Fr)	229,7 (1)	0,00044 (7)	[E1]		0,0509 (11)	0,00951 (19)	0,00226 (5)
γ _{15,1} (Fr)	230,9 (5)	0,0000252	[M1+E2]		0,6 (5)	0,177 (24)	0,045 (4)
γ _{16,1} (Fr)	231,79 (5)	0,0000072					
γ _{14,0} (Fr)	242,6 (2)	0,00030 (7)	[E1]		0,0448 (9)	0,00831 (17)	0,00198 (4)
γ _{15,0} (Fr)	243,9 (4)	0,0000358 (10)	[E2]		0,108 (2)	0,126 (3)	0,0335 (7)
γ _{18,3} (Fr)	283,4 (3)	0,000057 (31)	[E1]		0,0314 (7)	0,00570 (12)	0,00136 (3)
γ _{23,11} (Fr)	351,7 (3)	0,000056 (31)	[E1]		0,0195 (4)	0,00344 (7)	0,000815 (17)
γ _{22,4} (Fr)	415,6 (3)	0,00024 (7)			0,13 (10)	0,028 (12)	0,007 (3)
γ _{23,5} (Fr)	439,60 (5)	0,000034 (1)					
γ _{23,4} (Fr)	441,0 (4)	0,000056 (30)	[E1]		0,0120 (3)	0,00207 (4)	0,00049 (1)
γ _{22,2} (Fr)	460,2 (3)	0,00024 (7)	M1+E2		0,10 (8)	0,021 (10)	0,0051 (22)
γ _{23,1} (Fr)	527,6 (1)	0,000029					
γ _{23,0} (Fr)	540,40 (5)	0,00007					

3 Atomic Data

3.1 Th

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,969 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,476 \quad (18) \\ n_{KL} &: 0,797 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	89,954	61,82
K α_1	93,351	100
K β_3	104,819	}
K β_1	105,604	}
K β_5''	106,239	} 35,58
K β_2	108,509	}
K β_4	108,955	} 11,99
KO _{2,3}	109,442	}
X _L		
L ℓ	11,118	
L α	12,809 – 12,968	
L η	14,511	
L β	14,97 – 16,426	
L γ	18,98 – 19,599	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	68,406 – 76,745	100
KLX	83,857 – 93,345	58,8
KXY	99,29 – 109,64	8,64
Auger L	5,8 – 20,3	

3.2 Fr

ω_K : 0,967 (4)
 $\bar{\omega}_L$: 0,440 (18)
 n_{KL} : 0,803 (5)

3.2.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	83,23	60,92
K α_1	86,1	100
K β_3	96,815	}
K β_1	97,474	}
K β_5''	98,069	}
K β_2	100,16	}
K β_4	100,548	}
KO _{2,3}	100,972	}
X _L		
L ℓ	10,381	
L α	11,896 – 12,032	
L η	13,255	
L β	13,877 – 14,978	
L γ	17,302 – 17,839	

3.2.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	63,576 – 70,787	100
KLX	77,720 – 86,101	57,4
KXY	91,84 – 101,12	8,24
Auger L	5,73 – 18,52	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,24}$	4362,83 (15)	$\approx 0,00004$
$\alpha_{0,23}$	4422,03 (28)	$\approx 0,00008$
$\alpha_{0,22}$	4447,12 (26)	$\approx 0,0007$
$\alpha_{0,21}$	4459 (7)	$\approx 0,00007$
$\alpha_{0,20}$	4512 (5)	$\approx 0,00004$
$\alpha_{0,19}$	4581 (7)	$\approx 0,00004$
$\alpha_{0,18}$	4594,21 (17)	$\approx 0,0003$
$\alpha_{0,16}$	4712,89 (20) ↑	
$\alpha_{0,15}$	4713,68 (19)	
$\alpha_{0,14}$	4714,88 (15) ↓	0,006 (3)
$\alpha_{0,13}$	4734,41 (17) ↑	
$\alpha_{0,12}$	4737,50 (16) ↓	0,0012
$\alpha_{0,11}$	4767,47 (15) ↑	
$\alpha_{0,10}$	4769,35 (17) ↓	0,025 (7)
$\alpha_{0,9}$	4784,19 (15)	0,0011
$\alpha_{0,8}$	4795,58 (15)	0,014 (7)
$\alpha_{0,6}$	4821,09 (15)	0,001
$\alpha_{0,5}$	4854,01 (15) ↑	
$\alpha_{0,4}$	4855,36 (15) ↓	0,08 (1)
$\alpha_{0,3}$	4872,55 (15)	0,087 (7)
$\alpha_{0,2}$	4899,23 (15)	0,0015
$\alpha_{0,1}$	4940,57 (15)	0,546 (17)
$\alpha_{0,0}$	4953,23 (14)	0,658 (14)

5 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
eAL	(Th) 5,8 - 20,3	$\approx 3,9$
eAK	(Th) KLL 68,406 - 76,745 KLX 83,857 - 93,345 KXY 99,29 - 109,64	}
eAL	(Fr) 5,73 - 18,52	0,097 (10)
eAK	(Fr) KLL 63,576 - 70,787 KLX 77,720 - 86,101 KXY 91,84 - 101,12	0,00050 (15)}

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{2,0} L	(Th)	3,9 - 8,0	≈ 7,1
ec _{1,0} M	(Th)	4,1 - 6,0	≈ 27
ec _{3,1} L	(Th)	8,1 - 12,3	≈ 0,1016 (21)
ec _{1,0} M	(Fr)	8,3 - 9,9	0,528 (11)
ec _{2,1} M	(Th)	10,0 - 11,9	≈ 0,11
ec _{3,0} L	(Th)	17,4 - 21,6	≈ 0,0568 (15)
ec _{2,0} M	(Th)	19,2 - 21,0	≈ 1,8
ec _{3,1} M	(Th)	23,39 - 25,24	≈ 0,0259 (5)
ec _{4,2} L	(Fr)	26,1 - 29,7	0,018 (17)
ec _{3,0} M	(Th)	32,7 - 34,6	≈ 0,01411 (29)
ec _{3,1} L	(Fr)	50,65 - 54,26	0,053 (10)
ec _{3,0} L	(Fr)	63,6 - 67,2	0,0135 (16)
ec _{3,1} M	(Fr)	64,64 - 66,29	0,0140 (27)
ec _{4,1} L	(Fr)	68,1 - 71,7	0,022 (14)
ec _{4,0} L	(Fr)	81,0 - 84,6	0,022 (12)
$\beta_{0,3}^-$	max:	6,9 (8)	0,3
$\beta_{0,3}^-$	avg:	1,7 (3)	
$\beta_{0,2}^-$	max:	20,5 (8)	≈ 10
$\beta_{0,2}^-$	avg:	5,1 (3)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	35,5 (8)	≈ 35
$\beta_{0,1}^-$	avg:	9,0 (3)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	44,8 (8)	≈ 53
$\beta_{0,0}^-$	avg:	11,4 (3)	

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Th)	11,118 — 19,599	≈ 2,64
XL	(Fr)	10,381 — 17,839	0,074 (8)
XK α_2	(Fr)	83,23	0,0043 (12) } K α
XK α_1	(Fr)	86,1	0,0070 (19) }
XK β_3	(Fr)	96,815	}
XK β_1	(Fr)	97,474	} 0,0024 (7) K' β_1
XK β'_5	(Fr)	98,069	}
XK β_2	(Fr)	100,16	}
XK β_4	(Fr)	100,548	} 0,00079 (22) K' β_2
XKO _{2,3}	(Fr)	100,972	}

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Th})$	9,3	0,00011
$\gamma_{1,0}(\text{Fr})$	12,9 (1)	0,000014
$\gamma_{2,1}(\text{Th})$	15,2 (1)	0,00062
$\gamma_{2,0}(\text{Th})$	24,33 (5)	0,028
$\gamma_{8,6}(\text{Fr})$	25,95	0,00000055
$\gamma_{3,1}(\text{Th})$	28,57 (5)	0,042
$\gamma_{6,5}(\text{Fr})$	33,5 (1)	0,00011 (3)
$\gamma_{6,4}(\text{Fr})$	35,0 (2)	0,000028 (10)
$\gamma_{9,1}(\text{Fr})$	37,47	0,0000028
$\gamma_{3,0}(\text{Th})$	37,90 (3)	0,049
$\gamma_{4,2}(\text{Fr})$	44,7 (1)	0,00011 (3)
$\gamma_{13,9}(\text{Fr})$	51,06	0,00000028
$\gamma_{10,6}(\text{Fr})$	52,32	0,0000014
$\gamma_{14,11}(\text{Fr})$	53,7 (2)	0,000041 (10)
$\gamma_{2,0}(\text{Fr})$	55,0 (1)	0,00044 (8)
$\gamma_{16,11}(\text{Fr})$	55,80 (5)	0,0000039
$\gamma_{16,10}(\text{Fr})$	57,56 (5)	0,0000032
$\gamma_{8,5}(\text{Fr})$	59,4 (2)	0,000041 (10)
$\gamma_{8,4}(\text{Fr})$	60,6 (3)	0,000041 (10)
$\gamma_{3,1}(\text{Fr})$	69,28 (8)	0,0039 (6)
$\gamma_{14,10}(\text{Fr})$	70,6 (2)	0,000083 (30)
$\gamma_{9,4}(\text{Fr})$	72,5 (2)	0,000069 (30)
$\gamma_{16,9}(\text{Fr})$	72,5 (2)	0,000069 (30)
$\gamma_{6,2}(\text{Fr})$	79,54 (8)	0,0011 (1)
$\gamma_{3,0}(\text{Fr})$	82,2 (1)	0,00083 (10)
$\gamma_{15,8}(\text{Fr})$	83,0 (1)	0,0000014
$\gamma_{12,6}(\text{Fr})$	85,0 (5)	0,000011
$\gamma_{10,5}(\text{Fr})$	86,1 (1)	0,00047
$\gamma_{4,1}(\text{Fr})$	86,7 (2)	0,0028 (4)
$\gamma_{11,5}(\text{Fr})$	88,1 (1)	0,00069 (10)
$\gamma_{5,1}(\text{Fr})$	88,1 (1)	0,00069 (10)
$\gamma_{13,6}(\text{Fr})$	88,5 (6)	0,00000097
$\gamma_{9,3}(\text{Fr})$	90,0 (1)	0,00018 (7)
$\gamma_{4,0}(\text{Fr})$	99,6 (1)	0,0051 (7)
$\gamma_{5,0}(\text{Fr})$	101,0 (1)	0,00069 (30)
$\gamma_{10,3}(\text{Fr})$	105,0 (2)	0,00034 (10)
$\gamma_{11,3}(\text{Fr})$	106,85 (10)	0,0011 (1)
$\gamma_{14,6}(\text{Fr})$	108,0 (3)	0,000041 (10)
$\gamma_{12,5}(\text{Fr})$	118,7 (4)	0,000041 (10)
$\gamma_{6,1}(\text{Fr})$	121,6 (1)	0,0012 (3)
$\gamma_{18,15}(\text{Fr})$	121,6 (1)	0,0012 (3)
$\gamma_{6,0}(\text{Fr})$	134,5 (1)	0,00055 (10)
$\gamma_{12,3}(\text{Fr})$	137,4 (1)	0,00041 (10)
$\gamma_{13,3}(\text{Fr})$	140,9 (1)	0,00021 (6)
$\gamma_{14,4}(\text{Fr})$	143,0 (1)	0,00028 (6)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{18,13}(\text{Fr})$	143,0 (1)	0,00028 (6)
$\gamma_{16,5}(\text{Fr})$	143,65 (5)	0,000026
$\gamma_{18,12}(\text{Fr})$	146,0 (2)	0,0000088
$\gamma_{8,1}(\text{Fr})$	147,61 (8)	0,0025 (3)
$\gamma_{7,0}(\text{Fr})$	149,3 (3)	0,000014
$\gamma_{9,1}(\text{Fr})$	159,2 (1)	0,00055 (10)
$\gamma_{8,0}(\text{Fr})$	160,49 (10)	0,0044 (4)
$\gamma_{15,3}(\text{Fr})$	161,4 (4)	0,00014 (4)
$\gamma_{16,3}(\text{Fr})$	162,6 (2)	0,000055 (30)
$\gamma_{9,0}(\text{Fr})$	172,0 (1)	0,00097 (10)
$\gamma_{10,1}(\text{Fr})$	174,3 (1)	0,00028 (6)
$\gamma_{18,11}(\text{Fr})$	176,1 (1)	0,00033 (4)
$\gamma_{11,1}(\text{Fr})$	176,1 (1)	0,00033 (6)
$\gamma_{12,1}(\text{Fr})$	206,8 (1)	0,00097 (10)
$\gamma_{17,1}(\text{Fr})$	216,6 (3)	0,000055 (30)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Fr})$	219,2 (4)	0,0000140 (4)
$\gamma_{14,1}(\text{Fr})$	229,7 (1)	0,00041 (7)
$\gamma_{15,1}(\text{Fr})$	230,9 (5)	0,000014
$\gamma_{16,1}(\text{Fr})$	231,79 (5)	0,0000072
$\gamma_{14,0}(\text{Fr})$	242,6 (2)	0,00028 (7)
$\gamma_{15,0}(\text{Fr})$	243,9 (4)	0,0000280 (8)
$\gamma_{18,3}(\text{Fr})$	283,4 (3)	0,000055 (30)
$\gamma_{23,11}(\text{Fr})$	351,7 (3)	0,000055 (30)
$\gamma_{22,4}(\text{Fr})$	415,6 (3)	0,00021 (6)
$\gamma_{23,5}(\text{Fr})$	439,60 (5)	0,000034 (1)
$\gamma_{23,4}(\text{Fr})$	441,0 (4)	0,000055 (30)
$\gamma_{22,2}(\text{Fr})$	460,2 (3)	0,00021 (6)
$\gamma_{23,1}(\text{Fr})$	527,6 (1)	0,000029
$\gamma_{23,0}(\text{Fr})$	540,40 (5)	0,00007

7 Main Production Modes


Ra – 226(n, γ)Ra – 227



Ra – 227(β^-)Ac – 227


8 References


- J.M. HOLLANDER, R.F. LEININGER. Phys. Rev. 80 (1950) 915 (Half-life)
- J. TOBAILEM. J. Phys. Radium 16 (1955) 48 (Half-life)
- N.S. SHIMANSKAYA, E.A. YASHUGINA. At.Energ. 1 (1956) 133 (Half-life)
- G.I. NOVIKOVA, .A. VOLKOVA, L.I. GOLDIN, D.M. ZIV, L.I. TRETYAKOVA. Zh. Eksp. Teor. Fyz. 37 (1959) 928 (Total alpha-transition probability, gamma-ray energies and alha- energies, electron conversion)


- J. ROBERT. Ann. Phys.(Paris) 4 (1959) 89
(Half-life)
- J.F. EICHELBERGER, G.R. GROVE, L.V. JONES AND E.A. REMBOLD. Report MLM-1155 (1963) p.12
(Half-life)
- G. BASTIN, C.-F. LEANG, AND R.J. WALEN. Compt.Rend. 262B (1966) 370
(alpha-transition probabilities and alpha- energies)
- K.C. JORDAN, B.C. BLANKE. IAEA, Vienna (1967) p.567
(Half-life)
- H.W. KIRBY. J. Inorg. Nucl. Chem. 32 (1970) 2823
(Total alpha-transition probability)
- M. MONSECOUR, P. DE REGGE, A. DEMILDIT, AND L.H. BAETSLE. J. Inorg. Nucl. Chem. 36 (1974) 719
(Total alpha-transition probability)
- A. RYTZ, R.A.P. WILTSHERE, M. KING. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A253 (1986) 47
(alpha-transition energies)
- A. RYTZ. At. Data Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(alpha-transition energies)
- R.K. SHELINE, C.F. LIANG, P. PARIS, J. KVASIL, D. NOSEK. Phys.Rev. C51 (1995) 1708
(Gamma-ray energies)
- C.F. LIANG, P. PARIS, R.K. SHELINE, D. NOSEK, J. KVASIL. Phys. Rev. C51 (1995) 1199
(Beta emission probabilities)
- U. MULLER, P. SEVENICH, K. FREITAG, C. GUNTHER, P. HERZOG, G.D. JONES, C. KLIEM, J. MANNNS, T. WEBER, B. WILL, AND THE ISOLDE COLLABORATION. Phys.Rev. C55 (1997) 2267
(Gamma-ray energies)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A369 (2000) 527
(EMISSION computer code)
- E.BROWNE. Nucl.Data Sheets 93 (2001) 763
(Decay scheme of ^{227}Ac , gamma-ray multipolarities, admixture coefficients)
- E. BROWNE. Nuclear Data Sheets 93 (2001) 920
(Decay scheme of ^{231}U , gamma- ray emission probabilities of gamma (2,0) and gamma (2,1) in ^{227}Th)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. Atom. Data and Nucl. Data Tables 91 (2002) 1
(Theoretical internal conversion coefficients)
- M.M. BÉ, R. HELMER, V. CHISTÉ. J. Nucl. Sci. Tech. suppl.2 (2002) 481
(Saisinuc software)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q value)











1 Decay Scheme

Uranium 232 decays primarily by alpha decay to excited states in Th-228. A small branching of exotic decay via Ne-24 emission and a smaller branching of spontaneous fission have been reported.

L'uranium 232 se désintègre essentiellement par transitions alpha vers des niveaux excités de thorium 228. De faibles décroissances par fission spontanée et par émission de néon 24 ont été observées.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{232}\text{U})$:	70,6	(11)	a
$T_{1/2}(^{228}\text{Th})$:	1,9127	(6)	a
$Q^\alpha(^{232}\text{U})$:	5413,63	(9)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,8}$	4539,16 (9)	0,0000033 (9)	33
$\alpha_{0,7}$	4581,81 (9)	0,0000214 (16)	10,6
$\alpha_{0,6}$	4894,44 (9)	0,000054 (4)	712
$\alpha_{0,5}$	5017,55 (9)	0,000048 (4)	5270
$\alpha_{0,4}$	5035,45 (9)	0,000051 (6)	6490
$\alpha_{0,3}$	5085,63 (9)	0,00622 (9)	112
$\alpha_{0,2}$	5226,81 (9)	0,325 (6)	16,4
$\alpha_{0,1}$	5355,87 (9)	30,6 (6)	1,04
$\alpha_{0,0}$	5413,63 (9)	69,1 (6)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Th})$	57,752 (13)	30,8 (8)	E2	0	112,2 (16)	30,7 (5)	153,2 (22)
$\gamma_{2,1}(\text{Th})$	129,064 (6)	0,325 (5)	E2	0,264 (4)	2,54 (4)	0,697 (10)	3,74 (6)
$\gamma_{6,4}(\text{Th})$	141,013 (12)	0,0000038 (16)	E1	0,1690 (24)	0,0362 (5)	0,00876 (13)	0,217 (3)
$\gamma_{4,2}(\text{Th})$	191,356 (11)	0,000055 (5)	E2	0,1710 (24)	0,443 (7)	0,1209 (17)	0,776 (11)
$\gamma_{5,2}(\text{Th})$	209,255 (11)	0,0000119 (33)	E1	0,0672 (10)	0,01333 (19)	0,00321 (5)	0,0848 (12)
$\gamma_{3,1}(\text{Th})$	270,244 (6)	0,00332 (7)	E1	0,0376 (6)	0,00716 (10)	0,001717 (24)	0,0470 (7)
$\gamma_{3,0}(\text{Th})$	328,003 (4)	0,00292 (7)	E1	0,0245 (4)	0,00455 (7)	0,001089 (16)	0,0305 (5)
$\gamma_{6,2}(\text{Th})$	332,369 (7)	0,0000505 (31)	E1	0,0238 (4)	0,00441 (7)	0,001056 (15)	0,0297 (5)
$\gamma_{5,1}(\text{Th})$	338,319 (11)	0,0000381 (19)	E1	0,0229 (4)	0,00424 (6)	0,001014 (15)	0,0285 (4)
$\gamma_{8,5}(\text{Th})$	478,395 (21)	0,0000014 (6)	E1	0,011180 (16)	0,00198 (3)	0,000471 (7)	0,01379 (20)
$\gamma_{7,3}(\text{Th})$	503,820 (11)	0,0000147 (9)	E1	0,01009 (15)	0,001775 (25)	0,000422 (6)	0,01243 (18)
$\gamma_{8,3}(\text{Th})$	546,470 (18)	0,0000010 (6)	E1	0,00861 (12)	0,001500 (21)	0,000357 (5)	0,01058 (15)
$\gamma_{7,1}(\text{Th})$	774,064 (11)	0,0000048 (8)	E2	0,01204 (17)	0,00333 (5)	0,000835 (12)	0,01649 (23)
$\gamma_{8,1}(\text{Th})$	816,714 (18)	0,00000083 (31)	M1+E2	0,0284 (4)	0,00566 (8)	0,001369 (20)	0,0359 (5)
$\gamma_{7,0}(\text{Th})$	831,823 (10)	0,000002 (1)	E0				

3 Atomic Data

3.1 Th

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,969 (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,476 (18) \\ n_{KL} &: 0,797 (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X_K		
$K\alpha_2$	89,954	61,82
$K\alpha_1$	93,351	100
$K\beta_3$	104,819	}
$K\beta_1$	105,604	}
$K\beta_5''$	106,239	}
		35,58
$K\beta_2$	108,509	}
$K\beta_4$	108,955	}
$KO_{2,3}$	109,442	}
		11,99
X_L		
$L\ell$	11,1177	
$L\alpha$	12,8085 – 12,967	
$L\eta$	14,509	
$L\beta$	14,972 – 16,4253	
$L\gamma$	18,3633 – 19,5043	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	68,406 – 76,745	100
KLX	83,857 – 93,345	58,8
KXY	99,29 – 109,64	8,64
Auger L		
	5,8 – 20,3	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,8}$	4460,86 (9)	0,0000033 (9)
$\alpha_{0,7}$	4502,77 (9)	0,0000214 (16)
$\alpha_{0,6}$	4810,01 (9)	0,000054 (4)
$\alpha_{0,5}$	4931,00 (9)	0,000048 (4)
$\alpha_{0,4}$	4948,59 (9)	0,000051 (6)
$\alpha_{0,3}$	4997,90 (9)	0,00622 (9)
$\alpha_{0,2}$	5136,64 (9)	0,325 (6)
$\alpha_{0,1}$	5263,48 (9)	30,6 (6)
$\alpha_{0,0}$	5320,24 (9)	69,1 (6)

5 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Th) 5,8 - 20,3	11,62 (22)
e _{AK}	(Th) 68,406 - 76,745 } 0,00057 (8)	
	KLX 83,857 - 93,345 }	
	KXY 99,29 - 109,64 }	
ec _{1,0} L	(Th) 37,28 - 41,50	22,4 (6)
ec _{1,0} M	(Th) 52,57 - 54,42	6,14 (16)
ec _{1,0} N	(Th) 56,420 - 57,417	1,646 (41)
ec _{2,1} L	(Th) 108,592 - 112,800	0,1742 (33)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Th)	11,1177 — 19,5043	11,00 (24)
XK α_2	(Th)	89,954	0,00524 (11) } K α
XK α_1	(Th)	93,351	0,00847 (16) }
XK β_3	(Th)	104,819	}
XK β_1	(Th)	105,604	0,00301 (7) K' β_1
XK β_5''	(Th)	106,239	}
XK β_2	(Th)	108,509	}
XK β_4	(Th)	108,955	0,001016 (29) K' β_2
XKO _{2,3}	(Th)	109,442	}

6.2 Gamma Emissions


	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}$ (Th)	57,752 (13)	0,200 (4)
$\gamma_{2,1}$ (Th)	129,065 (3)	0,0686 (7)
$\gamma_{6,4}$ (Th)	140,999 (20)	0,0000031 (13)
$\gamma_{4,2}$ (Th)	191,351 (11)	0,000031 (3)
$\gamma_{5,2}$ (Th)	209,252 (6)	0,000011 (3)
$\gamma_{3,1}$ (Th)	270,245 (7)	0,00317 (7)
$\gamma_{3,0}$ (Th)	328,004 (7)	0,00283 (7)
$\gamma_{6,2}$ (Th)	332,371 (6)	0,000049 (3)
$\gamma_{5,1}$ (Th)	338,320 (5)	0,0000370 (18)
$\gamma_{8,5}$ (Th)	478,41 (5)	0,0000014 (6)
$\gamma_{7,3}$ (Th)	503,819 (23)	0,0000145 (9)
$\gamma_{8,3}$ (Th)	546,454 (21)	0,0000010 (6)
$\gamma_{7,1}$ (Th)	774,05 (9)	0,0000047 (8)
$\gamma_{8,1}$ (Th)	816,62 (700)	0,0000008 (3)


7 References

- J. W. GOFMAN, SEABORG G. T.. National Nuclear Energy Series 14B (1949) 1427 (Half life)
- R. A. JAMES, A. E. FLORIN, H. H. HOPKINS JR., A. GHIORSO. National Nuclear Energy Series 14B (1949) 1604 (Half life)

- P. A. SELLERS, C. M. STEVENS, M. H. STUDIER. Phys. Rev. 94 (1954) 952
(Half life)
- G. SCHARFF-GOLDHABER, E. MATEOSIAN, G. HARBOTTLE, M. McKEOWN. Phys. Rev. 99 (1955) 180
(Alpha-particle emissions)
- F. ASARO, I. PERLMAN. Phys. Rev. 99 (1955) 37
(Alpha-particle emissions)
- C. M. LEDERER. Thesis, Univ. of California UCRL-11028 (1963)
(Alpha-gamma coincidence measurements)
- J. M. CHILTON, R. A. GILBERT, R. E. LEUZE, W. S. LYON. J. Inorg. Nucl. Chem. 26 (1964) 395
(Half life)
- G. BERTOLINI, F. CAPPELLANI, G. RESTELLI, H. L. SCHERFF. Nucl. Phys. 68 (1965) 170
(Alpha-particle emissions)
- I. AHMAD. Thesis, Univ. of California UCRL-16888 (1966)
(Gamma-ray emission probabilities)
- S. A. BARANOV, L. G. ALIEV, V. M. KULAKOV AND V. M. SHATINSII. Sov. J. Nucl. Phys. 4 (1967) 673
(Alpha-particle emissions)
- M. HERMENT, C. VIEU. C. R. Acad. Sci. B 273 (1971) 1058
(Gamma-ray emission energies)
- H. W. TAYLOR. Appl. Rad. Isotopes 24 (1973) 594
(Gamma-ray emission energies)
- W. KURCEWICZ, N. KAFFRELL, N. TRAUTMANN, A. PLOCHOCKI, J. ZYLCZ, M. MATUL, K. STRYCZNIEWICZ. Nucl. Phys. A 289 (1977) 1
(Gamma-ray emission energies and probabilities)
- H. G. BORNER, G. BARREAU, W. F. DAVIDSON, P. JEUCH, T. VON EGIDY, J. ALMEIDA, J. H. WHITE. Nucl. Instrum. Meth. 166 (1979) 251
(Gamma-ray emission energies.)
- R. G. HELMER. Nucl. Instrum. Meth. 164 (1979) 355
(Gamma-ray emission energies)
- S. K. AGGARWAL, S. B. MANOHAR, S. N. ACHARYA, S. PRAKASH, H. C. JAIN. Phys. Rev. C 20 (1979) 1533
(Half life)
- A. L. NICHOLS, M. F. JAMES. AEA Winthrith Report 1407 (1981)
(Previous evaluation)
- A. S. MAHAJAN, M. S. BIDARKUNDI. Ind. J. Pure Appl. Phys. 20 (1982) 701
(Conversion electron measurements)
- R. J. GERHKE, V. J. NOVICK, BAKER J. D.. Appl. Rad. Isotopes 35 (1984) 581
(Gamma-ray emission probabilities)
- S. W. BARWICK, P. B. PRICE, J. D. STEVENSON. Phys. Rev. C 62 (1985) 1984
(Cluster decay)
- M. F. BANHAM, R. MCCROHON. AERE Report 11353 (1986)
(Gamma-ray emission probabilities)
- J. DALMASSO, H. MARIA, G. ARDISSON. Phys. Rev. C 36 (1987) 2510
(Gamma-ray emission energies)
- R. BONETTI, E. FIORETTO, C. MAGLIORINO, A. PASINETTI, F. BARRANCO, E. VIGEZZI, R. A. BROGIA.. Phys.Lett. B 241 (1990) 179
(Cluster decay and spontaneous fission)
- H. BALTZER, K. FRIETAG, C. GUNTHER, P. HERZOG, J. MANNS, U. MULLER, R. PAULSEN, P. SEVENICH, T. WEBER, B. Z. WILL. Z. Phys. A 352 (1995) 47
(Gamma-ray emission energies)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. A 369 (1996) 527
(X-ray and electron emissions)
- A. ARTNA-COHEN. Nucl. Data Sheets 80 (1997) 723
(Adopted levels and gamma transitions)
- R. BONETTI, A. GUGLIELMETTI. Phys. Rev. C 62 (2000) 047304
(Spontaneous fission and cluster decay)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Appl. Rad. Isotopes 52 (2000) 596
(Electron and X-ray emissions)
- R. G. HELMER, C. VAN DER LEUN. Nucl. Instrum. Meth. A 450 (2000) 35
(Gamma-ray reference energies)
- A. H. WAPSTRA, G. AUDI, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A 729 (2003) 129
(Q-value)

- G. AUDI, A. H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl.Phys. A 729 (2003) 337
(Q-value)
- T. KIBEDI, T. W. BURROWS, M. B. TRZHASKOVSKOYA, C. W. NESTOR. ANU-P 1684 (2004)
(The BrIcc code for internal conversion coefficients)





1 Decay Scheme

U-236 disintegrates by alpha emission mainly to the ground and 49-keV states in Th-232, and by $9,3 \times 10^{-8} \%$ spontaneous fission.

L'uranium 236 se désintègre par émission alpha et par fission spontanée dans une proportion p (FS) = $9,3 \times 10^{-8} \%$. L'émission alpha a lieu principalement vers le niveau excité de 49 keV et le niveau fondamental de thorium 232. Le nombre moyen n (FS) de neutrons émis par transformation nucléaire de U-236 est : n (FS) = p (FS) $\times \nu = 1,76 \cdot 10^{-9}$

avec p (FS) = $9,3 \cdot 10^{-10}$

ν égal à $1,89 \pm 0,05$ est le nombre moyen de neutrons émis par fission spontanée.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{236}\text{U})$:	23,43	(6)	10^6 a
$T_{1/2}(^{232}\text{Th})$:	14,05	(6)	10^9 a
$Q^\alpha(^{236}\text{U})$:	4573,1	(9)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,3}$	4240	0,00014 (5)	1160
$\alpha_{0,2}$	4407 (8)	0,149 (22)	27,3
$\alpha_{0,1}$	4522 (5)	26,1 (40)	1,2
$\alpha_{0,0}$	4571 (3)	73,8 (40)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+\text{ce}} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Th})$	49,46 (10)	26,3 (40)	E2		237 (7)	65,0 (19)	324 (10)
$\gamma_{2,1}(\text{Th})$	112,79 (10)	0,150 (24)	E2	0,229 (7)	4,71 (14)	1,295 (39)	6,67 (20)
$\gamma_{3,2}(\text{Th})$	171,15 (20)	0,000142 (48)	E2	0,204 (6)	0,719 (22)	0,197 (6)	1,186 (36)

3 Atomic Data

3.1 Th

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,969 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,476 \quad (18) \\ n_{KL} &: 0,797 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X_K		
$K\alpha_2$	89,954	61,82
$K\alpha_1$	93,351	100
$K\beta_3$	104,819	}
$K\beta_1$	105,604	}
$K\beta_5''$	106,239	}
		35,58
$K\beta_2$	108,509	}
$K\beta_4$	108,955	}
$KO_{2,3}$	109,442	}
		11,99
X_L		
$L\ell$	11,118	
$L\alpha$	12,809 – 12,968	
$L\eta$	14,511	
$L\beta$	14,97 – 16,426	
$L\gamma$	18,98 – 19,599	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	68,406 – 76,745	100
KLX	83,857 – 93,345	59,7
KXY	99,29 – 109,64	8,67
Auger L	5,8 – 20,3	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,3}$	4168	0,00014 (5)
$\alpha_{0,2}$	4332 (8)	0,149 (22)
$\alpha_{0,1}$	4445 (5)	26,1 (40)
$\alpha_{0,0}$	4494 (3)	73,8 (40)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Th)	5,8 – 20,3	10,1 (12)
e _{AK}	(Th)		0,000139 (30)
	KLL	68,406 - 76,745	}
	KLX	83,857 - 93,345	}
	KXY	99,29 - 109,64	}
e _{c1,0 L}	(Th)	28,99 – 33,20	19,2 (29)
e _{c1,0 M}	(Th)	44,28 – 46,13	5,3 (8)
e _{c1,0 N}	(Th)	48,13 – 49,12	1,41 (21)
e _{c2,1 L}	(Th)	92,32 – 96,50	0,092 (15)
e _{c2,1 M}	(Th)	107,61 – 109,46	0,0253 (41)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Th)	11,118 — 19,599	9,4 (10)
XK α_2	(Th)	89,954	0,00128 (22) } K α
XK α_1	(Th)	93,351	0,0021 (4) }
XK β_3	(Th)	104,819	}
XK β_1	(Th)	105,604	0,00074 (13) K' β_1
XK β_5''	(Th)	106,239	}
XK β_2	(Th)	108,509	}
XK β_4	(Th)	108,955	0,00025 (5) K' β_2
XKO _{2,3}	(Th)	109,442	}

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}$ (Th)	49,46 (10)	0,081 (12)
$\gamma_{2,1}$ (Th)	112,79 (10)	0,0195 (31)
$\gamma_{3,2}$ (Th)	171,15 (20)	0,000065 (22)


7 Main Production Modes

$\text{U} - 235(n,\gamma)\text{U} - 236 \quad \sigma : 98,3 (8) \text{ barns}$

8 References

- A.H.JAFFEY, A. HIRSCH (CITED IN E.K. HYDE, THE NUCLEAR PROPERTIES OF THE HEAVY ELEMENTS (PRENTICE-HALL, ENGLEWOOD CLIFFS, 1964), VOL. III, P. 75. (1949)
(Half-life)
- A.H.JAFFEY, H. DIAMOND, A. HIRSCH, J. MECH. Phys. Rev. No. 84 (1951) 785-786
(Alpha emission energies, Half-life)
- E.H. FLEMING JR., A. GHIORSO, B.B. CUNNINGHAM. Phys. Rev. No. 88 (1952) 642-652
(Half-life)
- A.P.KOMAR, G.A.KOROLEV,G.E.KOCHAROV. Zh. Eksp. Teor. Fiz. No. 38 (1960) 1436-1439
(Alpha emission energies, Alpha emission probabilities)
- H. CONDE, M. HOLMBERG. J. Nucl. Energy No. 25 (1971) 331-338
(Half-life)

- K.F. FLYNN, A.H. JAFFEY, W.C. BENTLEY, A.M. ESSLING. J. Inorg. Nucl. Chem. No. 34 (1972) 1121-1129
(Half-life)
- M. SCHMORAK, C.E. BEMIS JR., M.J. ZENDER, N.B. GOVE, P.F. DITTNER. Nucl. Phys. No. A178 (1972) 410-416
(Gamma-ray energies)
- H.R.VON GUNten, A. GRUETTER, H.W. REIST, M. BAGGENSTOS. Phys. Rev. No. C23 (1981) 1110-1112
(Half-life)
- S.N. BELENKY, M.D. SKOROKHvATOV, A.V. ETENKO. Sov. At. Energy No. 55 (1983) 528-531
(Half-life, Spontaneous fission probability)
- S.F. MUGHABGHAB. Neutron Cross Sections, Part B, Z = 61-100 Academic Press (1984)
(Production modes)
- E. BROWNE, R.B. FIRESTONE. Table of Radioactive Isotopes John Wiley & Sons (1986)
(X-rays energies and emission probabilities)
- M.J. WOODS, A.S. MUNSTER. NPL Report RS(EXT) 95 (1988)
(LWM method for averaging numbers)
- N.E. HOLDEN. Pure Appl. Chem. 61 (1989) 1483-1504
(Total and spontaneous fission half-lives)
- J.L. ITURBE. Appl. Rad. Isotopes No. 43 (1992) 817-818
(Alpha emission energies, Alpha emission probabilities)
- S.P. TRETYAKOVA, V.L. MIKHEEV, V.A. PONOMARENKO, A.N. GOLOVCHENKO, A.A. OGLOBLIN, V.A. SHIGIN.
Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 59 (1994) 368
(Cluster decay)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Appl. Rad. Isotopes No. 52 (2000) 595-600
(X-ray emission probabilities, X-ray energies, Auger electron emission probabilities, Auger electron energies)
- D. MACMAHON, E. BROWNE. LWEIGHT, A Computer Program to Calculate Averages Ver. 1.3. (2000)
(Software for evaluation)
- R.J. GEHRKE, J.D. BAKER, C.L. RIDDLE. Appl. Rad. Isotopes No. 56 (2002) 567-568
(Gamma-ray emission probabilities, Gamma ray energies)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337-676
(Q value)
- M.M. BÉ, C. DULIEU. LWEIGHT4 (2005)
(Software for evaluation)
- T. KIBEDI, T.W. BURROWS, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR JR.. BrIcc Program Package v 2.0 ANU-P/1684 (2005)
(K ICC, L ICC, T ICC, Theoretical ICC)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets No. 107 (2006) 2579-2648
(Atomic Data, Spin and Parity, T ICC, Multipolarities, Alpha emission energies, Alpha emission probabilities, Gamma ray energies)
- M.M. BÉ. SAISINUC 2000 Manual LNE-LNHB, CEA-Saclay (2006)
(Evaluation software)





1 Decay Scheme

Le neptunium 237 se désintègre par émission alpha vers les niveaux excités et le niveau fondamental de protactinium 233 de 27 jours de période.

Np-237 disintegrates by alpha emission to the excited levels and to the fundamental level of Pa-233 which has a half-life of 27 days.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{237}\text{Np})$:	2,144	(7)	10^6 a
$T_{1/2}(^{233}\text{Pa})$:	26,98	(2)	d
$Q^\alpha(^{237}\text{Np})$:	4958,3	(12)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,20}$	4592,6 (19)	0,038 (4)	65
$\alpha_{0,19}$	4628,6 (22)	0,011 (3)	84000
$\alpha_{0,18}$	4652 (3)	0,048 (23)	139
$\alpha_{0,17}$	4657,2 (14)	0,393 (23)	19,1
$\alpha_{0,16}$	4678,1 (18)	0,373 (9)	27
$\alpha_{0,15}$	4699,0 (21)	0,032 (8)	46000
$\alpha_{0,14}$	4720 (1)	6,43 (3)	3,14
$\alpha_{0,13}$	4745,0 (9)	3,46 (3)	8,9
$\alpha_{0,12}$	4756,7	0,38 (2)	
$\alpha_{0,11}$	4778,9 (8)	0,535 (10)	99
$\alpha_{0,10}$	4789,1 (20) }		56
$\alpha_{0,9}$	4793,2 (20) }	1,174 (13)	51
$\alpha_{0,8}$	4822,7 (20)	0,019	5932
$\alpha_{0,7}$	4848,3 (8)	9,5 (3)	17,9
$\alpha_{0,6}$	4853,3 (8)	23,0 (3)	7,8
$\alpha_{0,4}$	4870,0 (9)	47,64 (6)	5

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,3}$	4886 (1)	2,02 (2)	152
$\alpha_{0,2}$	4899,5 (10)	2,430 (17)	156
$\alpha_{0,1}$	4949,9 (14)	0,51 (3)	1570
$\alpha_{0,0}$	4956,4 (14)	2,41 (3)	387

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{7,6}(\text{Pa})$	5,18						
$\gamma_{1,0}(\text{Pa})$	6,65 (5)		(M1)			2231	3016
$\gamma_{5,4}(\text{Pa})$	8,22 (5)	9					
$\gamma_{6,5}(\text{Pa})$	9						
$\gamma_{13,12}(\text{Pa})$	10,7						
$\gamma_{6,4}(\text{Pa})$	17,40 (5)						
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Pa})$	21,5						
$\gamma_{7,4}(\text{Pa})$	22,6						
$\gamma_{8,7}(\text{Pa})$	24,14 (10)						
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Pa})$	27,7						
$\gamma_{4,2}(\text{Pa})$	29,374 (20)	57,2 (21)	E1		2,30 (5)	0,586 (12)	3,07 (6)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Pa})$	29,6						
$\gamma_{12,10}(\text{Pa})$	32,46						
$\gamma_{14,12}(\text{Pa})$	36,32 (2)	0,50 (14)	M1+E2		74 (14)	18 (4)	99 (20)
$\gamma_{13,10}(\text{Pa})$	43,2						
$\gamma_{6,2}(\text{Pa})$	46,53 (6)	0,205 (12)	[E1]		0,687 (14)	0,171 (4)	0,914 (18)
$\gamma_{19,15}(\text{Pa})$	48,96 (10)						
$\gamma_{9,7}(\text{Pa})$	54,4 (1)						
$\gamma_{2,0}(\text{Pa})$	57,104 (20)	65,7 (30)	E2		128 (3)	35,3 (7)	176 (4)
$\gamma_{17,14}(\text{Pa})$	62,59 (10)	0,4 (3)	[M1+E2]		47 (35)	13 (10)	65 (48)
$\gamma_{3,1}(\text{Pa})$	63,9 (1)	1,10 (5)	(E2)		74,7 (15)	20,6 (4)	102 (2)
$\gamma_{3,0}(\text{Pa})$	70,49 (10)	0,4 (3)	[M1+E2]		28 (18)	7,5 (54)	38 (26)
$\gamma_{10,5}(\text{Pa})$	74,54 (10)	0,13 (3)	[M1]		7,42 (15)	1,79 (4)	9,83 (20)
$\gamma_{4,0}(\text{Pa})$	86,477 (10)	29,7 (10)	E1		1,13 (5)	0,22 (6)	1,43 (8)
$\gamma_{5,1}(\text{Pa})$	87,99 (3)	0,17 (1)	[E1]		0,128 (3)	0,0312 (6)	0,169 (4)
$\gamma_{5,0}(\text{Pa})$	94,64 (5)	0,0670 (15)	E1		0,106 (2)	0,0257 (5)	0,140 (3)
$\gamma_{9,2}(\text{Pa})$	106,15 (25)	0,50 (1)	[E2]		6,78 (14)	1,87 (4)	9,28 (19)
$\gamma_{13,6}(\text{Pa})$	108,7	0,32 (4)	M1+E2		2,6 (4)	0,6 (1)	3,5 (5)
$\gamma_{11,3}(\text{Pa})$	109,1 (1)						
$\gamma_{12,4}(\text{Pa})$	115,40 (35)	0,0026 (8)	[M1+E2]				
$\gamma_{13,5}(\text{Pa})$	117,702 (20)	2,24 (11)	M1+E2	9,3 (5)	2,16 (11)	0,53 (4)	12,2 (6)
$\gamma_{12,3}(\text{Pa})$	131,101 (25)	0,105 (6)	E1	0,202 (4)	0,0451 (9)	0,0109 (2)	0,262 (5)
$\gamma_{14,6}(\text{Pa})$	134,285 (20)	0,62 (9)	[M1+E2]	6,1 (10)	1,5 (3)	0,37 (8)	8,0 (11)
$\gamma_{18,9}(\text{Pa})$	139,9 (1)	0,006 (5)	[E1]	0,174 (3)	0,0381 (8)	0,00925 (19)	0,225 (5)
$\gamma_{13,3}(\text{Pa})$	141,74 (10)						
$\gamma_{14,5}(\text{Pa})$	143,249 (20)	3,3 (3)	M1+E2	5,38 (12)	1,17 (3)	0,287 (6)	6,94 (14)
$\gamma_{14,4}(\text{Pa})$	151,414 (20)	1,37 (10)	M1+E2	3,4 (5)	1,08 (5)	0,277 (14)	4,9 (6)
$\gamma_{15,6}(\text{Pa})$	153,37		E1+M2				
$\gamma_{20,13}(\text{Pa})$	153,37 (10)	0,021 (6)	[E2]	0,226 (5)	1,267 (3)	0,349 (7)	1,96 (4)
$\gamma_{13,2}(\text{Pa})$	155,239 (20)	0,10 (1)	E1	0,137 (3)	0,0292 (6)	0,00708 (14)	0,176 (4)
$\gamma_{15,5}(\text{Pa})$	162,41						
$\gamma_{10,1}(\text{Pa})$	162,41 (8)	0,038 (1)	[E1]	0,123 (3)	0,0260 (5)	0,00631 (13)	0,158 (3)
$\gamma_{10,0}(\text{Pa})$	169,156 (20)	0,0768 (4)	[E1]	0,112 (2)	0,0235 (5)	0,00568 (11)	0,143 (3)
$\gamma_{15,4}(\text{Pa})$	170,59						

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{16,7}(\text{Pa})$	170,59 (6)	0,09 (2)	[M1+E2]	3,1 (4)	0,70 (7)	0,17 (1)	4,0 (5)
$\gamma_{16,6}(\text{Pa})$	176,12 (6)	0,07 (2)	[M1+E2]	2,8 (4)	0,63 (7)	0,16 (1)	3,7 (5)
$\gamma_{14,2}(\text{Pa})$	180,794 (19)	0,018 (1)	[E1]	0,0960 (19)	0,0199 (4)	0,0048 (1)	0,122 (3)
$\gamma_{15,3}(\text{Pa})$	186,86						
$\gamma_{20,11}(\text{Pa})$	186,86 (35)	0,003 (3)	[E1]	0,0889 (19)	0,0183 (4)	0,00442 (9)	0,113 (2)
$\gamma_{17,7}(\text{Pa})$	191,46 (5)	0,074 (9)	[M1+E2]	2,2 (3)	0,49 (5)	0,12 (1)	2,9 (4)
$\gamma_{16,4}(\text{Pa})$	193,26 (5)	0,17 (2)	[M1+E2]	2,2 (3)	0,48 (5)	0,12 (1)	2,8 (4)
$\gamma_{18,7}(\text{Pa})$	194,67 (20)						
$\gamma_{12,1}(\text{Pa})$	194,95 (3)	0,192 (22)	E1	0,0806 (16)	0,0164 (4)	0,00397 (8)	0,102 (2)
$\gamma_{17,6}(\text{Pa})$	196,86 (5)	0,078 (7)	[M1+E2]	2,1 (3)	0,45 (5)	0,11 (1)	2,7 (3)
$\gamma_{18,6}(\text{Pa})$	199,95 (6)	0,020 (3)	[M1]	2,27 (5)	0,436 (9)	0,105 (2)	2,85 (6)
$\gamma_{15,2}(\text{Pa})$	199,95						
$\gamma_{12,0}(\text{Pa})$	201,62 (5)	0,043 (1)	E1	0,0746 (15)	0,0151 (3)	0,00365 (7)	0,0946 (19)
$\gamma_{20,9}(\text{Pa})$	202,9 (2)	0,005 (2)	[E1]	0,0735 (15)	0,0149 (3)	0,00360 (7)	0,0932 (19)
$\gamma_{16,3}(\text{Pa})$	209,19 (5)	0,016 (2)	[E1]	0,0686 (14)	0,0138 (3)	0,00333 (7)	0,0868 (17)
$\gamma_{13,0}(\text{Pa})$	212,29 (5)	0,182 (11)	E1	0,00214 (4)	0,0133 (3)	0,00321 (7)	0,0839 (17)
$\gamma_{17,4}(\text{Pa})$	214,01 (5)	0,114 (13)	[M1+E2]	1,6 (2)	0,35 (1)	0,09 (1)	2,1 (3)
$\gamma_{19,4}(\text{Pa})$	219,8						
$\gamma_{16,2}(\text{Pa})$	222,6 (2)	0,002 (2)					
$\gamma_{17,3}(\text{Pa})$	229,94 (5)	0,015 (3)	[E1]	0,0552 (11)	0,0110 (2)	0,00264 (5)	0,0697 (14)
$\gamma_{14,0}(\text{Pa})$	237,86 (2)	0,0610 (6)	[E1]	0,0511 (10)	0,0101 (2)	0,00243 (5)	0,0645 (13)
$\gamma_{19,2}(\text{Pa})$	248,95 (10)	0,012 (3)	[M1+E2]	1,1 (2)	0,22 (1)	0,055 (6)	1,4 (2)
$\gamma_{15,1}(\text{Pa})$	250,58						
$\gamma_{15,0}(\text{Pa})$	257,09						
$\gamma_{20,7}(\text{Pa})$	257,09 (20)	0,048 (24)	[M1]	1,12 (2)	0,215 (5)	0,0518 (11)	1,41 (3)
$\gamma_{20,6}(\text{Pa})$	262,44 (20)	0,01118 (49)	[M1]	1,06 (2)	0,203 (4)	0,0489 (10)	1,33 (3)
$\gamma_{20,4}(\text{Pa})$	279,65 (20)	0,01320 (49)	[E2]	0,0847 (17)	0,100 (2)	0,0272 (6)	0,222 (5)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Pa})$	288,3						

3 Atomic Data

3.1 Pa

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,970 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,488 \quad (18) \\ n_{KL} &: 0,795 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	92,288	62,14
K α_1	95,869	100
K β_3	107,595	}
K β_1	108,422	}
K β_5''	109,072	} 35,84
K β_2	111,405	}
K β_4	111,87	} 12,15
KO _{2,3}	112,38	}
X _L		
L ℓ	11,368	
L α	13,121 – 13,289	
L η	14,949	
L β	15,358 – 17,666	
L γ	18,94 – 20,113	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	70,081 – 78,822	100
KLX	85,989 – 95,858	59,2
KXY	101,87 – 112,59	8,76
Auger L	5,9 – 21,6	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,20}$	4515,1 (19)	0,038 (4)
$\alpha_{0,19}$	4550,5 (22)	0,011 (3)
$\alpha_{0,18}$	4573 (3)	0,048 (23)
$\alpha_{0,17}$	4578,6 (14)	0,393 (23)
$\alpha_{0,16}$	4599,1 (18)	0,373 (9)
$\alpha_{0,15}$	4619,7 (21)	0,032 (8)
$\alpha_{0,14}$	4640 (1)	6,43 (3)
$\alpha_{0,13}$	4665,0 (9)	3,46 (3)
$\alpha_{0,12}$	4676,4	0,38 (2)
$\alpha_{0,11}$	4698,2 (8)	0,535 (10)
$\alpha_{0,10}$	4708,3 (20)}	
$\alpha_{0,9}$	4712,3 (20)}	1,174 (13)
$\alpha_{0,8}$	4741,3 (20)	0,019
$\alpha_{0,7}$	4766,5 (8)	9,5 (3)
$\alpha_{0,6}$	4771,4 (8)	23,0 (3)
$\alpha_{0,4}$	4788,0 (9)	47,64 (6)
$\alpha_{0,3}$	4803,5 (10)	2,02 (2)
$\alpha_{0,2}$	4816,8 (10)	2,430 (17)
$\alpha_{0,1}$	4866,4 (14)	0,51 (3)
$\alpha_{0,0}$	4872,7 (14)	2,41 (3)

5 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pa) 5,9 - 21,6	62 (6)
e _{AK}	(Pa) KLL 70,081 - 78,822 } 0,182 (24)	
	KLX 85,989 - 95,858 }	
	KXY 101,87 - 112,59 }	
ec _{13,5 T}	(Pa) 5,106 - 117,695	2,10 (11)
ec _{13,5 K}	(Pa) 5,11 (2)	1,6 (1)
ec _{4,2 L}	(Pa) 8,269 - 12,641	32,4 (13)
ec _{14,5 T}	(Pa) 10,8 - 123,4	2,91 (28)
ec _{14,5 K}	(Pa) 11 (3)	2,24 (22)
ec _{14,6 K}	(Pa) 21,69 (2)	0,42 (8)
ec _{4,2 M}	(Pa) 24,013 - 25,932	8,26 (34)
ec _{6,2 L}	(Pa) 25,42 - 29,80	0,074 (4)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{2,0} L	(Pa)	35,999 - 40,371	47,7 (23)
ec _{14,4} K	(Pa)	38,82 (2)	0,80 (12)
ec _{17,14} L	(Pa)	41,48 - 45,86	0,3 (2)
ec _{3,1} L	(Pa)	42,8 - 47,2	0,81 (3)
ec _{3,0} L	(Pa)	49,38 - 53,76	0,3 (2)
ec _{2,0} M	(Pa)	51,743 - 53,662	13,0 (6)
ec _{17,14} M	(Pa)	57,23 - 59,15	0,08 (6)
ec _{16,7} K	(Pa)	57,99 (6)	0,056 (14)
ec _{3,1} M	(Pa)	58,5 - 60,5	0,220 (9)
ec _{3,0} M	(Pa)	65,13 - 67,05	0,08 (6)
ec _{4,0} L	(Pa)	65,37 - 69,74	13,8 (6)
ec _{16,4} K	(Pa)	80,66 (5)	0,097 (13)
ec _{4,0} M	(Pa)	81,12 - 83,04	2,7 (7)
ec _{9,2} L	(Pa)	85,04 - 89,42	0,332 (10)
ec _{13,6} L	(Pa)	87,6 - 92,0	0,185 (29)
ec _{13,5} L	(Pa)	96,60 - 100,97	0,37 (2)
ec _{9,2} M	(Pa)	100,79 - 102,71	0,0916 (27)
ec _{17,4} K	(Pa)	101,41 (5)	0,059 (8)
ec _{14,5} L	(Pa)	102,3 - 106,7	0,49 (5)
ec _{13,5} M	(Pa)	112,34 - 114,26	0,091 (7)
ec _{14,6} L	(Pa)	113,180 - 117,552	0,104 (22)
ec _{14,5} M	(Pa)	118 - 120	0,120 (12)
ec _{14,4} L	(Pa)	130,309 - 134,681	0,252 (12)
ec _{19,2} K	(Pa)	136,4 (1)	0,055 (15)
ec _{14,4} M	(Pa)	146,053 - 147,972	0,065 (3)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Pa)	11,368 — 20,113	59,4 (50)
XK α_2	(Pa)	92,288	1,81 (3) } K α
XK α_1	(Pa)	95,869	2,90 (2) }
XK β_3	(Pa)	107,595	}
XK β_1	(Pa)	108,422	} 0,97 (11) K' β_1
XK β_5''	(Pa)	109,072	}
XK β_2	(Pa)	111,405	}
XK β_4	(Pa)	111,87	} 0,37 (1) K' β_2
XKO _{2,3}	(Pa)	112,38	}

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{7,6}(\text{Pa})$	5,18	0,220 (5)
$\gamma_{5,4}(\text{Pa})$	8,22 (5)	0,12 (5)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Pa})$	21,5	0,352 (13)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Pa})$	27,7	0,84 (7)
$\gamma_{4,2}(\text{Pa})$	29,374 (20)	14,1 (5)
$\gamma_{12,10}(\text{Pa})$	32,46	0,005 (1)
$\gamma_{14,12}(\text{Pa})$	36,32 (2)	0,005 (1)
$\gamma_{6,2}(\text{Pa})$	46,53 (6)	0,107 (6)
$\gamma_{2,0}(\text{Pa})$	57,104 (20)	0,372 (16)
$\gamma_{17,14}(\text{Pa})$	62,59 (10)	0,006 (2)
$\gamma_{3,1}(\text{Pa})$	63,9 (1)	0,0107 (4)
$\gamma_{3,0}(\text{Pa})$	70,49 (10)	0,0107 (4)
$\gamma_{10,5}(\text{Pa})$	74,54 (10)	0,012 (3)
$\gamma_{4,0}(\text{Pa})$	86,477 (10)	12,22 (12)
$\gamma_{5,1}(\text{Pa})$	87,99 (3)	0,142 (3)
$\gamma_{5,0}(\text{Pa})$	94,64 (5)	0,0585 (13)
$\gamma_{9,2}(\text{Pa})$	106,15 (25)	0,049 (1)
$\gamma_{13,6}(\text{Pa})$	108,7	0,071 (3)
$\gamma_{12,4}(\text{Pa})$	115,40 (35)	0,0026 (8)
$\gamma_{13,5}(\text{Pa})$	117,702 (20)	0,170 (4)
$\gamma_{12,3}(\text{Pa})$	131,101 (25)	0,084 (5)
$\gamma_{14,6}(\text{Pa})$	134,285 (20)	0,069 (5)
$\gamma_{18,9}(\text{Pa})$	139,9 (1)	0,0046 (4)
$\gamma_{14,5}(\text{Pa})$	143,249 (20)	0,42 (4)
$\gamma_{14,4}(\text{Pa})$	151,414 (20)	0,234 (2)
$\gamma_{20,13}(\text{Pa})$	153,37 (10)	0,007 (2)
$\gamma_{13,2}(\text{Pa})$	155,239 (20)	0,088 (8)
$\gamma_{15,5}(\text{Pa})$	162,41	0,0324 (12)
$\gamma_{10,1}(\text{Pa})$	162,41 (8)	0,033 (1)
$\gamma_{10,0}(\text{Pa})$	169,156 (20)	0,0672 (3)
$\gamma_{16,7}(\text{Pa})$	170,59 (6)	0,020 (4)
$\gamma_{16,6}(\text{Pa})$	176,12 (6)	0,015 (3)
$\gamma_{14,2}(\text{Pa})$	180,81 (10)	0,016 (1)
$\gamma_{20,11}(\text{Pa})$	186,86 (35)	0,003 (3)
$\gamma_{17,7}(\text{Pa})$	191,46 (5)	0,019 (1)
$\gamma_{16,4}(\text{Pa})$	193,26 (5)	0,044 (1)
$\gamma_{18,7}(\text{Pa})$	194,67 (20)	0,033 (1)
$\gamma_{12,1}(\text{Pa})$	194,95 (3)	0,174 (20)
$\gamma_{17,6}(\text{Pa})$	196,86 (5)	0,0210 (1)
$\gamma_{18,6}(\text{Pa})$	199,95 (6)	0,0053 (8)
$\gamma_{12,0}(\text{Pa})$	201,62 (5)	0,0392 (9)
$\gamma_{20,9}(\text{Pa})$	202,9 (2)	0,0048 (19)
$\gamma_{16,3}(\text{Pa})$	209,19 (5)	0,0150 (15)
$\gamma_{13,0}(\text{Pa})$	212,29 (5)	0,17 (1)
$\gamma_{17,4}(\text{Pa})$	214,01 (5)	0,037 (2)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{16,2}(\text{Pa})$	222,6 (2)	0,002 (2)
$\gamma_{17,3}(\text{Pa})$	229,94 (5)	0,014 (3)
$\gamma_{14,0}(\text{Pa})$	237,86 (2)	0,0573 (6)
$\gamma_{19,2}(\text{Pa})$	248,95 (10)	0,005 (1)
$\gamma_{20,7}(\text{Pa})$	257,09 (20)	0,02 (1)
$\gamma_{20,6}(\text{Pa})$	262,44 (20)	0,0048 (2)
$\gamma_{20,4}(\text{Pa})$	279,65 (20)	0,0108 (4)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Pa})$	288,3	0,0162 (5)

7 Main Production Modes


$\text{U} - 238(n,2n)\text{U} - 237$


$\text{U} - 237(\beta^-)\text{Np} - 237$


8 References


- L. MAGNUSSON, T. LACHAPELLE. LaChapelle, NNES 14B (1949) 39
(Half-life)
- F.P. BRAUER, R.W. STROMATT, J.D. LUDWICK, F.P. ROBERTS AND W.L. LYON. J. Inorg. Nucl. Chem. 12, (1960) 234
(Half-life)
- F. ASARO, F.S. STEPHENS, J.M. HOLLANDER, I. PERLMAN. Phys.Rev. 117 (1960) 492
(Gamma-ray energies and emission probabilities, ICC for the 86.5 keV gamma-ray)
- V.A. DRUIN, V.P. PERELYGIN, G.I. KHLBNIKOV. Soviet Phys. JETP 13 (1961) 913
(Spontaneous fission half-life)
- S.A. BARANOV, V.M. KULAKOV, P.S. SAMOILOV, A.G. ZELENKOV, Y.F. RODIONOV. Sov. Phys. - JETP 14 (1962) 1232
(alpha-transition probabilities)
- E. BROWNE, F. ASARO. Report UCRL-17989 (1968) 1
(alpha-transition energies and probabilities, gamma-ray emission probabilities)
- W. HOEKSTRA. Thesis, Technische Hogeschool, Delft (1969)
(Gamma-ray energies)
- E. BROWNE, F. ASARO. Priv. Comm. , October 1969. (1969)
(alpha-transition energies and probabilities, ICC for the 86.5 keV gamma-ray)
- J.E. CLINE. IN-1448 Rev. (1971)
(Gamma-ray energies)
- R.L. HEATH. ANCR-1000-2 (1974)
(Gamma-ray energies)
- M. SKALSEY, R.D. CONNOR. Can. J. Phys. 54 (1976) 1409
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- L. GONZALEZ, R. GAETA, E. VANO AND J.M. LOS ARCOS. Nucl. Phys. A324 (1979) 126
(Gamma-ray energies and probabilities)
- M.F. BANHAM, A.J. FUDGE. J. Radioanal. Chem. 64 (1981) 167
(Gamma-ray probabilities)
- M.F. BANHAM. AERE, Harwell, Priv. Comm (1984)
(Gamma-ray probabilities)
- R. VANINBROUKX, G. BORTELS AND B. DENECKE. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 35 (1984) 905
(X- and gamma- ray emission probabilities)
- . Decay Data of the Transactinium Nuclides, Techn. Report Ser. No. 261, IAEA, Vienna (1986)
(Gamma-ray probabilities)

- S.A. WOODS, P. CHRISTMAS, P. CROSS, S.M. JUDGE AND W.GELLETLY. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A264, 333 (1988); Addendum Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A272, (1988) 924
(Gamma ray energies and emission probabilities, ICC for the 86.5 keV gamma-ray)
- D.B. ION, R. ION-MIHAI AND M. IVASCU. Rev. Roum. Phys. 33 (1988) 1075
(Spontaneous fission half-life)
- G. BORTELS, D. MOUCHEL, R. EYKENS, E. GARCIA-TORANO, M.L. ACENA, R.A.P. WILTSIRE, M. KING, A.J. FUDGE AND P. BURGER. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A295 (1990) 199
(alpha-transition probabilities)
- I.M. LOWLES, T.D. MAC MAHON, M.F. BANHAM, A.J. FUDGE AND R.A.P. WILTSIRE. Nucl. Instrum. Methods, Phys. Res. A286 (1990) 556
(Gamma-ray energies and probabilities)
- A.F. GRASHIN, A.D. EFIMENKO. Bull. Rus. Acad. Sci. Phys. 56 (1992) 66
(Spontaneous fission half-life)
- I.M. LOWLES, T.D. MAC MAHON, R.A.P. WILTSIRE, D. CROSSLEY AND A.J. FUDGE. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 339
(Half-life)
- G. SIBBENS, B. DENECKE. Appl. Radiat. Isot. 52 (2000) 467
(alpha-transition probabilities, gamma-ray energies)
- S.A. WOODS, D.H. WOODS, P. DE LAVISON, S.M. JEROME, J.L. MAKEPEACE, M.J. WOODS, L.J. HUSBAND AND S. LINEHAM. Appl.Radiat.Isot. 52 (2000) 475
(Gamma-ray emission probabilities)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (2000) 527
(EMISSION computer code)
- U. SCHOTZIG, E. SCHONFELD AND H. JANSSEN. Appl. Radiat. Isot. 52 (2000) 883
(X- and gamma- ray emission probabilities)
- M.M. BÉ, R. HELMER, V. CHISTÉ. J. Nucl. Sci. Tech. suppl.2, (2002) 481
(Saisinuc software)
- A. LUCA, S. SEPMAN, K. IAKOVLEV, G. SHCHUKIN, M. ETCHEVERRY AND J. MOREL. Appl. Radiat. Isot. 56 (2002) 173
(KX - ray and gamma-ray emission probabilities)
- M.J. WOODS, D.H. WOODS, S.A. WOODS, L.J. HUSBAND, S.M. JEROME ET AL.. Appl. Radiat. Isot. 56 (2002) 415
(alpha-transition energies and probabilities and X-, gamma- ray emission probabilities)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, P.O. TIKKANEN AND S. RAMAN. Atom. Data and Nucl. Data Tables 91 (2002) 1
(Theoretical internal conversion coefficients)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA AND C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q value)
- G. SHCHUKIN, K. IAKOVLEV AND J.MOREL. Appl. Radiat. Isot. 60 (2004) 239
(X- and gamma- ray emission probabilities)
- B. SINGH, K. TULI. Nucl. Data Sheets 105 (2005) 109
(Decay scheme, gamma-ray multipolarities, admixture coefficients)
- V.P. CHECHEV, N.K. KUZMENKO. Appl. Radiat. Isot. 64 (2006) 1403
(Gamma-ray emission probabilities in the 233Pa decay)









1 Decay Scheme

Np-238 decays 100% by beta transitions to levels of Pu-238

Le neptunium 238 se désintègre par transitions bêta vers des niveaux excités du plutonium 238.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{238}\text{Np})$:	2,102	(5)	d
$T_{1/2}(^{238}\text{Pu})$:	87,74	(3)	a
$Q^-(^{238}\text{Np})$:	1291,5	(4)	keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	lg ft
$\beta_{0,15}^-$	89,0 (4)	0,51 (6)	1st forbidden	6,57
$\beta_{0,13}^-$	221,6 (4)	11,50 (7)	Allowed	6,44
$\beta_{0,12}^-$	263,0 (4)	44,75 (19)	Allowed	6,09
$\beta_{0,11}^-$	306,0 (4)	0,49 (1)	1st forbidden	8,25
$\beta_{0,10}^-$	308,4 (4)	0,27 (3)	Allowed	8,51
$\beta_{0,9}^-$	323,3 (6)	0,082 (6)	1st forbidden	9,11
$\beta_{0,8}^-$	328,7 (4)	1,25 (1)	1st forbidden	7,95
$\beta_{0,5}^-$	630,1 (4)	0,036 (3)	1st forbidden	10,44
$\beta_{0,4}^-$	686,4 (4)	0,103 (3)	1st forbidden	10,08
$\beta_{0,1}^-$	1247,4 (4)	41,0 (25)	Allowed	8,38

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Pu})$	44,07 (2)	80,7 (23)	E2		572 (12)	160 (3)	788 (16)
$\gamma_{2,1}(\text{Pu})$	101,88 (2)	3,90 (14)	E2		10,5 (2)	2,94 (6)	14,5 (3)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Pu})$	103,74 (2)	0,312 (3)					
$\gamma_{14,9}(\text{Pu})$	114,4 (4)	0,055 (10)	[E2]		6,15 (12)	1,72 (14)	8,47 (17)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Pu})$	116,27 (8)	0,04					
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Pu})$	117,27 (8)	0,074					
$\gamma_{15,14}(\text{Pu})$	120,11 (5)	0,48 (6)	M1(+E2)		2,8 (6)	0,69 (6)	3,8 (6)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Pu})$	120,5	0,02					
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Pu})$	127,70 (8)	0,010 (1)					
$\gamma_{15,13}(\text{Pu})$	132,5 (1)	0,0018 (10)	[E1]	0,203 (4)	0,048 (1)	0,0118 (2)	0,267 (5)
$\gamma_{3,2}(\text{Pu})$	157,42 (5)	0,003	[E2]	0,193 (4)	1,45 (3)	0,405 (8)	2,19 (4)
$\gamma_{15,12}(\text{Pu})$	174,08 (5)	0,0261 (9)	[E1]	0,110 (2)	0,0241 (5)	0,0059 (1)	0,142 (3)
$\gamma_{(-1,6)}(\text{Pu})$	220,87 (11)	0,037 (9)	(M2)	6,7 (15)	4 (1)		11,4 (20)
$\gamma_{8,5}(\text{Pu})$	301,37 (7)	0,0128 (12)	E2	0,0766 (16)	0,096 (2)	0,0264 (5)	0,208 (4)
$\gamma_{14,6}(\text{Pu})$	319,29 (11)	0,013 (3)	M1+E2	0,43 (22)	0,118 (25)	0,030 (5)	0,59 (25)
$\gamma_{10,5}(\text{Pu})$	321,75 (20)	0,0013					
$\gamma_{11,5}(\text{Pu})$	324,02 (9)	0,0184 (14)	M1+E2	0,15 (6)	0,082 (7)	0,022 (2)	0,26 (7)
$\gamma_{7,4}(\text{Pu})$	336,36 (15)	0,00020 (13)	[E1]	0,0257 (5)	0,00503 (10)	0,00122 (3)	0,0324 (7)
$\gamma_{8,4}(\text{Pu})$	357,64 (7)	0,0612 (17)	M1 + E2	0,133 (12)	0,060 (5)	0,0158 (12)	0,214 (16)
$\gamma_{10,4}(\text{Pu})$	378,05 (13)	0,003					
$\gamma_{11,4}(\text{Pu})$	380,31 (10)	0,0180 (8)	[M1]	0,493 (10)	0,098 (2)	0,0237 (5)	0,623 (9)
$\gamma_{14,5}(\text{Pu})$	421,1 (1)	0,0309 (15)	[M1]	0,374 (8)	0,0737 (15)	0,0179 (4)	0,472 (7)
$\gamma_{6,3}(\text{Pu})$	459,8 (2)	0,0023					
$\gamma_{5,2}(\text{Pu})$	515,51 (7)	0,0386 (11)	E1+M2	0,017 (3)	0,0037 (7)	0,00092 (17)	0,022 (4)
$\gamma_{4,1}(\text{Pu})$	561,14 (5)	0,1072 (15)	E1	0,00929 (19)	0,00169 (4)	0,000407 (8)	0,0115 (2)
$\gamma_{4,0}(\text{Pu})$	605,16 (5)	0,078 (2)	E1	0,00806 (16)	0,00146 (3)	0,000350 (7)	0,0100 (2)
$\gamma_{5,1}(\text{Pu})$	617,39 (5)	0,0604 (7)	E1+M2	0,0095 (11)	0,00185 (22)	0,00045 (5)	0,0120 (14)
$\gamma_{6,2}(\text{Pu})$	617,4	0,008 (0)					
$\gamma_{10,2}(\text{Pu})$	836,96 (7)	0,0210 (8)	[E2]	0,0125 (3)	0,00366 (8)	0,00093 (2)	0,0174 (4)
$\gamma_{12,2}(\text{Pu})$	882,63 (3)	0,816 (9)	(E2)	0,0114 (2)	0,00320 (7)	0,00081 (2)	0,0157 (3)
$\gamma_{(-1,7)}(\text{Pu})$	885	0,040 (5)					
$\gamma_{7,1}(\text{Pu})$	897,34 (10)	0,0074 (10)	(E2)	0,0111 (2)	0,00308 (6)	0,00078 (2)	0,0152 (3)
$\gamma_{8,1}(\text{Pu})$	918,70 (4)	0,531 (6)	E1	0,00383 (8)	0,00066 (1)	0,000158 (3)	0,0047 (1)
$\gamma_{13,2}(\text{Pu})$	923,99 (2)	2,64 (2)	(M1+E2)	0,0099 (4)			0,014 (1)
$\gamma_{9,1}(\text{Pu})$	924	0,065					
$\gamma_{14,2}(\text{Pu})$	936,60 (5)	0,369 (5)	[E1+M2]	0,0089 (17)	0,0018 (4)	0,00044 (10)	0,0112 (22)
$\gamma_{10,1}(\text{Pu})$	938,94 (10)	0,18 (2)	E0+E2	3,5 (4)	0,67 (7)		4,4 (4)
$\gamma_{11,1}(\text{Pu})$	941,40 (4)	0,504	[E1+M2]				
$\gamma_{7,0}(\text{Pu})$	941,5 (3)	0,0106	E0				
$\gamma_{8,0}(\text{Pu})$	962,76 (2)	0,648 (8)	E1	0,00352 (7)	0,00061 (1)	0,000145 (3)	0,00433 (9)
$\gamma_{9,0}(\text{Pu})$	968,9 (4)	0,017 (6)	[M2]	0,089 (2)	0,0200 (4)	0,0050 (1)	0,116 (3)
$\gamma_{10,0}(\text{Pu})$	983,0 (3)	0,07 (2)	[E2]	0,00947 (19)	0,00247 (5)	0,00062 (1)	0,0128 (3)
$\gamma_{12,1}(\text{Pu})$	984,45 (2)	25,50 (13)	M1+E2	0,0096 (3)	0,0022 (1)	0,0006 (1)	0,0125 (5)
$\gamma_{13,1}(\text{Pu})$	1025,87 (2)	8,86 (7)	M1+E2	0,0091 (4)	0,0021 (1)	0,0006 (1)	0,0120 (5)
$\gamma_{12,0}(\text{Pu})$	1028,54 (2)	18,46 (13)	E2	0,00875 (18)	0,00222 (5)	0,00055 (1)	0,0117 (2)

3 Atomic Data

3.1 Pu

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,971 (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,521 (21) \\ n_{KL} &: 0,790 (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	99,525	63,17
K α_1	103,734	100
K β_3	116,244	}
K β_1	117,228	}
K β_5''	117,918	}
K β_2	120,54	}
K β_4	120,969	}
KO _{2,3}	121,543	}
X _L		
L ℓ	12,125	
L α	14,083 – 14,279	
L η	16,334	
L β	16,499 – 19,331	
L γ	20,708 – 21,984	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	75,26 – 85,36	100
KLX	92,607 – 103,729	60,6
KXY	109,93 – 121,78	9,18
Auger L	6,10 – 22,99	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pu)	6,10 - 22,99	29,7 (14)
e _{AK}	(Pu)		0,021 (8)
	KLL	75,26 - 85,36	}
	KLX	92,607 - 103,729	}
	KXY	109,93 - 121,78	}
ec _{15,13} K	(Pu)	10,7 (1)	0,00028 (16)
ec _{1,0} L	(Pu)	20,97 - 26,01	58,6 (17)
ec _{3,2} K	(Pu)	35,63 (5)	0,00019 (4)
ec _{1,0} M	(Pu)	38,14 - 40,30	16,4 (5)
ec _{15,12} K	(Pu)	52,29 (5)	0,00251 (10)
ec _{2,1} L	(Pu)	78,78 - 83,82	2,65 (10)
ec _{14,9} L	(Pu)	91,3 - 96,3	0,036 (6)
ec _{2,1} M	(Pu)	95,95 - 98,10	0,74 (3)
ec _{15,14} L	(Pu)	97,01 - 102,05	0,28 (6)
ec _{14,9} M	(Pu)	108,5 - 110,6	0,0100 (19)
ec _{15,14} M	(Pu)	114,18 - 116,34	0,070 (7)
ec _{3,2} L	(Pu)	134,32 - 139,36	0,0014 (3)
ec _{15,12} L	(Pu)	150,98 - 156,02	0,000552 (21)
ec _{3,2} M	(Pu)	151,49 - 153,64	0,00040 (8)
ec _{15,12} M	(Pu)	168,15 - 170,30	0,000135 (5)
ec _{8,5} K	(Pu)	179,58 (7)	0,00081 (8)
ec _{14,6} K	(Pu)	197,50 (11)	0,0036 (19)
ec _{11,5} K	(Pu)	202,23 (9)	0,0021 (9)
ec _{8,4} K	(Pu)	235,83 (7)	0,0067 (6)
ec _{11,4} K	(Pu)	258,5 (1)	0,0055 (3)
ec _{8,5} L	(Pu)	278,27 - 283,31	0,00102 (10)
ec _{8,5} M	(Pu)	295,44 - 297,60	0,00028 (3)
ec _{14,6} L	(Pu)	296,19 - 301,23	0,00098 (23)
ec _{14,5} K	(Pu)	299,3 (1)	0,0078 (4)
ec _{11,5} L	(Pu)	300,92 - 305,96	0,00120 (12)
ec _{14,6} M	(Pu)	313,36 - 315,52	0,000249 (5)
ec _{11,5} M	(Pu)	318,09 - 320,24	0,00032 (3)
ec _{8,4} L	(Pu)	334,52 - 339,56	0,0030 (3)
ec _{8,4} M	(Pu)	351,69 - 353,84	0,00080 (6)
ec _{11,4} L	(Pu)	357,21 - 362,25	0,00108 (5)
ec _{11,4} M	(Pu)	374,38 - 376,54	0,000263 (13)
ec _{5,2} K	(Pu)	393,72 (7)	0,00064 (11)
ec _{14,5} L	(Pu)	398 - 403	0,00155 (8)
ec _{14,5} M	(Pu)	415,2 - 417,3	0,000376 (20)
ec _{4,1} K	(Pu)	439,35 (5)	0,00098 (3)
ec _{4,0} K	(Pu)	483,37 (5)	0,00062 (2)
ec _{5,2} L	(Pu)	492,41 - 497,45	0,00014 (3)
ec _{5,1} K	(Pu)	495,60 (5)	0,00056 (7)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{4,1} L	(Pu)	538,04 - 543,08	0,000179 (5)
ec _{4,0} L	(Pu)	582,06 - 587,10	0,000112 (4)
ec _{5,1} L	(Pu)	594,29 - 599,33	0,000110 (13)
ec _{10,2} K	(Pu)	715,17 (7)	0,00026 (1)
ec _{12,2} K	(Pu)	760,84 (3)	0,0092 (2)
ec _{8,1} K	(Pu)	796,91 (4)	0,00202 (5)
ec _{13,2} K	(Pu)	802,20 (2)	0,0258 (11)
ec _{14,2} K	(Pu)	814,81 (5)	0,0032 (6)
ec _{10,1} K	(Pu)	817,1 (1)	0,114 (16)
ec _{7,0} K	(Pu)	829,7 (3)	0,0085 (7)
ec _{8,0} K	(Pu)	840,97 (2)	0,0023 (4)
ec _{9,0} K	(Pu)	847,1 (4)	0,0013 (7)
ec _{12,2} L	(Pu)	859,53 - 864,57	0,00257 (6)
ec _{10,0} K	(Pu)	861,20 (3)	0,0006 (2)
ec _{12,1} K	(Pu)	862,66 (2)	0,242 (8)
ec _{12,2} M	(Pu)	876,70 - 878,86	0,00065 (2)
ec _{8,1} L	(Pu)	895,6 - 900,6	0,00035 (7)
ec _{13,1} K	(Pu)	904,08 (2)	0,080 (4)
ec _{12,0} K	(Pu)	906,75 (2)	0,160 (3)
ec _{14,2} L	(Pu)	913,5 - 918,5	0,00066 (15)
ec _{10,1} L	(Pu)	915,84 - 920,88	0,022 (3)
ec _{7,0} L	(Pu)	918,4 - 923,4	0,00166 (14)
ec _{14,2} M	(Pu)	930,7 - 932,8	0,00016 (4)
ec _{8,0} L	(Pu)	939,66 - 944,70	0,000393 (8)
ec _{9,0} L	(Pu)	945,8 - 950,8	0,0003 (1)
ec _{10,0} L	(Pu)	959,9 - 964,9	0,00017 (5)
ec _{12,1} L	(Pu)	961,35 - 966,39	0,055 (3)
ec _{12,1} M	(Pu)	978,52 - 980,68	0,015 (3)
ec _{13,1} L	(Pu)	1002,77 - 1007,81	0,0184 (9)
ec _{12,0} L	(Pu)	1005,44 - 1010,48	0,0405 (10)
ec _{13,1} M	(Pu)	1019,94 - 1022,09	0,0053 (9)
ec _{12,0} M	(Pu)	1022,61 - 1024,76	0,0101 (2)
$\beta_{0,15}^-$	max:	89,0 (4)	0,51 (6)
$\beta_{0,15}^-$	avg:	23,0 (2)	
$\beta_{0,13}^-$	max:	221,6 (4)	11,50 (7)
$\beta_{0,13}^-$	avg:	59,9 (2)	
$\beta_{0,12}^-$	max:	263,0 (4)	44,75 (19)
$\beta_{0,12}^-$	avg:	72,0 (2)	
$\beta_{0,11}^-$	max:	306,0 (4)	0,49 (1)
$\beta_{0,11}^-$	avg:	84,9 (2)	
$\beta_{0,10}^-$	max:	308,4 (4)	0,27 (3)
$\beta_{0,10}^-$	avg:	85,6 (2)	
$\beta_{0,9}^-$	max:	323,3 (6)	0,082 (6)
$\beta_{0,9}^-$	avg:	90,1 (2)	
$\beta_{0,8}^-$	max:	328,7 (4)	1,25 (1)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,8}^-$	avg:	91,8	(2)
$\beta_{0,5}^-$	max:	630,1	(4) 0,036 (3)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	189,2	(2)
$\beta_{0,4}^-$	max:	686,4	(4) 0,103 (3)
$\beta_{0,4}^-$	avg:	208,4	(2)
$\beta_{0,1}^-$	max:	1247,4	(4) 41,0 (25)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	412,2	(2)

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Pu)	12,125 — 21,984	32,4 (14)
XK α_2	(Pu)	99,525	0,210 (8) } K α
XK α_1	(Pu)	103,734	0,332 (12) }
XK β_3	(Pu)	116,244	}
XK β_1	(Pu)	117,228	} 0,122 (5) K' β_1
XK β_5''	(Pu)	117,918	}
XK β_2	(Pu)	120,54	}
XK β_4	(Pu)	120,969	} 0,042 (2) K' β_2
XKO _{2,3}	(Pu)	121,543	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pu})$	44,07 (2)	0,1024 (21)
$\gamma_{2,1}(\text{Pu})$	101,88 (2)	0,252 (8)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Pu})$	103,74 (2)	0,312 (3)
$\gamma_{14,9}(\text{Pu})$	114,4 (4)	0,0058 (10)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Pu})$	116,27 (8)	0,04
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Pu})$	117,27 (8)	0,074
$\gamma_{15,14}(\text{Pu})$	120,11 (5)	0,101 (5)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Pu})$	120,5	0,02
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Pu})$	121,70 (8)	0,010 (1)
$\gamma_{15,13}(\text{Pu})$	132,5 (1)	0,0014 (8)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{3,2}(\text{Pu})$	157,42 (5)	0,001
$\gamma_{15,12}(\text{Pu})$	174,08 (5)	0,0229 (8)
$\gamma_{(-1,6)}(\text{Pu})$	220,87 (11)	0,0030 (5)
$\gamma_{8,5}(\text{Pu})$	301,37 (7)	0,0106 (10)
$\gamma_{14,6}(\text{Pu})$	319,29 (11)	0,0083 (10)
$\gamma_{10,5}(\text{Pu})$	321,75 (20)	0,0013 (8)
$\gamma_{11,5}(\text{Pu})$	324,02 (9)	0,0146 (8)
$\gamma_{7,4}(\text{Pu})$	336,36 (15)	0,0002 (1)
$\gamma_{8,4}(\text{Pu})$	357,64 (7)	0,0504 (13)
$\gamma_{10,4}(\text{Pu})$	378,05 (13)	0,0030 (5)
$\gamma_{11,4}(\text{Pu})$	380,31 (10)	0,0111 (5)
$\gamma_{14,5}(\text{Pu})$	421,1 (1)	0,021 (1)
$\gamma_{6,3}(\text{Pu})$	459,8 (2)	0,0023 (15)
$\gamma_{5,2}(\text{Pu})$	515,51 (7)	0,0378 (11)
$\gamma_{4,1}(\text{Pu})$	561,14 (5)	0,106 (2)
$\gamma_{4,0}(\text{Pu})$	605,16 (5)	0,077 (2)
$\gamma_{5,1}(\text{Pu})$	617,39 (5)	0,0593
$\gamma_{6,2}(\text{Pu})$	617,4	0,008
$\gamma_{10,2}(\text{Pu})$	836,96 (7)	0,0206 (8)
$\gamma_{12,2}(\text{Pu})$	882,63 (3)	0,803 (9)
$\gamma_{(-1,7)}(\text{Pu})$	885	0,040 (5)
$\gamma_{7,1}(\text{Pu})$	897,34 (10)	0,0073 (10)
$\gamma_{8,1}(\text{Pu})$	918,70 (4)	0,529 (6)
$\gamma_{13,2}(\text{Pu})$	923,99 (2)	2,604 (20)
$\gamma_{9,1}(\text{Pu})$	924	0,065
$\gamma_{14,2}(\text{Pu})$	936,60 (5)	0,365 (5)
$\gamma_{10,1}(\text{Pu})$	938,94 (10)	0,0327 (25)
$\gamma_{11,1}(\text{Pu})$	941,40 (4)	0,504 (6)
$\gamma_{8,0}(\text{Pu})$	962,76 (2)	0,645 (8)
$\gamma_{9,0}(\text{Pu})$	968,9 (4)	0,015 (8)
$\gamma_{10,0}(\text{Pu})$	983,0 (3)	0,068 (20)
$\gamma_{12,1}(\text{Pu})$	984,45 (2)	25,18 (13)
$\gamma_{13,1}(\text{Pu})$	1025,87 (2)	8,76 (6)
$\gamma_{12,0}(\text{Pu})$	1028,54 (2)	18,25 (13)

6 Main Production Modes

Np – 237(n, γ)Np – 238


U – 238(p,n)Np – 238


U – 238(d,2n)Np – 238


7 References

- M.S. FREEDMAN, A.H. JAFFEY, F. WAGNER JR. Phys.Rev. 79 (1950) 410 (Half-life)
- D.C. DUNLAVEY, G.T. SEABORG. Phys. Rev. 87 (1952) 165 (Conversion electron measurements, gamma ray multipolarities)

- S.A. BARANOV, K.N. SHLYAGIN. At. Energ. USSR 1 (1956) 52
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities)
- W.G. SMITH, J.M. HOLLANDER. Phys. Rev. 101 (1956) 746
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities)
- R.G. ALBRIDGE, J.C. HUBBS, R. MARRUS. Phys. Rev. 111 (1958) 1137
(Half-life)
- F. ASARO, I. PERLMAN. UCRL-9566 (1960) p.50
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities)
- R.G. ALBRIDGE, J.M. HOLLANDER. Nucl. Phys. 21 (1960) 438
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities)
- G.G. AKALAEV, N.A. VARTANOV, P.S. SAMOILOV. NP-14688 (1965) (1965)
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities)
- S.M.QAIM. Nucl. Phys. 84 (1966) 411
(Half-life)
- B. BENGSTON, J.JENSEN, M.MOSZYNSKI, H.L.NIELSEN. Nucl. Phys. A 159 (1970) 249
(924-keV gamma ray energy and relative emission probability)
- C.M. LEDERER. Priv. Comm. 1970, see C.M. Lederer, V.Shirley, Table of Isotopes, N.Y.: John Wiley and Sons, 1978 (1970)
(gamma ray energy)
- W.J.B. WINTER, A.H. WAPSTRA, P.F.A. GOUDSMIT, J. KONIJN. Nucl. Phys. A197 (1972) 417
(Relative gamma ray intensities)
- C.M. LEDERER. Phys. Rev. C24 (1981) 1175
(Relative gamma ray intensities)
- Y. CHANG, B. ZHU, C. YAN, G. SHI, J. CHIN. Nucl. Phys. 12, No 1 (1990) 65
(Relative gamma ray intensities, absolute 984-keV gamma ray emission probability)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1999-1 (1999)
(KX rays relative emission probabilities)
- F.E. CHUKREEV, V.E. MAKARENKO, M.J. MARTIN. Nucl. Data Sheets 97 (2002) 129
(Nuclear data evaluation for A=238)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q value)
- K. RENGAN, D. DEVRIES, H. GRIFFIN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A565 (2006) 612
(Gamma-ray energies, relative gamma ray intensities, absolute 984-keV gamma ray emission probability)







1 Decay Scheme

U-239 disintegrates by beta minus emission to levels in Np-239.

L'uranium 239 se désintègre par émission bêta vers des niveaux excités du neptunium 239.

2 Nuclear Data

$$\begin{aligned} T_{1/2}(^{239}\text{U}) &: 23,46 \quad (4) \quad \text{min} \\ T_{1/2}(^{239}\text{Np}) &: 2,356 \quad (3) \quad \text{d} \\ Q^-(^{239}\text{U}) &: 1261,5 \quad (16) \quad \text{keV} \end{aligned}$$

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,33}^-$	164,5 (16)	0,0033 (2)		
$\beta_{0,32}^-$	212,3 (16)	0,0091 (2)		
$\beta_{0,31}^-$	221,1 (16)	0,0074 (5)		
$\beta_{0,30}^-$	247,9 (16)	0,0045 (3)		
$\beta_{0,29}^-$	269,3 (16)	0,0106 (2)		
$\beta_{0,28}^-$	295,0 (16)	0,0057 (3)		
$\beta_{0,27}^-$	297,3 (16)	0,192 (8)		
$\beta_{0,26}^-$	302,3 (16)	0,0239 (4)		
$\beta_{0,25}^-$	398,1 (16)	0,0046 (5)		
$\beta_{0,24}^-$	417,4 (16)	0,201 (5)		
$\beta_{0,23}^-$	442,2 (16)	0,229 (7)		
$\beta_{0,19}^-$	566,3 (16)	0,0143 (7)		
$\beta_{0,18}^-$	599,2 (16)	0,248 (5)	1st forbidden	7,35
$\beta_{0,15}^-$	697,6 (16)	0,0253 (6)		
$\beta_{0,14}^-$	731,2 (16)	0,0040 (4)		
$\beta_{0,13}^-$	743,5 (16)	0,065 (2)		
$\beta_{0,12}^-$	787,1 (16)	0,0032 (4)		

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,4}^-$	1143,8 (16)	2,05 (22)	1st Forbidden	7,4
$\beta_{0,3}^-$	1186,5 (16)	70,4 (16)	1st Forbidden	5,93
$\beta_{0,1}^-$	1230,4 (16)	10,1 (13)	Allowed	6,83
$\beta_{0,0}^-$	1261,5 (16)	16,5 (18)	Allowed	6,65

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	P _{γ+ce} $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Np})$	31,131 (2)	19,7 (15)	M1+3,08%E2		202 (10)	52,8 (28)	273 (14)
$\gamma_{4,3}(\text{Np})$	43,1	1,92 (0)	M1+12,6%E2		114 (13)	30 (4)	154 (18)
$\gamma_{3,1}(\text{Np})$	43,533 (1)	9,3 (6)	E1	0,856 (17)	0,215 (4)	1,14 (23)	
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Np})$	46,6	0,009 (4)					
$\gamma_{6,4}(\text{Np})$	55,18	0,0073 (23)	M1+26,4%E2		63 (20)	17 (6)	86 (27)
$\gamma_{2,0}(\text{Np})$	71,21 (2)	0,16 (3)	E2		52,3 (10)	14,6 (3)	71,9 (14)
$\gamma_{3,0}(\text{Np})$	74,664 (1)	63,2 (14)	E1		0,208 (4)	0,0512 (10)	0,276 (6)
$\gamma_{4,1}(\text{Np})$	86,72 (7)	0,065 (6)	E1		0,140 (3)	0,0344 (7)	0,186 (4)
$\gamma_{15,11}(\text{Np})$	111,0 (2)	0,0202 (5)					
$\gamma_{4,0}(\text{Np})$	117,66 (3)	0,122 (10)	E1		0,0631 (13)	0,0155 (3)	0,0841 (17)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Np})$	134,71 (13)	0,0018 (3)					
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Np})$	142,5 (1)	0,0043 (5)					
$\gamma_{7,2}(\text{Np})$	170,2	0,029 (1)					
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Np})$	174,07 (6)	0,0097 (3)					
$\gamma_{8,3}(\text{Np})$	186,15 (4)	0,0276 (3)	[M1+E2]				
$\gamma_{10,8}(\text{Np})$	187,28 (8)	0,0054 (3)	[M1+E2]				
$\gamma_{25,18}(\text{Np})$	201,09 (18)	0,0005 (2)					
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Np})$	220,52 (4)	0,0271 (3)					
$\gamma_{(-1,6)}(\text{Np})$	236,28 (14)	0,0009 (2)					
$\gamma_{(-1,7)}(\text{Np})$	240,00 (15)	0,0008 (2)					
$\gamma_{23,15}(\text{Np})$	255,71 (12)	0,0011 (2)					
$\gamma_{31,21}(\text{Np})$	258,80 (16)	0,0007 (2)					
$\gamma_{8,0}(\text{Np})$	260,86 (9)	0,0031 (2)	[E1]		0,0434 (9)	0,00870 (17)	0,00211 (4)
$\gamma_{(-1,8)}(\text{Np})$	262,89 (19)	0,0008 (3)					0,0549 (11)
$\gamma_{(-1,9)}(\text{Np})$	265,44 (17)	0,0009 (3)					
$\gamma_{29,19}(\text{Np})$	296,93 (13)	0,0014 (2)	[M1+E2]				
$\gamma_{27,18}(\text{Np})$	301,64 (15)	0,0011 (3)					
$\gamma_{(-1,10)}(\text{Np})$	326,21 (7)	0,0042 (2)					
$\gamma_{(-1,11)}(\text{Np})$	330,14 (14)	0,0007 (1)					
$\gamma_{(-1,12)}(\text{Np})$	332,06 (14)	0,0011 (2)					
$\gamma_{31,19}(\text{Np})$	345,13 (8)	0,0038 (2)					
$\gamma_{(-1,13)}(\text{Np})$	348,23 (18)	0,0007 (3)					
$\gamma_{(-1,14)}(\text{Np})$	351,33 (15)	0,0007 (2)					
$\gamma_{(-1,15)}(\text{Np})$	361,83 (8)	0,0043 (3)					
$\gamma_{10,3}(\text{Np})$	373,51 (4)	0,024 (2)	[M1+E2]				
$\gamma_{11,3}(\text{Np})$	378,06 (6)	0,0096 (3)					
$\gamma_{11,2}(\text{Np})$	381,27 (16)	0,0006 (2)					
$\gamma_{(-1,16)}(\text{Np})$	393,01 (18)	0,0006 (2)					
$\gamma_{26,15}(\text{Np})$	395,19 (11)	0,0020 (2)					
$\gamma_{12,3}(\text{Np})$	399,13 (13)	0,0015 (3)					
$\gamma_{(-1,17)}(\text{Np})$	400,55 (15)	0,0009 (2)					

	Energy keV	$P_{\gamma+ce} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{(-1,18)}(\text{Np})$	404,84 (18)	0,0008 (3)					
$\gamma_{33,18}(\text{Np})$	434,44 (13)	0,0011 (2)	[E1]	0,0148 (3)	0,00276 (6)	0,000660 (13)	0,0185 (4)
$\gamma_{(-1,19)}(\text{Np})$	445,81 (12)	0,0011 (2)					
$\gamma_{10,0}(\text{Np})$	448,19 (6)	0,0085 (2)	[E1]	0,0139 (3)	0,00258 (5)	0,000620 (12)	0,0173 (4)
$\gamma_{(-1,20)}(\text{Np})$	452,17 (12)	0,0015 (2)					
$\gamma_{14,3}(\text{Np})$	455,26 (18)	0,0008 (3)					
$\gamma_{12,0}(\text{Np})$	474,50 (11)	0,0017 (2)					
$\gamma_{(-1,21)}(\text{Np})$	478,13 (19)	0,0005 (2)					
$\gamma_{(-1,22)}(\text{Np})$	479,55 (14)	0,0010 (2)					
$\gamma_{13,1}(\text{Np})$	486,87 (3)	0,061 (3)	[E1]	0,0118 (2)	0,00217 (4)	0,00052 (1)	0,0147 (4)
$\gamma_{(-1,23)}(\text{Np})$	490,33 (13)	0,0007 (1)					
$\gamma_{15,2}(\text{Np})$	492,76 (7)	0,0048 (2)					
$\gamma_{14,1}(\text{Np})$	499,1 (1)	0,0020 (2)					
$\gamma_{(-1,24)}(\text{Np})$	502,12 (17)	0,0006 (2)					
$\gamma_{16,3}(\text{Np})$	504,76 (8)	0,0051 (3)	[E2]	0,0293 (6)	0,0143 (3)	0,0038 (1)	0,0488 (10)
$\gamma_{(-1,25)}(\text{Np})$	506,80 (14)	0,0010 (2)					
$\gamma_{13,0}(\text{Np})$	518,01 (9)	0,0044 (3)	[E1]	0,0105 (2)	0,00191 (4)	0,00046 (1)	0,0185 (4)
$\gamma_{19,6}(\text{Np})$	522,12 (10)	0,0024 (2)	[M1+E2]				
$\gamma_{15,1}(\text{Np})$	532,86 (10)	0,0022 (2)					
$\gamma_{(-1,26)}(\text{Np})$	541,32 (10)	0,0028 (2)					
$\gamma_{18,4}(\text{Np})$	544,48 (9)	0,0034 (3)	[M1+E2]				
$\gamma_{16,1}(\text{Np})$	547,99 (12)	0,0020 (3)	[E1]	0,00941 (19)	0,00170 (3)	0,00041 (1)	0,0117 (2)
$\gamma_{(-1,27)}(\text{Np})$	558,46 (17)	0,0006 (2)					
$\gamma_{(-1,28)}(\text{Np})$	560,63 (7)	0,0056 (3)					
$\gamma_{15,0}(\text{Np})$	564,09 (20)	0,0004 (2)					
$\gamma_{(-1,29)}(\text{Np})$	567,88 (18)	0,0004 (1)					
$\gamma_{(-1,30)}(\text{Np})$	575,27 (5)	0,0121 (3)					
$\gamma_{(-1,31)}(\text{Np})$	577,15 (14)	0,0013 (3)					
$\gamma_{(-1,32)}(\text{Np})$	585,49 (14)	0,0012 (2)					
$\gamma_{18,3}(\text{Np})$	587,63 (5)	0,0184 (3)	[M1+E2]				
$\gamma_{(-1,33)}(\text{Np})$	588,70 (8)	0,0053 (3)					
$\gamma_{(-1,34)}(\text{Np})$	591,82 (19)	0,0009 (4)					
$\gamma_{(-1,35)}(\text{Np})$	599,13 (15)	0,0007 (2)					
$\gamma_{(-1,36)}(\text{Np})$	602,79 (8)	0,0047 (2)					
$\gamma_{(-1,37)}(\text{Np})$	604,85 (6)	0,0009 (3)					
$\gamma_{(-1,38)}(\text{Np})$	607,96 (15)	0,0013 (3)					
$\gamma_{(-1,39)}(\text{Np})$	614,53 (17)	0,0006 (2)					
$\gamma_{(-1,40)}(\text{Np})$	618,03 (16)	0,0007 (2)					
$\gamma_{19,2}(\text{Np})$	624,11 (7)	0,0060 (2)	[E1]	0,00737 (15)	0,00131 (3)	0,00031 (1)	0,00910 (18)
$\gamma_{(-1,41)}(\text{Np})$	629,00 (11)	0,0026 (3)					
$\gamma_{18,1}(\text{Np})$	631,10 (3)	0,0656 (3)	[E1]	0,00722 (14)	0,00128 (3)	0,000307 (6)	0,00892 (18)
$\gamma_{(-1,42)}(\text{Np})$	644,12 (14)	0,0019 (4)					
$\gamma_{23,6}(\text{Np})$	646,26 (10)	0,0027 (3)					
$\gamma_{(-1,43)}(\text{Np})$	649,79 (19)	0,0009 (4)					
$\gamma_{18,0}(\text{Np})$	662,26 (2)	0,163 (5)	[E1]	0,00660 (13)	0,00117 (2)	0,00028 (1)	0,00815 (16)
$\gamma_{19,1}(\text{Np})$	664,17 (9)	0,0051 (4)	[E1]	0,00657 (13)	0,00116 (2)	0,00028 (1)	0,00811 (16)
$\gamma_{(-1,44)}(\text{Np})$	668,76 (18)	0,0005 (2)					
$\gamma_{(-1,45)}(\text{Np})$	670,88 (20)	0,0006 (3)					
$\gamma_{(-1,46)}(\text{Np})$	691,01 (6)	0,0071 (3)					
$\gamma_{(-1,47)}(\text{Np})$	692,61 (13)	0,0016 (3)					
$\gamma_{19,0}(\text{Np})$	695,18 (8)	0,0034 (3)	[E1]	0,00604 (12)	0,00106 (2)	0,00025 (1)	0,00745 (15)
$\gamma_{(-1,48)}(\text{Np})$	701,21 (10)	0,0023 (2)					
$\gamma_{27,8}(\text{Np})$	703,63 (10)	0,0023 (2)	[E2]	0,0162 (3)	0,00537 (11)	0,00138 (3)	0,0234 (5)
$\gamma_{21,2}(\text{Np})$	707,38 (9)	0,0022 (2)					
$\gamma_{(-1,49)}(\text{Np})$	714,22 (9)	0,0029 (3)					
$\gamma_{27,7}(\text{Np})$	722,85 (4)	0,0264 (3)	[E2]	0,0138 (3)	0,00418 (8)	0,00106 (2)	0,0194 (4)
$\gamma_{(-1,50)}(\text{Np})$	727,52 (10)	0,0025 (2)					
$\gamma_{(-1,51)}(\text{Np})$	730,95 (6)	0,0090 (2)					
$\gamma_{(-1,52)}(\text{Np})$	746,06 (11)	0,0041 (5)					

	Energy keV	$P_{\gamma+ce} \times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{23,2}(\text{Np})$	748,09 (3)	0,0850 (4)					
$\gamma_{30,8}(\text{Np})$	752,39 (14)	0,0012 (3)					
$\gamma_{(-1,53)}(\text{Np})$	764,04 (11)	0,0025 (3)					
$\gamma_{(-1,54)}(\text{Np})$	768,15 (11)	0,0020 (2)					
$\gamma_{(-1,55)}(\text{Np})$	769,52 (17)	0,0004 (1)					
$\gamma_{24,2}(\text{Np})$	772,94 (9)	0,0028 (2)					
$\gamma_{(-1,56)}(\text{Np})$	774,77 (4)	0,015 (2)					
$\gamma_{31,8}(\text{Np})$	779,57 (14)	0,0006 (1)					
$\gamma_{23,1}(\text{Np})$	788,19 (7)	0,0046 (2)					
$\gamma_{(-1,57)}(\text{Np})$	791,33 (6)	0,0072 (2)					
$\gamma_{(-1,58)}(\text{Np})$	795,13 (15)	0,0008 (2)					
$\gamma_{24,1}(\text{Np})$	812,89 (3)	0,0657 (3)					
$\gamma_{23,0}(\text{Np})$	819,19 (2)	0,123 (2)					
$\gamma_{(-1,59)}(\text{Np})$	829,59 (17)	0,0004 (1)					
$\gamma_{(-1,60)}(\text{Np})$	831,89 (9)	0,0020 (2)					
$\gamma_{(-1,61)}(\text{Np})$	841,48 (12)	0,0024 (4)					
$\gamma_{24,0}(\text{Np})$	844,05 (2)	0,133 (2)					
$\gamma_{(-1,62)}(\text{Np})$	846,39 (4)	0,0298 (4)					
$\gamma_{28,4}(\text{Np})$	849,44 (9)	0,0020 (2)					
$\gamma_{(-1,63)}(\text{Np})$	862,56 (18)	0,0004 (1)					
$\gamma_{31,6}(\text{Np})$	867,11 (11)	0,00073 (8)					
$\gamma_{(-1,64)}(\text{Np})$	869,57 (9)	0,0016 (1)					
$\gamma_{29,4}(\text{Np})$	874,22 (7)	0,0031 (1)	[M1+E2]				
$\gamma_{26,3}(\text{Np})$	884,45 (5)	0,0082 (2)					
$\gamma_{(-1,65)}(\text{Np})$	887,83 (10)	0,0023 (2)					
$\gamma_{27,3}(\text{Np})$	889,49 (4)	0,0200 (2)	[M1+E2]				
$\gamma_{28,2}(\text{Np})$	895,15 (15)	0,0008 (2)					
$\gamma_{(-1,66)}(\text{Np})$	913,68 (9)	0,0018 (1)					
$\gamma_{29,3}(\text{Np})$	917,40 (8)	0,0025 (1)	[M1+E2]				
$\gamma_{29,2}(\text{Np})$	920,95 (8)	0,0025 (1)	[E1]	0,00366 (8)	0,000630 (13)	0,00015 (1)	0,00450 (9)
$\gamma_{31,4}(\text{Np})$	922,83 (13)	0,0005 (1)					
$\gamma_{26,1}(\text{Np})$	928,00 (6)	0,0049 (1)					
$\gamma_{32,4}(\text{Np})$	931,97 (7)	0,0051 (2)	[M1+E2]				
$\gamma_{27,1}(\text{Np})$	933,09 (3)	0,0252 (2)	[E1]	0,00358 (7)	0,000610 (12)	0,00015 (1)	0,00439 (9)
$\gamma_{30,3}(\text{Np})$	938,59 (16)	0,00030 (8)					
$\gamma_{(-1,67)}(\text{Np})$	948,88 (19)	0,00023 (9)					
$\gamma_{26,0}(\text{Np})$	959,48 (6)	0,0076 (2)					
$\gamma_{29,1}(\text{Np})$	960,99 (5)	0,0100 (2)	[E1]	0,00340 (7)	0,00058 (1)	0,00014 (1)	0,00417 (9)
$\gamma_{27,0}(\text{Np})$	964,30 (3)	0,0871 (4)	[E1]	0,00338 (7)	0,000580 (12)	0,00014 (1)	0,00415 (9)
$\gamma_{(-1,68)}(\text{Np})$	970,07 (14)	0,0009 (1)					
$\gamma_{32,3}(\text{Np})$	974,91 (14)	0,00039 (8)	[E1]	0,00332 (7)	0,00057 (1)	0,000130 (12)	0,00407 (9)
$\gamma_{(-1,69)}(\text{Np})$	988,51 (14)	0,00042 (9)					
$\gamma_{29,0}(\text{Np})$	992,00 (7)	0,0027 (1)	[E1]	0,00322 (7)	0,000550 (11)	0,00013 (1)	0,00395 (8)
$\gamma_{(-1,70)}(\text{Np})$	1002,40 (13)	0,00046 (9)					
$\gamma_{(-1,71)}(\text{Np})$	1005,27 (13)	0,0006 (1)					
$\gamma_{(-1,72)}(\text{Np})$	1009,38 (18)	0,0003 (1)					
$\gamma_{31,0}(\text{Np})$	1040,19 (9)	0,0011 (1)					
$\gamma_{33,1}(\text{Np})$	1065,76 (12)	0,00057 (8)	[M1+E2]				
$\gamma_{33,0}(\text{Np})$	1096,92 (8)	0,0016 (1)	[M1+E2]				
$\gamma_{(-1,73)}(\text{Np})$	1101,99 (16)	0,00030 (1)					

3 Atomic Data

3.1 Np

ω_K	:	0,971	(4)
$\bar{\omega}_L$:	0,511	(20)
$\bar{\omega}_M$:	0,0528	
n_{KL}	:	0,791	(5)
\bar{n}_{LM}	:	1,163	

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	97,069	62,82
K α_1	101,059	100
K β_3	113,303	}
K β_1	114,234	}
K β_5''	114,912	}
K β_2	117,463	}
K β_4	117,876	}
KO _{2,3}	118,429	36,21
X _L		
L ℓ	11,871	
L α	13,671 – 13,946	
L η	15,861	
L β	16,109 – 17,992	
L γ	20,784 – 21,491	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	73,501 – 83,134	100
KLX	90,358 – 101,054	60,2
KXY	107,19 – 118,66	9,06
Auger L	6,04 – 13,12	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
eAL	(Np)	6,04 - 13,12	19,4 (60)
eAK	(Np)		0,0091 (13)
	KLL	73,501 - 83,134	}
	KLX	90,358 - 101,054	}
	KXY	107,19 - 118,66	}
ec _{1,0} L	(Np)	8,704 - 13,521	14,5 (10)
ec _{4,3} L	(Np)	20,7 - 25,5	1,41
ec _{3,1} L	(Np)	21,106 - 25,920	3,72 (25)
ec _{1,0} M	(Np)	25,392 - 27,467	3,8 (3)
ec _{6,4} L	(Np)	32,75 - 37,57	0,0053 (17)
ec _{4,3} M	(Np)	37,4 - 39,4	0,37
ec _{3,1} M	(Np)	37,79 - 39,87	0,94 (7)
ec _{2,0} L	(Np)	48,78 - 53,60	0,115 (21)
ec _{6,4} M	(Np)	49,44 - 51,52	0,0014 (5)
ec _{3,0} L	(Np)	52,237 - 57,054	10,3 (3)
ec _{4,1} L	(Np)	64,29 - 69,11	0,0077 (7)
ec _{2,0} M	(Np)	65,47 - 67,55	0,032 (6)
ec _{3,0} M	(Np)	68,93 - 71,00	2,53 (8)
ec _{4,1} M	(Np)	80,98 - 83,06	0,00189 (18)
ec _{4,0} L	(Np)	95,23 - 100,05	0,0071 (6)
ec _{4,0} M	(Np)	111,92 - 114,00	0,00175 (14)
$\beta_{0,33}^-$	max:	164,5 (16)	0,0033 (2)
$\beta_{0,33}^-$	avg:	43,7 (5)	
$\beta_{0,32}^-$	max:	212,3 (16)	0,0091 (2)
$\beta_{0,32}^-$	avg:	57,3 (5)	
$\beta_{0,31}^-$	max:	221,1 (16)	0,0074 (5)
$\beta_{0,31}^-$	avg:	59,9 (5)	
$\beta_{0,30}^-$	max:	247,9 (16)	0,0045 (3)
$\beta_{0,30}^-$	avg:	67,6 (5)	
$\beta_{0,29}^-$	max:	269,3 (16)	0,0106 (2)
$\beta_{0,29}^-$	avg:	74,0 (5)	
$\beta_{0,28}^-$	max:	295,0 (16)	0,0057 (3)
$\beta_{0,28}^-$	avg:	81,7 (5)	
$\beta_{0,27}^-$	max:	297,3 (16)	0,192 (8)
$\beta_{0,27}^-$	avg:	82,4 (5)	
$\beta_{0,26}^-$	max:	302,3 (16)	0,0239 (4)
$\beta_{0,26}^-$	avg:	83,9 (5)	
$\beta_{0,25}^-$	max:	398,1 (16)	0,0046 (5)
$\beta_{0,25}^-$	avg:	113,4 (5)	
$\beta_{0,24}^-$	max:	417,4 (16)	0,201 (5)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,24}^-$	avg:	119,6 (5)	
$\beta_{0,23}^-$	max:	442,2 (16)	0,229 (7)
$\beta_{0,23}^-$	avg:	127,4 (5)	
$\beta_{0,19}^-$	max:	566,3 (16)	0,0143 (7)
$\beta_{0,19}^-$	avg:	168,0 (5)	
$\beta_{0,18}^-$	max:	599,2 (16)	0,248 (5)
$\beta_{0,18}^-$	avg:	179,0 (5)	
$\beta_{0,15}^-$	max:	697,6 (16)	0,0253 (6)
$\beta_{0,15}^-$	avg:	212,6 (5)	
$\beta_{0,14}^-$	max:	731,2 (16)	0,0040 (4)
$\beta_{0,14}^-$	avg:	224,3 (5)	
$\beta_{0,13}^-$	max:	743,5 (16)	0,065 (2)
$\beta_{0,13}^-$	avg:	228,6 (5)	
$\beta_{0,12}^-$	max:	787,1 (16)	0,0032 (4)
$\beta_{0,12}^-$	avg:	244,0 (5)	
$\beta_{0,4}^-$	max:	1143,8 (16)	2,05 (22)
$\beta_{0,4}^-$	avg:	374,0 (5)	
$\beta_{0,3}^-$	max:	1186,5 (16)	70,4 (16)
$\beta_{0,3}^-$	avg:	390,4 (5)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	1230,4 (16)	10,1 (13)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	406,8 (5)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	1261,5 (16)	16,5 (18)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	418,6 (5)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Np)	11,871 — 21,491	14,9 (4)
XK α_2	(Np)	97,069	0,091 (3) } K α
XK α_1	(Np)	101,059	0,144 (5) }
XK β_3	(Np)	113,303	}
XK β_1	(Np)	114,234	} 0,052 (2) K' β_1
XK β_5''	(Np)	114,912	}
XK β_2	(Np)	117,463	}
XK β_4	(Np)	117,876	} 0,018 (1) K' β_2
XKO _{2,3}	(Np)	118,429	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Np})$	31,131 (2)	0,072 (4)
$\gamma_{4,3}(\text{Np})$	43,1	0,0124
$\gamma_{3,1}(\text{Np})$	43,533 (1)	4,35 (28)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{Np})$	46,6	0,009 (4)
$\gamma_{6,4}(\text{Np})$	55,18	0,0000836 (20)
$\gamma_{2,0}(\text{Np})$	71,21 (2)	0,0022 (4)
$\gamma_{3,0}(\text{Np})$	74,664 (1)	49,5 (11)
$\gamma_{4,1}(\text{Np})$	86,72 (7)	0,055 (5)
$\gamma_{15,11}(\text{Np})$	111,0 (2)	0,0202 (5)
$\gamma_{4,0}(\text{Np})$	117,66 (3)	0,113 (9)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{Np})$	134,71 (13)	0,0018 (3)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{Np})$	142,5 (1)	0,0043 (5)
$\gamma_{7,2}(\text{Np})$	170,2	0,029 (1)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{Np})$	174,07 (6)	0,0097 (3)
$\gamma_{8,3}(\text{Np})$	186,15 (4)	0,0276 (3)
$\gamma_{10,8}(\text{Np})$	187,28 (8)	0,0054 (3)
$\gamma_{25,18}(\text{Np})$	201,09 (18)	0,0005 (2)
$\gamma_{(-1,5)}(\text{Np})$	220,52 (4)	0,0271 (3)
$\gamma_{(-1,6)}(\text{Np})$	236,28 (14)	0,0009 (2)
$\gamma_{(-1,7)}(\text{Np})$	240,00 (15)	0,0008 (2)
$\gamma_{23,15}(\text{Np})$	255,71 (12)	0,0011 (2)
$\gamma_{31,21}(\text{Np})$	258,80 (16)	0,0007 (2)
$\gamma_{8,0}(\text{Np})$	260,86 (9)	0,0029 (2)
$\gamma_{(-1,8)}(\text{Np})$	262,89 (19)	0,0008 (3)
$\gamma_{(-1,9)}(\text{Np})$	265,44 (17)	0,0009 (3)
$\gamma_{29,19}(\text{Np})$	296,93 (13)	0,0014 (2)
$\gamma_{27,18}(\text{Np})$	301,64 (15)	0,0011 (3)
$\gamma_{(-1,10)}(\text{Np})$	326,21 (7)	0,0042 (2)
$\gamma_{(-1,11)}(\text{Np})$	330,14 (14)	0,0007 (1)
$\gamma_{(-1,12)}(\text{Np})$	332,06 (14)	0,0011 (2)
$\gamma_{31,19}(\text{Np})$	345,13 (8)	0,0038 (2)
$\gamma_{(-1,13)}(\text{Np})$	348,23 (18)	0,0007 (3)
$\gamma_{(-1,14)}(\text{Np})$	351,33 (15)	0,0007 (2)
$\gamma_{(-1,15)}(\text{Np})$	361,83 (8)	0,0043 (3)
$\gamma_{10,3}(\text{Np})$	373,51 (4)	0,024 (2)
$\gamma_{11,3}(\text{Np})$	378,06 (6)	0,0096 (3)
$\gamma_{11,2}(\text{Np})$	381,27 (16)	0,0006 (2)
$\gamma_{(-1,16)}(\text{Np})$	393,01 (18)	0,0006 (2)
$\gamma_{26,15}(\text{Np})$	395,19 (11)	0,0020 (2)
$\gamma_{12,3}(\text{Np})$	399,13 (13)	0,0015 (3)
$\gamma_{(-1,17)}(\text{Np})$	400,55 (15)	0,0009 (2)
$\gamma_{(-1,18)}(\text{Np})$	404,84 (18)	0,0008 (3)
$\gamma_{33,18}(\text{Np})$	434,44 (13)	0,0011 (2)
$\gamma_{(-1,19)}(\text{Np})$	445,81 (12)	0,0011 (2)
$\gamma_{10,0}(\text{Np})$	448,19 (6)	0,0084 (2)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{(-1,20)}(\text{Np})$	452,17 (12)	0,0015 (2)
$\gamma_{14,3}(\text{Np})$	455,26 (18)	0,0008 (3)
$\gamma_{12,0}(\text{Np})$	474,50 (11)	0,0017 (2)
$\gamma_{(-1,21)}(\text{Np})$	478,13 (19)	0,0005 (2)
$\gamma_{(-1,22)}(\text{Np})$	479,55 (14)	0,0010 (2)
$\gamma_{13,1}(\text{Np})$	486,87 (3)	0,060 (3)
$\gamma_{(-1,23)}(\text{Np})$	490,33 (13)	0,0007 (1)
$\gamma_{15,2}(\text{Np})$	492,76 (7)	0,0048 (2)
$\gamma_{14,1}(\text{Np})$	499,1 (1)	0,0020 (2)
$\gamma_{(-1,24)}(\text{Np})$	502,12 (17)	0,0006 (2)
$\gamma_{16,3}(\text{Np})$	504,76 (8)	0,0049 (3)
$\gamma_{(-1,25)}(\text{Np})$	506,80 (14)	0,0010 (2)
$\gamma_{13,0}(\text{Np})$	518,01 (9)	0,0043 (3)
$\gamma_{19,6}(\text{Np})$	522,12 (10)	0,0024 (2)
$\gamma_{15,1}(\text{Np})$	532,86 (10)	0,0022 (2)
$\gamma_{(-1,26)}(\text{Np})$	541,32 (10)	0,0028 (2)
$\gamma_{18,4}(\text{Np})$	544,48 (9)	0,0034 (3)
$\gamma_{16,1}(\text{Np})$	547,99 (12)	0,0019 (3)
$\gamma_{(-1,27)}(\text{Np})$	558,46 (17)	0,0006 (2)
$\gamma_{(-1,28)}(\text{Np})$	560,63 (7)	0,0056 (3)
$\gamma_{15,0}(\text{Np})$	564,09 (20)	0,0004 (2)
$\gamma_{(-1,29)}(\text{Np})$	567,88 (18)	0,0004 (1)
$\gamma_{(-1,30)}(\text{Np})$	575,27 (5)	0,0121 (3)
$\gamma_{(-1,31)}(\text{Np})$	577,15 (14)	0,0013 (3)
$\gamma_{(-1,32)}(\text{Np})$	585,49 (14)	0,0012 (2)
$\gamma_{18,3}(\text{Np})$	587,63 (5)	0,0184 (3)
$\gamma_{(-1,33)}(\text{Np})$	588,70 (8)	0,0053 (3)
$\gamma_{(-1,34)}(\text{Np})$	591,82 (19)	0,0009 (4)
$\gamma_{(-1,35)}(\text{Np})$	599,13 (15)	0,0007 (2)
$\gamma_{(-1,36)}(\text{Np})$	602,79 (8)	0,0047 (2)
$\gamma_{(-1,37)}(\text{Np})$	604,85 (6)	0,0009 (3)
$\gamma_{(-1,38)}(\text{Np})$	607,96 (15)	0,0013 (3)
$\gamma_{(-1,39)}(\text{Np})$	614,53 (17)	0,0006 (2)
$\gamma_{(-1,40)}(\text{Np})$	618,03 (16)	0,0007 (2)
$\gamma_{19,2}(\text{Np})$	624,11 (7)	0,0059 (2)
$\gamma_{(-1,41)}(\text{Np})$	629,00 (11)	0,0026 (3)
$\gamma_{18,1}(\text{Np})$	631,10 (3)	0,0650 (3)
$\gamma_{(-1,42)}(\text{Np})$	644,12 (14)	0,0019 (4)
$\gamma_{23,6}(\text{Np})$	646,26 (10)	0,0027 (3)
$\gamma_{(-1,43)}(\text{Np})$	649,79 (19)	0,0009 (4)
$\gamma_{18,0}(\text{Np})$	662,26 (2)	0,162 (5)
$\gamma_{19,1}(\text{Np})$	664,17 (9)	0,0051 (4)
$\gamma_{(-1,44)}(\text{Np})$	668,76 (18)	0,0005 (2)
$\gamma_{(-1,45)}(\text{Np})$	670,88 (20)	0,0006 (3)
$\gamma_{(-1,46)}(\text{Np})$	691,01 (6)	0,0071 (3)
$\gamma_{(-1,47)}(\text{Np})$	692,61 (13)	0,0016 (3)
$\gamma_{19,0}(\text{Np})$	695,18 (8)	0,0034 (3)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{(-1,48)}(\text{Np})$	701,21 (10)	0,0023 (2)
$\gamma_{27,8}(\text{Np})$	703,63 (10)	0,0023 (2)
$\gamma_{21,2}(\text{Np})$	707,38 (9)	0,0022 (2)
$\gamma_{(-1,49)}(\text{Np})$	714,22 (9)	0,0029 (3)
$\gamma_{27,7}(\text{Np})$	722,85 (4)	0,0259 (3)
$\gamma_{(-1,50)}(\text{Np})$	727,52 (10)	0,0025 (2)
$\gamma_{(-1,51)}(\text{Np})$	730,95 (6)	0,0090 (2)
$\gamma_{(-1,52)}(\text{Np})$	746,06 (11)	0,0041 (5)
$\gamma_{23,2}(\text{Np})$	748,09 (3)	0,0850 (4)
$\gamma_{30,8}(\text{Np})$	752,39 (14)	0,0012 (3)
$\gamma_{(-1,53)}(\text{Np})$	764,04 (11)	0,0025 (3)
$\gamma_{(-1,54)}(\text{Np})$	768,15 (11)	0,0020 (2)
$\gamma_{(-1,55)}(\text{Np})$	769,52 (17)	0,0004 (1)
$\gamma_{24,2}(\text{Np})$	772,94 (9)	0,0028 (2)
$\gamma_{(-1,56)}(\text{Np})$	774,77 (4)	0,015 (2)
$\gamma_{31,8}(\text{Np})$	779,57 (14)	0,0006 (1)
$\gamma_{23,1}(\text{Np})$	788,19 (7)	0,0046 (2)
$\gamma_{(-1,57)}(\text{Np})$	791,33 (6)	0,0072 (2)
$\gamma_{(-1,58)}(\text{Np})$	795,13 (15)	0,0008 (2)
$\gamma_{24,1}(\text{Np})$	812,89 (3)	0,0657 (3)
$\gamma_{23,0}(\text{Np})$	819,19 (2)	0,123 (2)
$\gamma_{(-1,59)}(\text{Np})$	829,59 (17)	0,0004 (1)
$\gamma_{(-1,60)}(\text{Np})$	831,89 (9)	0,0020 (2)
$\gamma_{(-1,61)}(\text{Np})$	841,48 (12)	0,0024 (4)
$\gamma_{24,0}(\text{Np})$	844,05 (2)	0,133 (2)
$\gamma_{(-1,62)}(\text{Np})$	846,39 (4)	0,0298 (4)
$\gamma_{28,4}(\text{Np})$	849,44 (9)	0,0020 (2)
$\gamma_{(-1,63)}(\text{Np})$	862,56 (18)	0,0004 (1)
$\gamma_{31,6}(\text{Np})$	867,11 (11)	0,00073 (8)
$\gamma_{(-1,64)}(\text{Np})$	869,57 (9)	0,0016 (1)
$\gamma_{29,4}(\text{Np})$	874,22 (7)	0,0031 (1)
$\gamma_{26,3}(\text{Np})$	884,45 (5)	0,0082 (2)
$\gamma_{(-1,65)}(\text{Np})$	887,83 (10)	0,0023 (2)
$\gamma_{27,3}(\text{Np})$	889,49 (4)	0,0200 (2)
$\gamma_{28,2}(\text{Np})$	895,15 (15)	0,0008 (2)
$\gamma_{(-1,66)}(\text{Np})$	913,68 (9)	0,0018 (1)
$\gamma_{29,3}(\text{Np})$	917,40 (8)	0,0025 (1)
$\gamma_{29,2}(\text{Np})$	920,95 (8)	0,0025 (1)
$\gamma_{31,4}(\text{Np})$	922,83 (13)	0,0005 (1)
$\gamma_{26,1}(\text{Np})$	928,00 (6)	0,0049 (1)
$\gamma_{32,4}(\text{Np})$	931,97 (7)	0,0051 (2)
$\gamma_{27,1}(\text{Np})$	933,09 (3)	0,0251 (2)
$\gamma_{30,3}(\text{Np})$	938,59 (16)	0,00030 (8)
$\gamma_{(-1,67)}(\text{Np})$	948,88 (19)	0,00023 (9)
$\gamma_{26,0}(\text{Np})$	959,48 (6)	0,0076 (2)
$\gamma_{29,1}(\text{Np})$	960,99 (5)	0,0100 (2)
$\gamma_{27,0}(\text{Np})$	964,30 (3)	0,0867 (4)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{(-1,68)}(\text{Np})$	970,07 (14)	0,0009 (1)
$\gamma_{32,3}(\text{Np})$	974,91 (14)	0,00039 (8)
$\gamma_{(-1,69)}(\text{Np})$	988,51 (14)	0,00042 (9)
$\gamma_{29,0}(\text{Np})$	992,00 (7)	0,0027 (1)
$\gamma_{(-1,70)}(\text{Np})$	1002,40 (13)	0,00046 (9)
$\gamma_{(-1,71)}(\text{Np})$	1005,27 (13)	0,0006 (1)
$\gamma_{(-1,72)}(\text{Np})$	1009,38 (18)	0,0003 (1)
$\gamma_{31,0}(\text{Np})$	1040,19 (9)	0,0011 (1)
$\gamma_{33,1}(\text{Np})$	1065,76 (12)	0,00057 (8)
$\gamma_{33,0}(\text{Np})$	1096,92 (8)	0,0016 (1)
$\gamma_{(-1,73)}(\text{Np})$	1101,99 (16)	0,00030 (1)


6 Main Production Modes


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{U} - 238(n,\gamma)\text{U} - 239 \\ \text{Possible impurities : U} - 238 \end{array} \right.$$


7 References


- A.C.G.MITCHELL, L.SLOTIN, J.MARSHALL, V.A. NEDZEL, L.J. BROWN, J.R. PRUETT. CP-597 (1943) (Half-life)
- N.FEATHER, R.S.KRISHNAN. Proc. Cambridge Phil. Soc. 43 (1947) 267 (Half-life)
- J.M.HOLLANDER. Priv.Comm., quoted by 1960AS02 (1960) (Gamma transition multipolarities)
- K.J.BLINOWSKA, P.G.HANSEN, H.L.NIELSEN, O.SCHULT, K.WIEN. Nucl. Phys. 55 (1964) 331 (Gamma transition multipolarities, energies and absolute emission probabilities)
- L.N.YUROVA, A.V.BUSHUEV, V.G BORTSOV. Soviet. J. At. Energy 18 (1965) 75 (Gamma ray absolute emission probabilities)
- D.R. MACKENZIE, R.D. CONNOR. Nucl. Phys A108 (1968) 81 (Gamma ray absolute emission probabilities)
- J.E.CLINE, D.A.TRIPP. Priv.Comm. , November 1969 (1969) (Gamma ray energies and absolute emission probabilities)
- D.ENGELKEMEIR. Phys.Rev. 181 (1969) 1675 (Gamma transition multipolarities)
- J.B.HUNT, J.C.ROBERTSON, T.B.RYVES. J.Nucl.Energy 23 (1969) 705 (Half-life)
- A.ARTNA-COHEN. Nucl.Data Sheets B 6 (1971) 577 (Gamma ray energies)
- J.C.PATE, K.R.BAKER, R.W.FINK, D.A.MCCLURE, N.S.KENDRICK, JR., Z.Phys. A 272 (1975) 169 (Gamma ray energies)
- H.G.BORNER, G.BARREAU, W.F.DAVIDSON, P.JEUCH, T.VON EGIDY, J.ALMEIDA, D.H.WHITE,. Nucl.Instrum.Methods 166 (1979) 251 (Gamma ray energies)
- I.AHMAD. Nucl.Instrum.Methods 193 (1982) 9 (Gamma ray energies)
- S.P.HOLLOWAY, J.B. OLOMO, T.D. MACMAHON, B.W. HOOTON. Private communication (1984).Cited in: Decay Data of the Transactinium Nuclides, IAEA, Vienna, Tec. Rep. Ser. 261, 1986 (1984) (Gamma ray absolute emission probabilities)


- A.ABZOUZI, M.S.ANTONY, V.B.NDOCKO. J.Radioanal.Nucl.Chem. 135 (1989) 1
(Half-life)
- D.SARDARI, T.D.MAC MAHON, S.P.HOLLOWAY. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A369 (1996) 486
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1999-1, Braunschweig, February 1999 (1999)
(KX ray energies and relative emission probabilities)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q value)
- E.BROWNE. Nucl.Data Sheets 98 (2003) 665
(Decay data evaluations, multipolarities, scheme)
- E.L.WONG, H.C.GRIFFIN. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A558 (2006) 441
(Gamma ray emission probabilities and energies)
- J.H. HAMILTON,, E.L.WONG, H.C.GRIFFIN. World Sci.2008 (2008) 264
(X-ray and low energy gamma ray absolute emission probabilities)
- D.J. DEVRIES, H.C.GRIFFIN. Appl. Rad. Isotopes 66 (2008) 1999
(Uncertainty of X-ray and absolute emission probability)











1 Decay Scheme

Np-239 decays by beta minus emission to levels in Pu-239.

Le neptunium 239 se désintègre par émissions bêta moins vers le plutonium 239.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{239}\text{Np})$:	2,356	(3)	d
$T_{1/2}(^{239}\text{Pu})$:	24100	(11)	a
$Q^-(^{239}\text{Np})$:	722,5	(10)	keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,13}^-$	166,3 (5)	0,0026	1st forbidden	9,7
$\beta_{0,12}^-$	210,7 (5)	1,56 (16)	Allowed	7,3
$\beta_{0,11}^-$	217,3 (5)	0,0074	1st forbidden	9,7
$\beta_{0,10}^-$	230,3 (5)	0,02	1st forbidden	9,3
$\beta_{0,9}^-$	252,7 (5)	0,0027	1st forbidden unique	9,9
$\beta_{0,8}^-$	330,9 (5)	38,8 (9)	1st forbidden	6,3
$\beta_{0,7}^-$	335,1 (5)		2nd forbidden	
$\beta_{0,6}^-$	392,4 (5)	9,4 (14)	Allowed	7,4
$\beta_{0,5}^-$	437,0 (5)	43,0 (22)	Allowed	6,9
$\beta_{0,4}^-$	558,7 (5)		2nd forbidden	
$\beta_{0,3}^-$	646,8 (5)		Allowed	
$\beta_{0,2}^-$	665,2 (5)	0,4 (72)	Allowed	
$\beta_{0,1}^-$	714,6 (5)	6,5 (10)	Allowed	8,4
$\beta_{0,0}^-$	722,5 (5)		2nd forbidden unique	

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Pu})$	7,861 (2)	70 (8)	M1+0,3%E2			4220 (270)	5716 (400)
$\gamma_{3,2}(\text{Pu})$	18,430 (4)	5,5 (30)	[M1+E2]				
$\gamma_{6,5}(\text{Pu})$	44,663 (5)	11,3 (14)	M1+4%E2	64 (6)	16,3 (16)	86 (8)	
$\gamma_{2,1}(\text{Pu})$	49,415 (3)	18 (5)	M1+20%E2	92 (6)	24,8 (15)	126 (8)	
$\gamma_{2,0}(\text{Pu})$	57,273 (4)	27 (7)	E2	161 (3)	45,0 (9)	222 (5)	
$\gamma_{7,6}(\text{Pu})$	57,3	$\approx 0,2$	M1(+E2)				
$\gamma_{8,6}(\text{Pu})$	61,460 (2)	1,900 (32)	E1	0,354 (7)	0,0881 (18)	0,473 (10)	
$\gamma_{3,1}(\text{Pu})$	67,841 (7)	9,9 (30)	E2	71,3 (14)	20,0 (4)	98,3 (20)	
$\gamma_{4,3}(\text{Pu})$	88,06 (3)	0,078 (44)	M1+20%E2	9 (4)	2,4 (13)	12 (6)	
$\gamma_{7,5}(\text{Pu})$	101,96 (2)	0,12 (3)	E2	10,5 (2)	2,93 (6)	14,4 (3)	
$\gamma_{8,5}(\text{Pu})$	106,125 (2)	32,6 (9)	E1(+M2)	0,19 (3)	0,050 (8)	0,26 (3)	
$\gamma_{4,2}(\text{Pu})$	106,50 (3)	0,63 (10)	E2	8,55 (17)	2,39 (5)	11,8 (3)	
$\gamma_{12,7}(\text{Pu})$	124,4	0,15	E2	10,4 (2)	2,39 (5)	0,591 (12)	13,6 (3)
$\gamma_{6,4}(\text{Pu})$	166,39 (6)	0,12 (5)	M1(+20%E2)	4,92 (10)	0,987 (20)	0,240 (5)	6,23 (13)
$\gamma_{12,6}(\text{Pu})$	181,70 (3)	0,497 (14)	M1	3,76 (8)	0,768 (15)	0,187 (4)	4,78 (10)
$\gamma_{5,3}(\text{Pu})$	209,753 (2)	13,47 (24)	M1+2%E2	2,27 (5)	0,501 (10)	0,123 (25)	2,94 (6)
$\gamma_{12,5}(\text{Pu})$	226,38 (2)	0,91 (5)	M1+12%E2	2,04 (7)	0,411 (12)	0,100 (3)	2,58 (8)
$\gamma_{8,4}(\text{Pu})$	227,83	0,54 (11)	M1+1,7%E2	0,0597 (12)	0,0125 (3)	0,00303 (6)	0,0762 (15)
$\gamma_{5,2}(\text{Pu})$	228,183 (1)	38,6 (12)	M1+7,3%E2	1,89 (6)	0,396 (12)	0,097 (3)	2,41 (8)
$\gamma_{6,3}(\text{Pu})$	254,40 (3)	0,314 (10)	M1+2,5%E2	1,46 (3)	0,295 (6)	0,0718 (15)	1,85 (4)
$\gamma_{6,2}(\text{Pu})$	272,84 (3)	0,194 (8)	M1+2,6%E2	1,20 (3)	0,242 (5)	0,0589 (12)	1,52 (3)
$\gamma_{5,1}(\text{Pu})$	277,599 (1)	34,8 (9)	M1+5%E2	1,12 (5)	0,228 (6)	0,0556 (12)	1,42 (6)
$\gamma_{5,0}(\text{Pu})$	285,460 (2)	0,973 (13)	E2	0,0843 (17)	0,119 (3)	0,0327 (7)	0,248 (5)
$\gamma_{7,3}(\text{Pu})$	311,70 (2)	0,002 (2)	(M1+E2)				
$\gamma_{8,3}(\text{Pu})$	315,880 (3)	1,649 (10)	E1(+0,006%M2)	0,0295 (6)		0,00141 (4)	0,0372 (8)
$\gamma_{6,1}(\text{Pu})$	322,3 (2)	0,006	(E2)	0,0680 (14)		0,0203 (4)	0,170 (4)
$\gamma_{8,2}(\text{Pu})$	334,310 (3)	2,107 (21)	E1(+0,004%M2)	0,0261 (5)		0,0012 (3)	0,0329 (7)
$\gamma_{13,4}(\text{Pu})$	392,4 (5)	0,0016	(E1)				
$\gamma_{11,3}(\text{Pu})$	429,5 (5)	0,0039					
$\gamma_{10,2}(\text{Pu})$	434,7 (5)	0,013	E1(+M2)				
$\gamma_{11,2}(\text{Pu})$	447,6 (5)	0,00026					
$\gamma_{12,2}(\text{Pu})$	454,2 (5)	0,00082	(M1)				
$\gamma_{9,1}(\text{Pu})$	461,9 (5)	0,0016	(E1)				
$\gamma_{9,0}(\text{Pu})$	469,8 (5)	0,0011	(E1)				
$\gamma_{10,1}(\text{Pu})$	484,3 (5)	0,001	(E1)				
$\gamma_{10,0}(\text{Pu})$	492,3 (5)	0,006	(E1)				
$\gamma_{11,1}(\text{Pu})$	497,8 (5)	0,0032					
$\gamma_{13,2}(\text{Pu})$	498,7	0,001	(E1)				
$\gamma_{12,1}(\text{Pu})$	504,2 (5)	0,00078	(E2)				

3 Atomic Data

3.1 Pu

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,971 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,521 \quad (20) \\ n_{KL} &: 0,790 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	99,525	63,17
K α_1	103,734	100
K β_3	116,244	}
K β_1	117,228	}
K β_5''	117,918	}
K β_2	120,54	}
K β_4	120,969	}
KO _{2,3}	121,543	}
X _L		
L ℓ	12,125	
L α	14,083 – 14,279	
L η	16,334	
L β	16,499 – 19,331	
L γ	20,708 – 21,984	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	75,26 – 85,36	100
KLX	92,61 – 103,73	60,6
KXY	109,93 – 121,78	9,18
Auger L	6,1 – 23,0	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pu)	6,1 – 23,0	47,9 (26)
e _{AK}	(Pu)		1,36 (19)
	KLL	75,26 – 85,36	}
	KLX	92,61 – 103,73	}
	KXY	109,93 – 121,78	}

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{1,0}	M	(Pu) 1,928 - 4,086	51 (6)
ec _{12,7}	K	(Pu) 2,6	0,1
ec _{6,5}	L	(Pu) 21,559 - 26,606	8,3 (10)
ec _{2,1}	L	(Pu) 26,311 - 31,358	13,3 (3)
ec _{2,0}	L	(Pu) 34,169 - 39,216	20,8 (32)
ec _{8,6}	L	(Pu) 38,36 - 43,40	0,457 (11)
ec _{6,5}	M	(Pu) 38,730 - 40,888	2,12 (26)
ec _{2,1}	M	(Pu) 43,482 - 45,640	3,6 (9)
ec _{6,4}	K	(Pu) 44,60 (6)	0,08 (3)
ec _{3,1}	L	(Pu) 44,74 - 49,78	7,1 (21)
ec _{2,0}	M	(Pu) 51,340 - 53,498	5,8 (9)
ec _{8,6}	M	(Pu) 55,53 - 57,68	0,114 (3)
ec _{12,6}	K	(Pu) 59,91 (3)	0,323 (10)
ec _{3,1}	M	(Pu) 61,91 - 64,07	2,0 (6)
ec _{4,3}	L	(Pu) 64,96 - 70,00	0,054 (30)
ec _{7,5}	L	(Pu) 78,86 - 83,90	0,084 (21)
ec _{8,5}	L	(Pu) 83,02 - 88,07	4,9 (8)
ec _{4,2}	L	(Pu) 83,37 - 88,41	0,42 (7)
ec _{5,3}	T	(Pu) 87,962 - 209,746	10,05 (22)
ec _{5,3}	K	(Pu) 87,962 (2)	7,76 (18)
ec _{8,5}	M	(Pu) 100,19 - 102,35	1,30 (21)
ec _{4,2}	M	(Pu) 100,54 - 102,69	0,117 (19)
ec _{12,5}	K	(Pu) 104,59 (2)	0,52 (3)
ec _{5,2}	T	(Pu) 106,392 - 228,176	27,3 (10)
ec _{5,2}	K	(Pu) 106,392 (1)	21,4 (8)
ec _{6,3}	K	(Pu) 132,61 (3)	0,161 (6)
ec _{6,2}	K	(Pu) 151,05 (3)	0,092 (4)
ec _{5,1}	K	(Pu) 155,808 (1)	16,1 (7)
ec _{5,1}	T	(Pu) 155,808 - 277,592	20,4 (9)
ec _{12,6}	L	(Pu) 158,59 - 163,63	0,066 (2)
ec _{5,0}	K	(Pu) 163,669 (2)	0,066 (2)
ec _{5,3}	L	(Pu) 186,65 - 191,70	1,71 (4)
ec _{12,5}	L	(Pu) 203,28 - 208,32	0,105 (7)
ec _{5,3}	M	(Pu) 203,82 - 205,98	0,42 (9)
ec _{5,2}	L	(Pu) 205,08 - 210,13	4,48 (16)
ec _{8,2}	K	(Pu) 212,519 (3)	0,0532 (11)
ec _{5,2}	M	(Pu) 222,25 - 224,41	1,10 (4)
ec _{5,1}	L	(Pu) 254,50 - 259,54	3,28 (9)
ec _{5,0}	L	(Pu) 262,36 - 267,40	0,093 (3)
ec _{5,1}	M	(Pu) 271,67 - 273,82	0,801 (18)
$\beta_{0,13}^-$	max:	166,3 (5)	0,0026
$\beta_{0,13}^-$	avg:	44,2 (2)	
$\beta_{0,12}^-$	max:	210,7 (5)	1,56 (16)
$\beta_{0,12}^-$	avg:	56,8 (2)	
$\beta_{0,11}^-$	max:	217,3 (5)	0,0074
$\beta_{0,11}^-$	avg:	58,7 (2)	

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
$\beta_{0,10}^-$	max:	230,3	(5)
$\beta_{0,10}^-$	avg:	62,5	(2)
$\beta_{0,9}^-$	max:	252,7	(5)
$\beta_{0,9}^-$	avg:	74,7	(2)
$\beta_{0,8}^-$	max:	330,9	(5)
$\beta_{0,8}^-$	avg:	98,3	(2)
$\beta_{0,7}^-$	max:	335,1	(5)
$\beta_{0,7}^-$	avg:		
$\beta_{0,6}^-$	max:	392,4	(5)
$\beta_{0,6}^-$	avg:	111,5	(2)
$\beta_{0,5}^-$	max:	437,0	(5)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	125,6	(2)
$\beta_{0,4}^-$	max:	558,7	(5)
$\beta_{0,4}^-$	avg:		
$\beta_{0,3}^-$	max:	646,8	(5)
$\beta_{0,3}^-$	avg:		
$\beta_{0,2}^-$	max:	665,2	(5)
$\beta_{0,2}^-$	avg:		
$\beta_{0,1}^-$	max:	714,6	(5)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	218,3	(2)
$\beta_{0,0}^-$	max:	722,5	(5)
$\beta_{0,0}^-$	avg:		

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Pu)	12,125 — 21,984	51,3 (24)
XK α_2	(Pu)	99,525	13,5 (4) } K α
XK α_1	(Pu)	103,734	21,4 (6) }
XK β_3	(Pu)	116,244	}
XK β_1	(Pu)	117,228	} 7,84 (25) K' β_1
XK β_5''	(Pu)	117,918	}
XK β_2	(Pu)	120,54	}
XK β_4	(Pu)	120,969	} 2,72 (10) K' β_2
XKO _{2,3}	(Pu)	121,543	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pu})$	7,861 (2)	0,0122 (12)
$\gamma_{3,2}(\text{Pu})$	18,430 (4)	< 0,02
$\gamma_{6,5}(\text{Pu})$	44,663 (5)	0,13 (1)
$\gamma_{2,1}(\text{Pu})$	49,415 (3)	0,145 (35)
$\gamma_{2,0}(\text{Pu})$	57,273 (4)	0,12 (3)
$\gamma_{7,6}(\text{Pu})$	57,3	$\approx 0,012$
$\gamma_{8,6}(\text{Pu})$	61,460 (2)	1,29 (2)
$\gamma_{3,1}(\text{Pu})$	67,841 (7)	0,10 (3)
$\gamma_{4,3}(\text{Pu})$	88,06 (3)	0,006 (2)
$\gamma_{7,5}(\text{Pu})$	101,96 (2)	0,008 (2)
$\gamma_{8,5}(\text{Pu})$	106,125 (2)	25,9 (3)
$\gamma_{4,2}(\text{Pu})$	106,50 (3)	0,049 (8)
$\gamma_{12,7}(\text{Pu})$	124,4	0,01
$\gamma_{6,4}(\text{Pu})$	166,39 (6)	0,016 (7)
$\gamma_{12,6}(\text{Pu})$	181,70 (3)	0,086 (2)
$\gamma_{5,3}(\text{Pu})$	209,753 (2)	3,42 (3)
$\gamma_{12,5}(\text{Pu})$	226,38 (2)	0,255 (14)
$\gamma_{8,4}(\text{Pu})$	227,83	0,5 (1)
$\gamma_{5,2}(\text{Pu})$	228,183 (1)	11,32 (22)
$\gamma_{6,3}(\text{Pu})$	254,40 (3)	0,110 (3)
$\gamma_{6,2}(\text{Pu})$	272,84 (3)	0,077 (3)
$\gamma_{5,1}(\text{Pu})$	277,599 (1)	14,4 (1)
$\gamma_{5,0}(\text{Pu})$	285,460 (2)	0,78 (1)
$\gamma_{7,3}(\text{Pu})$	311,70 (2)	0,002 (2)
$\gamma_{8,3}(\text{Pu})$	315,880 (3)	1,59 (1)
$\gamma_{6,1}(\text{Pu})$	322,3 (2)	0,0052
$\gamma_{8,2}(\text{Pu})$	334,310 (3)	2,04 (2)
$\gamma_{13,4}(\text{Pu})$	392,4 (5)	0,0016
$\gamma_{11,3}(\text{Pu})$	429,5 (5)	0,0039
$\gamma_{10,2}(\text{Pu})$	434,7 (5)	0,013
$\gamma_{11,2}(\text{Pu})$	447,6 (5)	0,00026
$\gamma_{12,2}(\text{Pu})$	454,2 (5)	0,00082
$\gamma_{9,1}(\text{Pu})$	461,9 (5)	0,0016
$\gamma_{9,0}(\text{Pu})$	469,8 (5)	0,0011
$\gamma_{10,1}(\text{Pu})$	484,3 (5)	0,001
$\gamma_{10,0}(\text{Pu})$	492,3 (5)	0,006
$\gamma_{11,1}(\text{Pu})$	497,8 (5)	0,0032
$\gamma_{13,2}(\text{Pu})$	498,7	0,001
$\gamma_{12,1}(\text{Pu})$	504,2 (5)	0,00078


6 Main Production Modes


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{U} - 238(\text{n},\gamma)\text{U} - 239 \\ \text{Possible impurities : Pu} - 239, \text{Pu} - 240 \\ \text{U} - 239(\beta^-)\text{Np} - 239 \\ \text{Possible impurities : T}_{1/2} = 23,46 \text{ min} \end{array} \right.$$


7 References

- M.S. FREEDMAN, F. WAGNER, JR, D.W. ENGELKEMEIR. Phys. Rev. 88 (1952) 1155
(beta-transition probabilities)
- S.A. BARANOV, K.N. SHLYAGIN. At.Energ.USSR 1 (1956) 52
(beta-transition probabilities)
- L. WISH. Nucleonics 14 (1956) 105
(Half-life)
- R.D. CONNOR, I.L. FAIRWEATHER. Proc. Phys. Soc.(London) 74 (1959) 161
(beta-transition probabilities, half-life)
- G.T. EWAN, J.S. GEIGER, R.L. GRAHAM, D.R. MACKENZIE. Phys. Rev. 116 (1959) 950
(Gamma ray energies)
- D.COHEN, J.C.SULLIVAN, A.J.ZIELEN. J. Inorg. Nucl. Chem. 11 (1959) 159
(Half-life)
- B.P.K. MAIER. Z. Phys. 184 (1965) 143
(Gamma ray energies)
- M. QAIM. Nucl. Phys. 84 (1966) 411
(Half-life)
- C.B.BIGHAM. Can. J. Phys. 47 (1969) 1317
(Half-life)
- I. AHMAD, M. WAHLGREN. Nucl. Instrum. Methods 99 (1972) 333
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- F.T. PORTER. Phys. Rev. C5 (1972) 1738
(Gamma ray energies)
- L.S. KRANE. Phys. Rev. C5 (1972) 1671
(Gamma transition multipolarities)
- R.L. HEATH. ANCR-1000-2 (1974)
(Gamma ray energies and absolute emission probabilities)
- L.N. YUROVA, A.V.BUSHUEV, V.I. PETROV. At.Energ. 436 (1974) 51
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- D.I. STAROZHUKOV, Y.S. POPOV, P.A. PRIVALOVA. At.Energ. 42 (1977) 319
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- V.K. MOZHAEV, V.A. DULIN, Y.A. KAZANSKII. At.Energ. 47 (1979) 55
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- H.G. BORNER, G. BARREAU, W.F. DAVIDSON, P. JEUCH, T.VON EGIDY, J. ALMEIDA, D.H.WHITE. Nucl. Instrum. Methods 166 (1979) 251
(Gamma ray energies)
- I. AHMAD. Nucl. Instrum. Methods 193 (1982) 9
(Gamma ray energies and absolute emission probabilities)
- R. VANINBROUKX, G. BORTELS, B.DENECKE. Int. J. Appl. Radiat.Isotop 35 (1984) 1081
(Gamma ray emission probabilities absolute)
- Y. CHANG, Z. CHENG, C. YAN, G. SHI, D. QIAO. Radiat.Eff. 94 (1986) 97
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- A. ABZOUI, M.S. ANTONY, V.B. NDOCKO NDONGUE, D.OSTER. J. Radioanal. Nucl. Chem. 145 (1990) 361
(Half-life)
- E. SIMECKOVA, P. CIZEK, M. FINGER, J. JOHN, P. MALINSKY, V.N. PAVLOV. Hyperfine Interactions 59 (1990) 185
(Gamma transition multipolarities)
- Y. SHIOKAWA, M. YAGI. J. Radioanal. Nucl. Chem. 149 (1991) 51
(Gamma transition multipolarities, ICC)

- YU.S. POPOV, D.KH. SRUROV, I.B. MAKAROV, E.A. ERIN, G.A. TIMOFEEV. Radiokhimiya 33 (1991) 3
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- M.A. HAMMED, I.M. LOWLES, T.D. MAC MAHON. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 308
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- R.B. FIRESTONE. Table of Isotopes, Eighth Edition, Volume II (1996)
(LX-energies, gamma ray relative intensities, gamma ray multipolarities)
- S.A. WOODS, D.H. WOODS, M.J. WOODS, S.M. JEROME, M. BURKE, N.E. BOWLES, S.E.M. LUCAS, C. PATON WALSH. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 472
(Gamma ray absolute emission probabilities)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6, 11-1999, Braunschweig (1999)
(KX ray energies and relative emission probabilities)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q value)
- E. BROWNE. Nucl. Data Sheets 98 (2003) 665
(Gamma ray and level energies, gamma ray multipolarities, decay scheme)







1 Decay Scheme

Le Pu-239 se désintègre par émission alpha principalement vers le niveaux excités de 51,7; 13,0 et 0,07 keV de U-235.

Pu-239 mainly disintegrates to the 51,7; 13,0 and 0,07 keV excited levels of U-235.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{239}\text{Pu})$:	24100	(11)	a
$T_{1/2}(^{235}\text{U})$:	704	(1)	10^6 a
$Q^\alpha(^{239}\text{Pu})$:	5244,51	(21)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,53}$	4128,3 (3)	0,000000021 (5)	41
$\alpha_{0,52}$	4186,93 (25)	0,000000093 (9)	31
$\alpha_{0,51}$	4251,8 (3)	0,000000020 (3)	53
$\alpha_{0,50}$	4257,86 (27)	0,000000077 (7)	156
$\alpha_{0,49}$	4274,0 (3)	0,000000041 (4)	402
$\alpha_{0,48}$	4276,06 (21)	0,000000061 (15)	281
$\alpha_{0,47}$	4352,62 (26)	0,000000199 (12)	380
$\alpha_{0,46}$	4379,16 (28)	0,000000098 (13)	1280
$\alpha_{0,45}$	4399,2 (10)	$\sim 0,000000042$	~ 4360
$\alpha_{0,44}$	4400,65 (21)	0,000000228 (12)	825
$\alpha_{0,43}$	4423,26 (21)	0,000000030 (3)	960
$\alpha_{0,42}$	4438,79 (22)	0,000000084 (14)	4560
$\alpha_{0,41}$	4465,00 (21)	0,00000101 (11)	616
$\alpha_{0,40}$	4466,92 (28)	0,000000247 (19)	2610
$\alpha_{0,39}$	4475,0 (4)	0,0000103 (12)	73
$\alpha_{0,38}$	4475,24 (21)	0,000027 (3)	28
$\alpha_{0,37}$	4483,47 (22)	0,000000103 (17)	8500

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,36}$	4494,44 (26)	0,00000034 (4)	3140
$\alpha_{0,35}$	4524,26 (21)	0,00000213 (9)	859
$\alpha_{0,34}$	4540,75 (21)	0,0000114 (3)	216
$\alpha_{0,33}$	4543,49 (21)	0,00000707 (13)	366
$\alpha_{0,32}$	4573,52 (21)	< 0,000000034	> 130000
$\alpha_{0,31}$	4579,97 (21)	0,00000631 (11)	784
$\alpha_{0,30}$	4585,46 (21)	0,0000264 (6)	207
$\alpha_{0,29}$	4606,70 (22)	0,00000322 (21)	2460
$\alpha_{0,28}$	4611,34 (22)	0,00000284 (7)	3025
$\alpha_{0,27}$	4636,43 (22)	0,000012 (4)	1110
$\alpha_{0,26}$	4711,28 (21)	0,00086 (3)	55,8
$\alpha_{0,25}$	4734,59 (27)	0,0000033 (7)	22000
$\alpha_{0,24}$	4770,21 (21)	0,00056 (5)	230
$\alpha_{0,23}$	4798,79 (21)	0,0000400 (11)	5200
$\alpha_{0,22}$	4817,76 (21)	0,00570 (5)	49,6
$\alpha_{0,21}$	4829,73 (21)	0,00075 (11)	460
$\alpha_{0,20}$	4851,29 (21)	0,00125 (3)	390
$\alpha_{0,19}$	4877,44 (21)	0,000944 (17)	788
$\alpha_{0,18}$	4887,21 (22)	0,000017 (4)	51000
$\alpha_{0,17}$	4905,99 (22)	\approx 0,000022	\approx 53000
$\alpha_{0,16}$	4911,67 (21)	0,00354 (7)	363
$\alpha_{0,15}$	4949,84 (21)	0,0018 (5)	1300
$\alpha_{0,14}$	4953,37 (21)	0,0007 (3)	3500
$\alpha_{0,13}$	4995,38 (21)	0,0030 (16)	1590
$\alpha_{0,12}$	5019,09 (21)	0,0050 (7)	1380
$\alpha_{0,11}$	5047,39 (21)	0,007 (1)	1520
$\alpha_{0,10}$	5073,12 (21)	0,0034 (10)	4600
$\alpha_{0,8}$	5094,04 (21)	0,0182 (27)	1180
$\alpha_{0,7}$	5115,12 (21)	0,013 (4)	2270
$\alpha_{0,6}$	5141,48 (21)	0,0375 (12)	1160
$\alpha_{0,5}$	5162,77 (21)	0,052 (8)	1150
$\alpha_{0,4}$	5192,81 (21)	11,87 (3)	7,81
$\alpha_{0,3}$	5198,30 (21)	< 0,02	> 5019
$\alpha_{0,2}$	5231,47 (21)	17,14 (4)	9,47
$\alpha_{0,1}$	5244,43 (14)	70,79 (10)	2,762
$\alpha_{0,0}$	5244,51 (21)	\sim 0,03	\sim 6500

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{1,0} (U)	0,0765 (4)	100	E3				1 10 ¹⁰
γ _{2,1} (U)	12,975 (10)	20,7 (8)	M1+0,19(2)%E2		451 (13)	607 (17)	
γ _(-1,1) (U)	14,22 (3)	> 0,006					
γ _{5,4} (U)	30,04 (2)	0,0346 (14)	(M1)	118,0 (24)	28,7 (6)	157 (3)	
γ _{4,2} (U)	38,661 (2)	3,56 (21)	M1+22,2(16)%E2	249 (14)	67 (4)	339 (19)	
γ _(-1,2) (U)	40,41 (5)	> 0,0002					
γ _{10,7} (U)	41,93 (5)	0,0097 (5)	(M1)	44,2 (9)	10,71 (21)	58,6 (12)	
γ _{3,0} (U)	46,21 (5)	0,0389 (21)	M1+1,8(5)%E2	39,4 (19)	9,8 (5)	52,6 (27)	
γ _{11,8} (U)	46,68 (3)	0,0044 (13)	M1+9(5)%E2	63 (17)	17 (5)	86 (24)	
γ _{7,5} (U)	47,60 (3)	0,00259 (11)	(M1)	30,4 (6)	7,37 (15)	40,4 (8)	
γ _{4,1} (U)	51,624 (1)	8,38 (18)	E2	226 (5)	62,6 (13)	310 (6)	
γ _{12,10} (U)	54,039 (8)	0,00560 (14)	M1	21,0 (4)	5,08 (10)	27,8 (6)	
γ _{6,3} (U)	56,828 (3)	0,0382 (18)	M1+5,0(8)%E2	24,3 (11)	6,14 (30)	32,6 (15)	
γ _{14,12} (U)	65,708 (30)	0,00095 (29)	M1+4(6)%E2	14 (5)	3,6 (13)	19 (6)	
γ _{9,6} (U)	67,674 (12)	0,00283 (12)	M1+3,6(11)%E2	12,7 (4)	3,15 (9)	16,9 (5)	
γ _{5,2} (U)	68,696 (6)	0,029 (8)	E2	57,3 (11)	15,9 (3)	78,6 (16)	
γ _{8,5} (U)	68,73 (2)	0,0036 (17)	(M1+20%E2)	20	5,2	27	
γ _(-1,3) (U)	74,96 (10)	> 0,00004					
γ _{7,4} (U)	77,592 (14)	0,0068 (38)	M1(+20(32)%E2)	12 (7)	3,2 (21)	17 (10)	
γ _{13,9} (U)	78,43 (2)	0,0026 (15)	M1(+20(32)%E2)	12 (7)	3,1 (20)	16 (10)	
γ _{17,13} (U)	89,39 (6)	~0,000015	[M1]	4,82 (10)	1,167 (23)	6,40 (13)	
γ _{10,5} (U)	89,64 (3)	0,00040 (22)	(M1+E2)	11 (6)	2,8 (17)	14 (8)	
γ _{12,7} (U)	96,14 (3)	0,00064 (3)	[E2]	11,67 (23)	3,24 (7)	16,0 (3)	
γ _{15,11} (U)	97,6 (3)	0,0007 (5)	M1+20(19)%E2	5,2 (14)	1,3 (4)	7,0 (19)	
γ _{8,4} (U)	98,78 (2)	0,0204 (17)	E2	10,28 (21)	2,85 (6)	14,1 (3)	
γ _{6,0} (U)	103,06 (3)	0,00273 (9)	E2	8,44 (17)	2,34 (5)	11,58 (23)	
γ _{11,5} (U)	115,38 (5)	0,00362 (40)	E2	5,0 (1)	1,39 (3)	6,87 (14)	
γ _{7,2} (U)	116,26 (2)	0,0077 (15)	M1+24(36)%E2	8,4 (18)	2,9 (6)	0,74 (16)	12,2 (26)
γ _{10,4} (U)	119,70 (3)	0,00021 (9)	(M1+E2)	5 (5)	3,1 (11)	0,8 (3)	9 (4)
γ _{14,10} (U)	119,76 (2)	0,000063 (14)	[E2]	0,200 (4)	4,22 (8)	1,169 (23)	5,99 (12)
γ _{12,6} (U)	122,35 (12)	0,00000125 (17)	(E1)	0,238 (5)	0,0556 (11)	0,0135 (3)	0,312 (6)
γ _{37,29} (U)	123,228 (5)	0,000000021 (5)	(M1)	9,66 (19)	1,91 (4)	0,461 (9)	12,19 (24)
γ _{21,14} (U)	123,62 (5)	0,000310 (13)	[M1]	9,57 (19)	1,89 (4)	0,457 (9)	12,08 (24)
γ _{9,3} (U)	124,51 (3)	0,000413 (13)	E2	0,214 (4)	3,53 (7)	0,978 (20)	5,06 (10)
γ _{10,3} (U)	125,21 (10)	0,0000730 (21)	[E1]	0,227 (5)	0,0523 (10)	0,0128 (3)	0,296 (6)
γ _{7,0} (U)	129,296 (1)	0,00805 (6)	E1	0,211 (4)	0,0482 (10)	0,01173 (24)	0,275 (6)
γ _{19,12} (U)	141,657 (20)	0,000296 (11)	[M1]	6,52 (13)	1,28 (3)	0,309 (6)	8,22 (16)
γ _{12,5} (U)	143,35 (20)	0,000110 (46)	[M1+E2]	3,3 (30)	1,5 (3)	0,41 (11)	5,3 (26)
γ _{15,8} (U)	144,201 (3)	0,00106 (3)	E2	0,225 (5)	1,82 (4)	0,502 (10)	2,72 (5)
γ _{13,6} (U)	146,094 (6)	0,000432 (12)	E2	0,223 (4)	1,71 (3)	0,474 (10)	2,57 (5)
γ _{10,2} (U)	158,1 (3)	0,0000029 (3)	[E2]	0,211 (4)	1,200 (24)	0,333 (7)	1,86 (4)
γ _{18,11} (U)	160,19 (5)	0,0000172 (36)	[E2]	0,208 (4)	1,140 (23)	0,314 (6)	1,77 (4)
γ _{16,10} (U)	161,450 (15)	0,000814 (42)	(M1)	4,51 (9)	0,880 (18)	0,213 (4)	5,67 (11)
γ _{17,9} (U)	167,81 (5)	0,0000074 (20)	[E2]	0,198 (4)	0,925 (19)	0,256 (5)	1,47 (3)
γ _{10,0} (U)	171,393 (6)	0,0001255 (34)	[E1]	0,1103 (22)	0,0235 (5)	0,00570 (11)	0,141 (3)
γ _{42,28} (U)	172,560 (8)	~0,000000017	M1	3,73 (8)	0,728 (15)	0,176 (4)	4,70 (9)
γ _{12,4} (U)	173,70 (5)	0,0000071 (18)	[E2]	0,190 (4)	0,795 (16)	0,220 (4)	1,28 (3)
γ _{12,3} (U)	179,220 (12)	0,0000739 (22)	[E1]	0,0995 (20)	0,0210 (4)	0,00509 (10)	0,127 (3)
γ _(-1,4) (U)	184,55 (5)	0,000010 (3)	[M1]	3,08 (6)	0,601 (12)	0,146 (3)	3,87 (8)
γ _{14,6} (U)	188,23 (10)	0,0000123 (12)	[E1]	0,0889 (18)	0,0186 (4)	0,00450 (9)	0,1140 (23)
γ _{21,12} (U)	189,36 (1)	0,00027 (11)	[M1+E2]	1,5 (13)	0,553 (11)	0,143 (8)	2,3 (14)
γ _(-1,5) (U)	193,13 (12)	> 0,00009					
γ _{19,10} (U)	195,679 (8)	0,000456 (11)	M1	2,62 (5)	0,51 (1)	0,123 (3)	3,30 (7)
γ _(-1,6) (U)	196,87 (5)	>0,000004					
γ _{16,7} (U)	203,550 (5)	0,002224 (49)	M1	2,35 (5)	0,456 (9)	0,1103 (22)	2,95 (6)
γ _{21,11} (U)	218,0 (5)	> 0,000002					
γ _{12,0} (U)	225,42 (4)	0,0000161 (4)	[E1]	0,0589 (12)	0,01190 (24)	0,00288 (6)	0,0747 (15)

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{19,7} (U)	237,77 (10)	0,0000422 (18)	[M1]	1,52 (3)	0,295 (6)	0,0712 (14)	1,91 (4)
γ _{26,14} (U)	242,08 (3)	0,0000209 (14)	[M1]	1,45 (3)	0,280 (6)	0,0678 (14)	1,82 (4)
γ _{21,10} (U)	243,38 (3)	0,000053 (18)	[M1+E2]	0,8 (6)	0,23 (4)	0,059 (7)	1,1 (7)
γ _{14,3} (U)	244,92 (5)	0,0000054 (5)	[E1]	0,0485 (10)	0,00973 (19)	0,00235 (5)	0,0618 (12)
γ _{24,12} (U)	248,95 (5)	0,0000188 (16)	[M1]	1,34 (3)	0,259 (5)	0,0626 (14)	1,68 (3)
γ _{22,10} (U)	255,384 (15)	0,000204 (6)	[M1]	1,25 (3)	0,241 (5)	0,0583 (12)	1,57 (3)
γ _{20,7} (U)	263,95 (3)	0,0000629 (26)	M1	1,140 (23)	0,220 (4)	0,0532 (11)	1,43 (3)
γ _{30,20} (U)	265,7 (3)	0,0000017 (4)	[E1]	0,0408 (8)	0,00802 (16)	0,00194 (4)	0,0514 (10)
γ _{16,4} (U)	281,2 (2)	0,0000036 (12)	[M1+E2]	0,5 (4)	0,14 (4)	0,036 (8)	0,7 (5)
γ _{19,5} (U)	285,3 (2)	0,0000032 (12)	[M1+E2]	0,5 (4)	0,14 (4)	0,035 (8)	0,7 (5)
γ _{22,7} (U)	297,46 (3)	0,000100 (3)	[M1]	0,816 (16)	0,158 (3)	0,0381 (8)	1,025 (21)
γ _{24,10} (U)	302,87 (5)	0,0000097 (8)	[M1]	0,777 (16)	0,150 (3)	0,0362 (7)	0,976 (20)
γ _{26,12} (U)	307,85 (5)	0,0000101 (8)	[M1]	0,743 (15)	0,143 (3)	0,0346 (7)	0,933 (19)
γ _{21,6} (U)	311,78 (4)	0,0000266 (8)	[E1]	0,0287 (6)	0,00552 (11)	0,00133 (3)	0,0361 (7)
γ _{23,7} (U)	316,41 (3)	0,0000248 (10)	M1	0,689 (14)	0,133 (3)	0,0321 (6)	0,865 (17)
γ _{16,2} (U)	319,68 (10)	0,0000073 (19)	[M1+E2]	0,37 (30)	0,10 (3)	0,024 (7)	0,50 (35)
γ _{19,3} (U)	320,862 (20)	0,0000558 (12)	[E1]	0,0269 (5)	0,00517 (10)	0,00125 (3)	0,0337 (7)
γ _{24,8} (U)	323,84 (3)	0,0000960 (25)	M1	0,646 (13)	0,1246 (25)	0,0301 (6)	0,811 (16)
γ _{16,0} (U)	332,845 (5)	0,000503 (8)	E1	0,0250 (5)	0,00476 (10)	0,001150 (23)	0,0313 (6)
γ _{26,11} (U)	336,113 (12)	0,000192 (5)	M1	0,583 (12)	0,1130 (23)	0,0272 (5)	0,733 (15)
γ _{20,4} (U)	341,506 (10)	0,0001106 (24)	M1	0,559 (11)	0,1080 (22)	0,0260 (5)	0,701 (14)
γ _{24,7} (U)	345,00 (2)	< 0,000084	(M1)	0,543 (11)	0,1050 (21)	0,0253 (5)	0,682 (14)
γ _{22,5} (U)	345,013 (4)	0,000922 (15)	M1	0,543 (11)	0,1050 (21)	0,0253 (5)	0,682 (14)
γ _(-1,7) (U)	350,8 (3)	> 0,000002					
γ _{19,2} (U)	354,0 (5)	0,00000085 (33)	[E2]	0,0549 (11)	0,0445 (9)	0,01200 (24)	0,1150 (23)
γ _{26,10} (U)	361,89 (5)	0,0000187 (11)	[M1]	0,477 (10)	0,0918 (18)	0,0222 (4)	0,598 (12)
γ _{19,0} (U)	367,073 (25)	0,0000893 (21)	[E1]	0,0203 (4)	0,00382 (8)	0,000920 (18)	0,0254 (5)
γ _{21,3} (U)	368,554 (20)	0,0000899 (14)	[E1]	0,0202 (4)	0,00378 (8)	0,000910 (18)	0,0252 (5)
γ _{22,4} (U)	375,054 (3)	0,002376 (37)	M1	0,432 (9)	0,0832 (17)	0,0201 (4)	0,543 (11)
γ _{20,2} (U)	380,191 (6)	0,000460 (7)	M1	0,417 (8)	0,0801 (16)	0,0193 (4)	0,523 (10)
γ _{26,8} (U)	382,75 (5)	0,000387 (7)	M1	0,409 (8)	0,0787 (16)	0,0190 (4)	0,513 (10)
γ _{24,5} (U)	392,53 (3)	0,000179 (24)	M1	0,382 (8)	0,0731 (15)	0,0177 (4)	0,479 (10)
γ _{20,1} (U)	393,14 (3)	0,000619 (25)	M1	0,380 (8)	0,0731 (15)	0,0176 (4)	0,477 (10)
γ _{23,3} (U)	399,53 (6)	0,00000625 (27)	[E1]	0,0171 (3)	0,00317 (6)	0,000761 (15)	0,0213 (4)
γ _{25,6} (U)	406,8 (2)	0,0000030 (7)	[E1]	0,0164 (3)	0,00304 (6)	0,000731 (15)	0,0204 (4)
γ _{27,11} (U)	411,2 (3)	0,000010 (4)	[M1]	0,337 (7)	0,0646 (13)	0,0156 (3)	0,422 (8)
γ _{42,20} (U)	412,49 (6)	~0,000000018	[E1]	0,0160 (3)	0,00296 (6)	0,000709 (14)	0,0199 (4)
γ _{22,2} (U)	413,713 (5)	0,00207 (3)	M1	0,331 (7)	0,0636 (13)	0,0153 (3)	0,415 (8)
γ _{24,4} (U)	422,598 (19)	0,0001669 (30)	M1	0,313 (6)	0,0560 (11)	0,0145 (3)	0,392 (8)
γ _{22,1} (U)	426,68 (3)	0,0000256 (6)	[E2]	0,0387 (8)	0,0230 (5)	0,00610 (12)	0,0699 (14)
γ _{24,3} (U)	428,4 (3)	0,00000103 (10)	[E1]	0,0147 (3)	0,00270 (5)	0,000653 (13)	0,0184 (4)
γ _{26,6} (U)	430,08 (10)	0,00000437 (19)	[E1]	0,0147 (3)	0,00270 (5)	0,000648 (13)	0,0183 (4)
γ _{23,0} (U)	445,72 (3)	0,00000892 (26)	E1	0,0137 (3)	0,00250 (5)	0,000560 (11)	0,0170 (3)
γ _(-1,8) (U)	446,82 (20)	0,0000009 (1)					
γ _{26,5} (U)	451,481 (10)	0,000223 (25)	M1(+50%E2)	0,15 (11)	0,035 (16)	0,009 (4)	0,19 (13)
γ _{27,8} (U)	457,61 (5)	0,00000199 (4)	[M1]	0,252 (5)	0,0483 (10)	0,01170 (23)	0,316 (6)
γ _{24,2} (U)	461,25 (5)	0,00000242 (5)	[E2]	0,0334 (7)	0,0177 (4)	0,00467 (9)	0,0575 (12)
γ _{25,3} (U)	463,9 (3)	0,000000284 (30)	[E1]	0,0126 (3)	0,00230 (5)	0,000551 (11)	0,0157 (3)
γ _{24,0} (U)	473,9 (5)	0,000000061 (30)	[E1]	0,01210 (24)	0,00220 (4)	0,000526 (11)	0,0150 (3)
γ _{26,4} (U)	481,66 (12)	0,00000485 (11)	[E2]	0,0309 (6)	0,0154 (3)	0,00404 (8)	0,0517 (10)
γ _{26,3} (U)	487,06 (10)	0,000000269 (19)	[E1]	0,01150 (23)	0,00208 (4)	0,000497 (10)	0,0142 (3)
γ _{31,10} (U)	493,08 (5)	0,00000089 (3)	[E1]	0,01119 (22)	0,00202 (4)	0,000484 (10)	0,0139 (3)
γ _(-1,9) (U)	497,0 (5)	0,000000044 (25)					
γ _{27,5} (U)	526,4 (4)	0,000000059 (19)	[E2]	0,0262 (5)	0,011600 (23)	0,00303 (6)	0,0419 (8)
γ _(-1,10) (U)	538,8 (2)	0,000000031 (2)					
γ _{33,8} (U)	550,5 (2)	0,000000440 (25)	(E1)	0,00904 (18)	0,00161 (3)	0,000385 (8)	0,01120 (22)
γ _(-1,11) (U)	557,3 (5)	0,000000004 (2)					
γ _{36,10} (U)	579,4 (3)	0,000000091 (20)	[E2]	0,0220 (4)	0,00867 (17)	0,00224 (4)	0,0337 (7)
γ _{31,5} (U)	582,89 (10)	0,000000624 (26)	[E1]	0,00811 (16)	0,00144 (3)	0,000343 (7)	0,0100 (2)

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{29,4} (U)	586,3 (3)	0,000000155 (16)	[E1]	0,00802 (16)	0,00142 (3)	0,000339 (7)	0,0099 (2)
γ _{43,12} (U)	596,0 (5)	0,000000040 (12)	[E2]	0,0209 (4)	0,00797 (16)	0,00206 (4)	0,0317 (6)
γ _{33,6} (U)	597,99 (5)	0,00000179 (6)	[E2]	0,0208 (4)	0,00789 (16)	0,00204 (4)	0,0314 (6)
γ _{36,8} (U)	599,6 (2)	0,000000204 (25)	[E1]	0,00769 (15)	0,00136 (3)	0,000324 (6)	0,00948 (19)
γ _{40,10} (U)	606,9 (2)	0,000000136 (15)	M1(+E2)	0,09 (3)	0,019 (4)	0,0045 (9)	0,12 (3)
γ _(-1,12) (U)	608,9 (2)	0,00000012 (2)					
γ _{31,4} (U)	612,83 (3)	0,00000096 (5)	E1	0,00738 (15)	0,00130 (3)	0,000310 (6)	0,00910 (18)
γ _{35,6} (U)	617,1 (1)	0,00000154 (9)	[M1]	0,1130 (23)	0,0215 (4)	0,00518 (10)	0,142 (3)
γ _{31,3} (U)	618,28 (6)	0,00000212 (8)	(E2)	0,0196 (4)	0,00716 (14)	0,00184 (4)	0,0292 (6)
γ _{33,5} (U)	619,21 (6)	0,00000122 (8)	[E1]	0,00724 (14)	0,00127 (3)	0,000304 (6)	0,00892 (18)
γ _{29,2} (U)	624,78 (5)	0,000000464 (19)	[E1]	0,00712 (14)	0,001250 (25)	0,000299 (6)	0,00877 (18)
γ _{32,3} (U)	624,78 (3)	< 0,000000025	(M1)	0,1090 (22)	0,0208 (4)	0,00501 (10)	0,137 (3)
γ _{28,0} (U)	633,15 (6)	0,00000286 (7)	M1(+E2)	0,097 (8)	0,0187 (13)	0,0045 (3)	0,122 (11)
γ _{29,1} (U)	637,73 (5)	0,00000065 (6)	[E1]	0,00684 (14)	0,001200 (24)	0,000287 (6)	0,00844 (17)
γ _{29,0} (U)	637,80 (5)	0,00000197 (20)	E2	0,0185 (4)	0,00655 (13)	0,00167 (3)	0,0273 (5)
γ _{38,7} (U)	639,99 (10)	0,00000869 (21)	[E2]	0,0184 (4)	0,00648 (13)	0,00167 (3)	0,0271 (5)
γ _{30,2} (U)	645,94 (4)	0,0000150 (3)	E1	0,00669 (13)	0,001170 (24)	0,000280 (6)	0,00824 (16)
γ _{33,4} (U)	649,32 (6)	0,00000073 (5)	[E1]	0,00662 (13)	0,001160 (23)	0,000277 (6)	0,00816 (16)
γ _(-1,13) (U)	650,53 (6)	0,00000027 (4)					
γ _{34,4} (U)	652,05 (2)	0,00000668 (20)	E1	0,00657 (13)	0,001150 (23)	0,000274 (5)	0,00809 (16)
γ _{33,3} (U)	654,88 (8)	0,00000233 (5)	(E2)	0,0177 (4)	0,00607 (12)	0,00156 (3)	0,0258 (5)
γ _{30,1} (U)	658,86 (6)	0,00000967 (26)	E1	0,00645 (13)	0,001130 (23)	0,000269 (5)	0,00794 (16)
γ _{31,0} (U)	664,58 (5)	0,000001712 (41)	E2	0,0172 (4)	0,00583 (12)	0,00149 (3)	0,0251 (5)
γ _{36,5} (U)	668,2 (5)	0,000000040 (12)	[E1]	0,00628 (13)	0,001100 (22)	0,000262 (5)	0,00773 (15)
γ _{43,8} (U)	670,8 (5)	≤ 0,000000009 (3)					
γ _{32,0} (U)	670,99 (4)	≤ 0,000000009 (3)	[M1+E2]	0,05 (3)	0,0033 (17)	0,0025 (12)	0,06 (4)
γ _{35,3} (U)	674,043 (32)	0,000000556 (22)		0,0893 (18)	0,0169 (3)	0,00408 (8)	0,1120 (22)
γ _{40,5} (U)	674,4 (5)	0,000000111 (11)	(M1)	0,0892 (18)	0,0169 (3)	0,00408 (8)	0,1120 (22)
γ _(-1,14) (U)	685,97 (11)	0,00000127 (6)	E1	0,00599 (12)	0,001040 (21)	0,000248 (5)	0,00736 (15)
γ _(-1,15) (U)	688,1 (3)	0,000000114 (11)					
γ _{34,2} (U)	690,81 (8)	0,00000059 (5)	E1	0,00591 (12)	0,001030 (21)	0,000245 (5)	0,00727 (15)
γ _(-1,16) (U)	693,2 (5)	0,000000033 (13)					
γ _{46,10} (U)	693,81 (1)	0,000000019 (7)	(E2)	0,0159 (3)	0,00517 (10)	0,00132 (3)	0,0229 (5)
γ _{41,5} (U)	697,8 (5)	0,000000076 (15)					
γ _(-1,17) (U)	699,6 (5)	0,00000008 (2)					
γ _{33,0} (U)	701,1 (2)	0,000000555 (29)	[M1+E2]	0,05 (3)	0,010 (5)	0,0025 (12)	0,06 (4)
γ _{34,1} (U)	703,68 (5)	0,00000413 (13)	E1	0,00571 (12)	0,000993 (20)	0,000237 (5)	0,00702 (14)
γ _(-1,18) (U)	712,96 (5)	0,000000052 (6)					
γ _{44,7} (U)	714,71 (14)	0,000000081 (8)	E2	0,0151 (3)	0,00477 (10)	0,001225 (25)	0,0215 (4)
γ _{39,4} (U)	718,0 (5)	0,00000278 (6)	E1	0,00551 (11)	0,000960 (19)	0,000227 (5)	0,00677 (14)
γ _{35,0} (U)	720,3 (5)	0,000000029 (5)					
γ _{47,10} (U)	720,56 (3)	0,000000020 (2)					
γ _{41,4} (U)	727,9 (2)	0,000000136 (8)	M1	0,0728 (15)	0,0138 (3)	0,00332 (7)	0,0911 (18)
γ _{46,7} (U)	736,5 (5)	0,000000031 (9)	M1+59(8)%E2	0,0374 (7)	0,00807 (16)	0,00198 (4)	0,0481 (10)
γ _(-1,19) (U)	742,7 (5)	0,000000038 (11)					
γ _{37,2} (U)	747,4 (5)	0,000000082 (16)	E1	0,00512 (10)	0,000880 (18)	0,000211 (4)	0,00629 (13)
γ _{38,2} (U)	756,23 (6)	0,00000029 (5)	[M1+E2]	0,04 (3)	0,008 (4)	0,002 (1)	0,05 (3)
γ _{39,2} (U)	756,4 (4)	0,00000069 (19)	[E1]	0,00501 (10)	0,000865 (17)	0,000206 (4)	0,00615 (12)
γ _{47,7} (U)	762,6 (2)	~0,00000001					
γ _{45,5} (U)	763,60 (15)	> 0,000000042	E0(+M1)				>0,9
γ _{41,2} (U)	766,47 (3)	0,000000065 (11)	E0+M1				4,0 (4)
γ _{51,12} (U)	767,29 (4)	0,000000014 (3)					
γ _{38,1} (U)	769,15 (8)	0,0000153 (32)	M1+E0				2,0 (2)
γ _{39,1} (U)	769,4 (5)	0,0000068 (12)	E1	0,00486 (10)	0,000837 (17)	0,000199 (4)	0,00596 (12)
γ _{43,4} (U)	769,54 (4)	0,00000008 (2)	E0				
γ _(-1,20) (U)	777,1 (3)	0,000000028 (7)					
γ _{41,1} (U)	779,43 (3)	0,000000147 (10)	M1	0,0607 (12)	0,01148 (23)	0,00276 (6)	0,0759 (15)
γ _(-1,21) (U)	786,9 (2)	0,000000089 (9)	E2	0,0128 (3)	0,00370 (7)	0,000930 (19)	0,0177 (4)
γ _(-1,22) (U)	788,5 (3)	0,000000035 (7)					

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{42,2} (U)	792,68 (6)	0,000000020 (4)	(E1)	0,00461 (9)	0,000790 (16)	0,000188 (4)	0,00565 (11)
γ _(-1,23) (U)	796,9 (3)	0,000000015 (3)					
γ _(-1,24) (U)	803,2 (2)	0,000000064 (5)					
γ _{42,1} (U)	805,65 (6)	0,000000029 (4)	E2	0,01220 (24)	0,00348 (7)	0,000880 (18)	0,0169 (3)
γ _{43,2} (U)	808,21 (4)	0,000000130 (6)	M1	0,0552 (11)	0,01040 (21)	0,00251 (5)	0,0690 (14)
γ _{46,4} (U)	813,7 (2)	0,000000048 (5)	M1	0,0542 (11)	0,01020 (21)	0,00246 (5)	0,0677 (14)
γ _{50,9} (U)	816,0 (2)	0,000000026 (4)	[M1+E2]	0,033 (21)	0,007 (3)	0,0016 (8)	0,042 (25)
γ _{43,0} (U)	821,25 (4)	0,000000050 (11)	E1+M2				
γ _{51,10} (U)	821,3 (2)	~0,000000006					
γ _(-1,25) (U)	826,8 (3)	0,000000018 (6)					
γ _(-1,26) (U)	828,9 (2)	0,000000014 (1)					
γ _{52,12} (U)	832,2 (2)	0,000000030 (4)					
γ _(-1,27) (U)	837,3 (2)	0,000000020 (4)					
γ _{47,4} (U)	840,4 (2)	0,000000056 (6)	M1(+E0)				0,14 (2)
γ _{44,1} (U)	843,78 (1)	0,000000147 (9)	M1(+E0)				0,09 (1)
γ _{47,2} (U)	879,2 (3)	0,000000037 (4)	[M1+E2]	0,027 (17)	0,006 (3)	0,0014 (7)	0,035 (20)
γ _{47,1} (U)	891,0 (3)	0,000000076 (8)	[E2]	0,0102 (2)	0,00270 (5)	0,000677 (14)	0,0139 (3)
γ _(-1,28) (U)	895,4 (3)	0,000000008 (3)					
γ _(-1,29) (U)	898,1 (3)	0,000000018 (4)					
γ _(-1,30) (U)	905,5 (3)	0,000000008 (3)					
γ _(-1,31) (U)	911,7 (3)	0,000000014 (3)					
γ _{49,4} (U)	918,7 (3)	0,000000009 (3)					
γ _(-1,32) (U)	931,9 (3)	0,000000013 (4)					
γ _{50,3} (U)	940,3 (3)	0,000000051 (5)	[E2]	0,00932 (19)	0,00237 (5)	0,000591 (12)	0,01250 (25)
γ _{48,2} (U)	955,41 (2)	0,000000032 (3)	M1+27(13)%E2	0,029 (3)	0,0055 (6)	0,00133 (13)	0,036 (4)
γ _{49,2} (U)	957,6 (3)	0,000000032 (3)					
γ _{48,1} (U)	968,37 (2)	0,000000029 (5)	M1+27(20)%E2	0,0028 (15)	0,0053 (29)	0,0013 (7)	0,035 (19)
γ _{51,2} (U)	979,7 (3)	0,000000029 (5)	[M1+E2]	0,021 (12)	0,0042 (20)	0,0010 (5)	0,026 (15)
γ _(-1,33) (U)	982,7 (3)	0,000000011 (3)					
γ _{53,7} (U)	986,90 (4)	0,000000021 (5)	E1	0,00313 (6)	0,000529 (11)	0,0001260 (25)	0,00383 (8)
γ _{51,1} (U)	992,64 (3)	0,000000027 (4)					
γ _{52,4} (U)	1005,7 (3)	0,000000018 (3)					
γ _(-1,34) (U)	1009,4 (3)	0,000000014 (3)					
γ _{52,0} (U)	1057,3 (2)	0,000000045 (7)					

3 Atomic Data

3.1 U

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,970 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,500 \quad (19) \\ n_{KL} &: 0,794 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	71,78 – 80,95	100
KLX	88,15 – 98,34	59,6
KXY	104,42 – 115,40	8,88
Auger L	5,9 – 21,6	

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,53}$	4059,1 (3)	0,000000021 (5)
$\alpha_{0,52}$	4116,78 (25)	0,000000093 (9)
$\alpha_{0,51}$	4180,6 (3)	0,000000020 (3)
$\alpha_{0,50}$	4186,53 (27)	0,000000077 (7)
$\alpha_{0,49}$	4202,4 (3)	0,000000041 (4)
$\alpha_{0,48}$	4204,42 (21)	0,000000061 (15)
$\alpha_{0,47}$	4279,70 (26)	0,000000199 (12)
$\alpha_{0,46}$	4305,79 (28)	0,000000098 (13)
$\alpha_{0,45}$	4325,5 (10)	\sim 0,000000042
$\alpha_{0,44}$	4326,92 (21)	0,000000228 (12)
$\alpha_{0,43}$	4349,15 (21)	0,000000030 (3)
$\alpha_{0,42}$	4364,42 (22)	0,000000084 (14)
$\alpha_{0,41}$	4390,20 (21)	0,000000101 (11)
$\alpha_{0,40}$	4392,08 (28)	0,000000247 (19)
$\alpha_{0,39}$	4400,0 (4)	0,0000103 (12)
$\alpha_{0,38}$	4400,26 (21)	0,000027 (3)
$\alpha_{0,37}$	4408,36 (22)	0,000000103 (17)
$\alpha_{0,36}$	4419,14 (26)	0,000000034 (4)
$\alpha_{0,35}$	4448,46 (21)	0,000000213 (9)
$\alpha_{0,34}$	4464,68 (21)	0,00000114 (3)
$\alpha_{0,33}$	4467,37 (21)	0,00000707 (13)
$\alpha_{0,32}$	4496,90 (21)	< 0,000000034
$\alpha_{0,31}$	4503,24 (21)	0,00000631 (11)
$\alpha_{0,30}$	4508,72 (21)	0,0000264 (6)
$\alpha_{0,29}$	4529,52 (22)	0,00000322 (21)
$\alpha_{0,28}$	4534,08 (22)	0,00000284 (7)
$\alpha_{0,27}$	4558,75 (22)	0,000012 (4)
$\alpha_{0,26}$	4632,35 (21)	0,00086 (3)
$\alpha_{0,25}$	4655,27 (27)	0,0000033 (7)
$\alpha_{0,24}$	4690,29 (21)	0,00056 (5)
$\alpha_{0,23}$	4718,39 (21)	0,0000400 (11)
$\alpha_{0,22}$	4737,05 (21)	0,00570 (5)
$\alpha_{0,21}$	4748,81 (21)	0,00075 (11)
$\alpha_{0,20}$	4770,01 (21)	0,00125 (3)
$\alpha_{0,19}$	4795,73 (21)	0,000944 (17)
$\alpha_{0,18}$	4805,33 (22)	0,000017 (4)
$\alpha_{0,17}$	4823,80 (22)	\approx 0,000022
$\alpha_{0,16}$	4829,38 (21)	0,00354 (7)
$\alpha_{0,15}$	4866,91 (21)	0,0018 (5)
$\alpha_{0,14}$	4870,38 (21)	0,0007 (3)
$\alpha_{0,13}$	4911,69 (21)	0,0030 (16)
$\alpha_{0,12}$	4935,00 (21)	0,0050 (7)
$\alpha_{0,11}$	4962,83 (21)	0,007 (1)
$\alpha_{0,10}$	4988,13 (21)	0,0034 (10)
$\alpha_{0,8}$	5008,70 (21)	0,0182 (27)

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,7}$	5029,51 (21)	0,013 (4)
$\alpha_{0,6}$	5055,34 (21)	0,0375 (12)
$\alpha_{0,5}$	5076,28 (21)	0,052 (8)
$\alpha_{0,4}$	5105,81 (21)	11,87 (3)
$\alpha_{0,3}$	5111,21 (21)	< 0,02
$\alpha_{0,2}$	5143,82 (21)	17,14 (4)
$\alpha_{0,1}$	5156,59 (14)	70,79 (10)
$\alpha_{0,0}$	5156,65 (21)	$\sim 0,03$

5 Electron Emissions

		Energy keV		Electrons per 100 disint.
eAL	(U)	5,9	- 21,6	4,66 (19)
eAK	(U)			0,00045 (6)
	KLL	71,78	- 80,95	}
	KLX	88,15	- 98,34	}
	KXY	104,42	- 115,40	}
ec _{7,2} K	(U)	0,66	(2)	0,0049 (11)
ec _{10,4} K	(U)	4,10	(3)	0,00011 (11)
ec _{2,1} M	(U)	7,427	- 9,425	15,4 (6)
ec _{21,14} K	(U)	8,02	(5)	0,000227 (10)
ec _{5,4} L	(U)	8,28	- 12,87	0,0259 (11)
ec _{7,0} K	(U)	13,694	(1)	0,00133 (3)
ec _{4,2} L	(U)	16,903	- 21,493	2,61 (16)
ec _{10,7} L	(U)	20,17	- 24,76	0,0072 (4)
ec _{3,0} L	(U)	24,45	- 29,04	0,0286 (16)
ec _{5,4} M	(U)	24,49	- 26,49	0,0063 (3)
ec _{11,8} L	(U)	24,92	- 29,51	0,0032 (9)
ec _{7,5} L	(U)	25,84	- 30,43	0,00190 (9)
ec _{19,12} K	(U)	26,055	(20)	0,000209 (8)
ec _{4,1} L	(U)	29,866	- 34,456	6,09 (15)
ec _{12,10} L	(U)	32,281	- 36,871	0,00408 (10)
ec _{4,2} M	(U)	33,113	- 35,111	0,70 (4)
ec _{6,3} L	(U)	35,07	- 39,66	0,0276 (13)
ec _{10,7} M	(U)	36,38	- 38,38	0,00175 (9)
ec _{3,0} M	(U)	40,66	- 42,66	0,0071 (4)
ec _{11,8} M	(U)	41,13	- 43,13	0,00085 (25)
ec _{7,5} M	(U)	42,05	- 44,05	0,00046 (2)
ec _{14,12} L	(U)	43,95	- 48,54	0,00066 (24)

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
ec _{16,10} K	(U)	45,848 (15)	0,00055 (3)
ec _{9,6} L	(U)	45,916 - 50,506	0,00201 (9)
ec _{4,1} M	(U)	46,076 - 48,074	1,68 (4)
ec _{5,2} L	(U)	46,938 - 51,528	0,021 (6)
ec _{8,5} L	(U)	46,97 - 51,56	0,0026 (12)
ec _{12,10} M	(U)	48,491 - 50,489	0,000987 (24)
ec _{6,3} M	(U)	51,280 - 53,278	0,0070 (4)
ec _{7,4} L	(U)	55,834 - 60,424	0,005 (3)
ec _{13,9} L	(U)	56,664 - 61,254	0,0018 (11)
ec _{14,12} M	(U)	60,160 - 62,158	0,00017 (6)
ec _{9,6} M	(U)	62,126 - 64,124	0,000498 (21)
ec _{5,2} M	(U)	63,148 - 65,146	0,0057 (16)
ec _{8,5} M	(U)	63,18 - 65,18	0,0007 (3)
ec _{10,5} L	(U)	67,88 - 72,47	0,00030 (16)
ec _{7,4} M	(U)	72,050 - 74,048	0,0012 (8)
ec _{13,9} M	(U)	72,868 - 74,866	0,0005 (3)
ec _{12,7} L	(U)	74,38 - 78,97	0,00044 (2)
ec _{15,11} L	(U)	75,8 - 80,4	0,0005 (3)
ec _{8,4} L	(U)	77,02 - 81,61	0,0139 (12)
ec _{6,0} L	(U)	81,30 - 85,89	0,00183 (6)
ec _{16,7} K	(U)	87,948 (5)	0,00133 (3)
ec _{12,7} M	(U)	90,59 - 92,59	0,000123 (7)
ec _{15,11} M	(U)	92,1 - 94,1	0,00012 (8)
ec _{8,4} M	(U)	93,23 - 95,23	0,0039 (3)
ec _{11,5} L	(U)	93,62 - 98,21	0,0023 (3)
ec _{7,2} L	(U)	94,50 - 99,09	0,0017 (4)
ec _{6,0} M	(U)	97,51 - 99,51	0,000508 (18)
ec _{7,0} L	(U)	107,538 - 112,128	0,000304 (7)
ec _{11,5} M	(U)	109,83 - 111,83	0,00064 (7)
ec _{7,2} M	(U)	110,71 - 112,71	0,00043 (9)
ec _{15,8} L	(U)	122,443 - 127,033	0,000519 (16)
ec _{15,8} M	(U)	138,653 - 140,651	0,000143 (5)
ec _{16,10} L	(U)	139,692 - 144,282	0,000107 (6)
ec _{16,7} L	(U)	181,79 - 186,38	0,000257 (7)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(U)	11,619 — 20,714	4,66 (5)	
XK α_2	(U)	94,666	0,00418 (4)	{ K α
XK α_1	(U)	98,44	0,00661 (9)	}
XK β_3	(U)	110,421	}	
XK β_1	(U)	111,298	0,00239 (3)	K' β_1
XK β_5''	(U)	111,964	}	
XK β_2	(U)	114,407	}	
XK β_4	(U)	115,012	0,00131 (6)	K' β_2
XKO _{2,3}	(U)	115,377	}	
XKO _{O,P}	(U)	115,42	0,01447 (14)	

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{U})$	0,0765 (4)	~0,00000001
$\gamma_{2,1}(\text{U})$	12,975 (10)	0,0341 (9)
$\gamma_{(-1,1)}(\text{U})$	14,22 (3)	0,0055 (4)
$\gamma_{5,4}(\text{U})$	30,04 (2)	0,000219 (8)
$\gamma_{4,2}(\text{U})$	38,661 (2)	0,01047 (21)
$\gamma_{(-1,2)}(\text{U})$	40,41 (5)	0,000163 (16)
$\gamma_{10,7}(\text{U})$	41,93 (5)	0,000163 (8)
$\gamma_{3,0}(\text{U})$	46,21 (5)	0,000726 (13)
$\gamma_{11,8}(\text{U})$	46,68 (3)	0,000050 (6)
$\gamma_{7,5}(\text{U})$	47,60 (3)	0,0000625 (25)
$\gamma_{4,1}(\text{U})$	51,624 (1)	0,02694 (26)
$\gamma_{12,10}(\text{U})$	54,039 (8)	0,0001943 (28)
$\gamma_{6,3}(\text{U})$	56,828 (3)	0,001136 (15)
$\gamma_{14,12}(\text{U})$	65,708 (30)	0,0000473 (25)
$\gamma_{9,6}(\text{U})$	67,674 (12)	0,000158 (5)
$\gamma_{5,2}(\text{U})$	68,696 (6)	0,00036 (10)
$\gamma_{8,5}(\text{U})$	68,73 (2)	0,00013 (6)
$\gamma_{(-1,3)}(\text{U})$	74,96 (10)	0,000038 (6)
$\gamma_{7,4}(\text{U})$	77,592 (14)	0,000380 (6)
$\gamma_{13,9}(\text{U})$	78,43 (2)	0,0001533 (28)
$\gamma_{17,13}(\text{U})$	89,39 (6)	~0,000002
$\gamma_{10,5}(\text{U})$	89,64 (3)	0,000027 (2)
$\gamma_{12,7}(\text{U})$	96,14 (3)	0,0000379 (19)
$\gamma_{15,11}(\text{U})$	97,6 (3)	0,00009 (6)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{8,4}(\text{U})$	98,78 (2)	0,00135 (11)
$\gamma_{6,0}(\text{U})$	103,06 (3)	0,000217 (6)
$\gamma_{11,5}(\text{U})$	115,38 (5)	0,00046 (5)
$\gamma_{7,2}(\text{U})$	116,26 (2)	0,000581 (19)
$\gamma_{10,4}(\text{U})$	119,70 (3)	0,000021 (3)
$\gamma_{14,10}(\text{U})$	119,76 (2)	0,000009 (2)
$\gamma_{12,6}(\text{U})$	122,35 (12)	0,00000095 (13)
$\gamma_{37,29}(\text{U})$	123,228 (5)	0,0000000016 (4)
$\gamma_{21,14}(\text{U})$	123,62 (5)	0,0000237 (9)
$\gamma_{9,3}(\text{U})$	124,51 (3)	0,0000681 (19)
$\gamma_{10,3}(\text{U})$	125,21 (10)	0,0000563 (16)
$\gamma_{7,0}(\text{U})$	129,296 (1)	0,00631 (4)
$\gamma_{19,12}(\text{U})$	141,657 (20)	0,0000321 (10)
$\gamma_{12,5}(\text{U})$	143,35 (20)	0,0000174 (8)
$\gamma_{15,8}(\text{U})$	144,201 (3)	0,000285 (7)
$\gamma_{13,6}(\text{U})$	146,094 (6)	0,000121 (3)
$\gamma_{10,2}(\text{U})$	158,1 (3)	0,00000101 (10)
$\gamma_{18,11}(\text{U})$	160,19 (5)	0,0000062 (13)
$\gamma_{16,10}(\text{U})$	161,450 (15)	0,000122 (6)
$\gamma_{17,9}(\text{U})$	167,81 (5)	0,0000030 (8)
$\gamma_{10,0}(\text{U})$	171,393 (6)	0,000110 (3)
$\gamma_{42,28}(\text{U})$	172,560 (8)	0,000000003
$\gamma_{12,4}(\text{U})$	173,70 (5)	0,0000031 (8)
$\gamma_{12,3}(\text{U})$	179,220 (12)	0,0000656 (19)
$\gamma_{(-1,4)}(\text{U})$	184,55 (5)	0,0000021 (6)
$\gamma_{14,6}(\text{U})$	188,23 (10)	0,0000110 (11)
$\gamma_{21,12}(\text{U})$	189,36 (1)	0,0000820 (14)
$\gamma_{(-1,5)}(\text{U})$	193,13 (12)	0,0000090 (9)
$\gamma_{19,10}(\text{U})$	195,679 (8)	0,000106 (2)
$\gamma_{(-1,6)}(\text{U})$	196,87 (5)	0,0000037 (4)
$\gamma_{16,7}(\text{U})$	203,550 (5)	0,000563 (9)
$\gamma_{21,11}(\text{U})$	218,0 (5)	0,0000012 (10)
$\gamma_{12,0}(\text{U})$	225,42 (4)	0,0000150 (4)
$\gamma_{19,7}(\text{U})$	237,77 (10)	0,0000145 (6)
$\gamma_{26,14}(\text{U})$	242,08 (3)	0,0000074 (5)
$\gamma_{21,10}(\text{U})$	243,38 (3)	0,0000254 (7)
$\gamma_{14,3}(\text{U})$	244,92 (5)	0,0000051 (5)
$\gamma_{24,12}(\text{U})$	248,95 (5)	0,0000070 (6)
$\gamma_{22,10}(\text{U})$	255,384 (15)	0,0000795 (20)
$\gamma_{20,7}(\text{U})$	263,95 (3)	0,0000259 (10)
$\gamma_{30,20}(\text{U})$	265,7 (3)	0,0000016 (4)
$\gamma_{16,4}(\text{U})$	281,2 (2)	0,0000021 (3)
$\gamma_{19,5}(\text{U})$	285,3 (2)	0,0000019 (4)
$\gamma_{22,7}(\text{U})$	297,46 (3)	0,0000492 (13)
$\gamma_{24,10}(\text{U})$	302,87 (5)	0,0000049 (4)
$\gamma_{26,12}(\text{U})$	307,85 (5)	0,0000052 (4)
$\gamma_{21,6}(\text{U})$	311,78 (4)	0,0000257 (8)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{23,7}(\text{U})$	316,41 (3)	0,0000133 (5)
$\gamma_{16,2}(\text{U})$	319,68 (10)	0,0000049 (5)
$\gamma_{19,3}(\text{U})$	320,862 (20)	0,0000540 (12)
$\gamma_{24,8}(\text{U})$	323,84 (3)	0,0000530 (13)
$\gamma_{16,0}(\text{U})$	332,845 (5)	0,000488 (8)
$\gamma_{26,11}(\text{U})$	336,113 (12)	0,0001111 (26)
$\gamma_{20,4}(\text{U})$	341,506 (10)	0,0000650 (13)
$\gamma_{24,7}(\text{U})$	345,00 (2)	< 0,00005
$\gamma_{22,5}(\text{U})$	345,013 (4)	0,000548 (8)
$\gamma_{(-1,7)}(\text{U})$	350,8 (3)	0,0000018 (4)
$\gamma_{19,2}(\text{U})$	354,0 (5)	0,00000076 (30)
$\gamma_{26,10}(\text{U})$	361,89 (5)	0,0000117 (7)
$\gamma_{19,0}(\text{U})$	367,073 (25)	0,0000871 (20)
$\gamma_{21,3}(\text{U})$	368,554 (20)	0,0000877 (14)
$\gamma_{22,4}(\text{U})$	375,054 (3)	0,001540 (21)
$\gamma_{20,2}(\text{U})$	380,191 (6)	0,000302 (4)
$\gamma_{26,8}(\text{U})$	382,75 (5)	0,000256 (4)
$\gamma_{24,5}(\text{U})$	392,53 (3)	0,000121 (16)
$\gamma_{20,1}(\text{U})$	393,14 (3)	0,000419 (17)
$\gamma_{23,3}(\text{U})$	399,53 (6)	0,00000612 (26)
$\gamma_{25,6}(\text{U})$	406,8 (2)	0,0000029 (7)
$\gamma_{27,11}(\text{U})$	411,2 (3)	0,0000069 (30)
$\gamma_{42,20}(\text{U})$	412,49 (6)	~0,000000018
$\gamma_{22,2}(\text{U})$	413,713 (5)	0,001464 (21)
$\gamma_{24,4}(\text{U})$	422,598 (19)	0,0001199 (20)
$\gamma_{22,1}(\text{U})$	426,68 (3)	0,0000239 (6)
$\gamma_{24,3}(\text{U})$	428,4 (3)	0,00000101 (10)
$\gamma_{26,6}(\text{U})$	430,08 (10)	0,00000429 (19)
$\gamma_{23,0}(\text{U})$	445,72 (3)	0,00000877 (26)
$\gamma_{(-1,8)}(\text{U})$	446,82 (20)	0,00000085 (13)
$\gamma_{26,5}(\text{U})$	451,481 (10)	0,000187 (3)
$\gamma_{27,8}(\text{U})$	457,61 (5)	0,00000151 (3)
$\gamma_{24,2}(\text{U})$	461,25 (5)	0,00000229 (5)
$\gamma_{25,3}(\text{U})$	463,9 (3)	0,00000028 (3)
$\gamma_{24,0}(\text{U})$	473,9 (5)	0,00000006 (3)
$\gamma_{26,4}(\text{U})$	481,66 (12)	0,00000461 (10)
$\gamma_{26,3}(\text{U})$	487,06 (10)	0,000000265 (19)
$\gamma_{31,10}(\text{U})$	493,08 (5)	0,00000088 (3)
$\gamma_{(-1,9)}(\text{U})$	497,0 (5)	0,000000044 (25)
$\gamma_{27,5}(\text{U})$	526,4 (4)	0,000000057 (19)
$\gamma_{(-1,10)}(\text{U})$	538,8 (2)	0,000000309 (19)
$\gamma_{33,8}(\text{U})$	550,5 (2)	0,000000435 (25)
$\gamma_{(-1,11)}(\text{U})$	557,3 (5)	0,000000038 (19)
$\gamma_{36,10}(\text{U})$	579,4 (3)	0,000000088 (19)
$\gamma_{31,5}(\text{U})$	582,89 (10)	0,000000618 (26)
$\gamma_{29,4}(\text{U})$	586,3 (3)	0,000000153 (16)
$\gamma_{43,12}(\text{U})$	596,0 (5)	0,000000039 (12)

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{33,6}(\text{U})$	597,99 (5)	0,00000174 (6)
$\gamma_{36,8}(\text{U})$	599,6 (2)	0,000000202 (25)
$\gamma_{40,10}(\text{U})$	606,9 (2)	0,000000121 (13)
$\gamma_{(-1,12)}(\text{U})$	608,9 (2)	0,000000117 (12)
$\gamma_{31,4}(\text{U})$	612,83 (3)	0,00000095 (5)
$\gamma_{35,6}(\text{U})$	617,1 (1)	0,00000135 (8)
$\gamma_{31,3}(\text{U})$	618,28 (6)	0,00000206 (8)
$\gamma_{33,5}(\text{U})$	619,21 (6)	0,00000121 (8)
$\gamma_{32,3}(\text{U})$	624,78 (3)	< 0,000000022
$\gamma_{29,2}(\text{U})$	624,78 (5)	0,000000460 (19)
$\gamma_{28,0}(\text{U})$	633,15 (6)	0,00000255 (6)
$\gamma_{29,1}(\text{U})$	637,73 (5)	0,00000064 (6)
$\gamma_{29,0}(\text{U})$	637,80 (5)	0,00000192 (19)
$\gamma_{38,7}(\text{U})$	639,99 (10)	0,00000846 (20)
$\gamma_{30,2}(\text{U})$	645,94 (4)	0,0000149 (3)
$\gamma_{33,4}(\text{U})$	649,32 (6)	0,00000072 (5)
$\gamma_{(-1,13)}(\text{U})$	650,53 (6)	0,00000027 (4)
$\gamma_{34,4}(\text{U})$	652,05 (2)	0,00000663 (20)
$\gamma_{33,3}(\text{U})$	654,88 (8)	0,00000227 (5)
$\gamma_{30,1}(\text{U})$	658,86 (6)	0,00000959 (26)
$\gamma_{31,0}(\text{U})$	664,58 (5)	0,00000167 (4)
$\gamma_{36,5}(\text{U})$	668,2 (5)	0,000000040 (12)
$\gamma_{43,8}(\text{U})$	670,8 (5)	< 0,000000009 (3)
$\gamma_{32,0}(\text{U})$	670,99 (4)	< 0,000000009 (3)
$\gamma_{35,3}(\text{U})$	674,05 (3)	0,00000050 (2)
$\gamma_{40,5}(\text{U})$	674,4 (5)	0,00000010 (1)
$\gamma_{(-1,14)}(\text{U})$	685,97 (11)	0,00000126 (6)
$\gamma_{(-1,15)}(\text{U})$	688,1 (3)	0,000000112 (11)
$\gamma_{34,2}(\text{U})$	690,81 (8)	0,00000059 (5)
$\gamma_{(-1,16)}(\text{U})$	693,2 (5)	0,000000032 (13)
$\gamma_{46,10}(\text{U})$	693,81 (1)	0,000000019 (7)
$\gamma_{41,5}(\text{U})$	697,8 (5)	0,000000074 (15)
$\gamma_{(-1,17)}(\text{U})$	699,6 (5)	0,000000080 (16)
$\gamma_{33,0}(\text{U})$	701,1 (2)	0,000000524 (19)
$\gamma_{34,1}(\text{U})$	703,68 (5)	0,00000410 (13)
$\gamma_{(-1,18)}(\text{U})$	712,96 (5)	0,000000052 (6)
$\gamma_{44,7}(\text{U})$	714,71 (14)	0,000000079 (8)
$\gamma_{39,4}(\text{U})$	718,0 (5)	0,00000276 (6)
$\gamma_{35,0}(\text{U})$	720,3 (5)	0,000000029 (5)
$\gamma_{47,10}(\text{U})$	720,55 (3)	0,000000020 (2)
$\gamma_{41,4}(\text{U})$	727,9 (2)	0,000000125 (7)
$\gamma_{46,7}(\text{U})$	736,5 (5)	0,000000030 (9)
$\gamma_{(-1,19)}(\text{U})$	742,7 (5)	0,000000038 (11)
$\gamma_{37,2}(\text{U})$	747,4 (5)	0,000000081 (16)
$\gamma_{38,2}(\text{U})$	756,23 (6)	0,0000028 (5)
$\gamma_{39,2}(\text{U})$	756,4 (4)	0,00000069 (19)
$\gamma_{47,7}(\text{U})$	762,6 (2)	~0,00000001

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{45,5}(\text{U})$	763,60 (15)	~0,000000022
$\gamma_{41,2}(\text{U})$	766,47 (3)	0,00000013 (2)
$\gamma_{51,12}(\text{U})$	767,29 (4)	0,00000014 (3)
$\gamma_{38,1}(\text{U})$	769,15 (8)	0,0000051 (10)
$\gamma_{39,1}(\text{U})$	769,4 (5)	0,0000068 (12)
$\gamma_{(-1,20)}(\text{U})$	777,1 (3)	0,000000028 (7)
$\gamma_{41,1}(\text{U})$	779,43 (3)	0,000000137 (9)
$\gamma_{(-1,21)}(\text{U})$	786,9 (2)	0,000000087 (9)
$\gamma_{(-1,22)}(\text{U})$	788,5 (3)	0,000000035 (7)
$\gamma_{42,2}(\text{U})$	792,68 (6)	0,000000020 (4)
$\gamma_{(-1,23)}(\text{U})$	796,9 (3)	0,000000015 (3)
$\gamma_{(-1,24)}(\text{U})$	803,2 (2)	0,000000064 (5)
$\gamma_{42,1}(\text{U})$	805,65 (6)	0,000000028 (4)
$\gamma_{43,2}(\text{U})$	808,21 (4)	0,000000122 (6)
$\gamma_{46,4}(\text{U})$	813,7 (2)	0,000000045 (5)
$\gamma_{50,9}(\text{U})$	816,0 (2)	0,000000025 (4)
$\gamma_{43,0}(\text{U})$	821,25 (4)	0,000000050 (11)
$\gamma_{51,10}(\text{U})$	821,3 (2)	~0,000000006
$\gamma_{(-1,25)}(\text{U})$	826,8 (3)	0,000000018 (6)
$\gamma_{(-1,26)}(\text{U})$	828,9 (2)	0,000000134 (8)
$\gamma_{52,12}(\text{U})$	832,2 (2)	0,000000030 (4)
$\gamma_{(-1,27)}(\text{U})$	837,3 (2)	0,000000020 (4)
$\gamma_{47,4}(\text{U})$	840,4 (2)	0,000000049 (5)
$\gamma_{44,1}(\text{U})$	843,78 (1)	0,000000135 (8)
$\gamma_{47,2}(\text{U})$	879,2 (3)	0,000000036 (4)
$\gamma_{47,1}(\text{U})$	891,0 (3)	0,000000075 (8)
$\gamma_{(-1,28)}(\text{U})$	895,4 (3)	0,000000076 (25)
$\gamma_{(-1,29)}(\text{U})$	898,1 (3)	0,000000018 (4)
$\gamma_{(-1,30)}(\text{U})$	905,5 (3)	0,000000076 (25)
$\gamma_{(-1,31)}(\text{U})$	911,7 (3)	0,000000014 (3)
$\gamma_{49,4}(\text{U})$	918,7 (3)	0,000000088 (30)
$\gamma_{(-1,32)}(\text{U})$	931,9 (3)	0,000000013 (4)
$\gamma_{50,3}(\text{U})$	940,3 (3)	0,000000050 (5)
$\gamma_{48,2}(\text{U})$	955,41 (2)	0,000000031 (3)
$\gamma_{49,2}(\text{U})$	957,6 (3)	0,000000032 (3)
$\gamma_{48,1}(\text{U})$	968,37 (2)	~0,000000028
$\gamma_{51,2}(\text{U})$	979,7 (3)	0,000000028 (5)
$\gamma_{(-1,33)}(\text{U})$	982,7 (3)	0,0000000107 (25)
$\gamma_{53,7}(\text{U})$	986,90 (4)	0,000000021 (5)
$\gamma_{51,1}(\text{U})$	992,64 (3)	0,000000027 (4)
$\gamma_{52,4}(\text{U})$	1005,7 (3)	0,0000000177 (25)
$\gamma_{(-1,34)}(\text{U})$	1009,4 (3)	0,0000000139 (25)
$\gamma_{52,0}(\text{U})$	1057,3 (2)	0,000000045 (7)

7 Main Production Modes

$$\begin{aligned}
 & \text{U} - 238(\text{n},\gamma)\text{U} - 239 \\
 \left\{ \begin{array}{l} \text{U} - 239(\beta^-)\text{Np} - 239 \\ \text{Possible impurities : } T_{1/2} : 23,5 \text{ min} \end{array} \right. \\
 \left\{ \begin{array}{l} \text{Np} - 239(\beta^-)\text{Pu} - 239 \quad \sigma : 2,7 \text{ (1) barns} \\ \text{Possible impurities : } T_{1/2} : 2,35 \text{ d; Pu} - 240, \text{Pu} - 241, \text{Am} - 241 \end{array} \right. \\
 & \text{U} - 238(\text{d,p})\text{U} - 239
 \end{aligned}$$


8 References


- F. ASARO, I. PERLMAN. Phys. Rev. 88 (1952) 828
(alpha-transition energies and probabilities)
- E. SEGRE. Phys. Rev. 86 (1952) 21
(SF half-life)
- F. ASARO, S.G.THOMPSON, F.S.STEPHENS, JR., I.PERLMAN. Priv.Comm., quoted in 1964Hy02 (1964) (1957)
(alpha-transition energies and probabilities)
- G.I.NOVIKOVA, L.N.KONDRADEV, Y.P.SOBOLEV, L.L.GOLDIN. Zhur.Eksptl.i Teoret.Fiz. 32 (1957) 1018
(alpha-transition energies and probabilities)
- B.S.DZHELEPOV, R.B.IVANOV, V.G.NEDOVESOV. Zhur.Eksptl.i Teoret.Fiz. 14 (1961) 1227
(alpha-transition energies and probabilities)
- C.F.LEANG. Compt.Rend. 255 (1962) 3155
(alpha-transition energies)
- S. BJORNHOLM, C.M. LEDERER, F. ASARO, I. PERLMAN. Phys. Rev. 130 (1963) 2000
(alpha-transition energies and probabilities)
- S.A.BARANOV, V.M.KULAKOV, S.N.BELENKY. Nucl. Phys. 41 (1963) 95
(alpha-transition energies and probabilities)
- F.HORSCH. Z. Physik 183 (1965) 252
(alpha-transition energies and probabilities)
- E.F. TRETYAKOV, L.N. KONDRADEV. Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Fiz. 29 (1965) 242
(Gamma-ray and conversion electron energies and emission probabilities)
- I. AHMAD. Thesis, Univ California (1966); UCRL-16888 (1966)
(alpha-transition and gamma-ray energies and emission probabilities)
- F.HORSCH. Z. Physik 194 (1966) 405
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- J.A. BEARDEN. Rev. Mod. Phys. 39 (1967) 78
(X-ray energies)
- J.E. CLINE. Nucl. Phys. A106 (1968) 481
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- K.L. SWINTH. Nucleonic in Acrospace, Ed. P.Polyshuk.N.Y.:Plenum Press, p. 279, (1968). Quoted in 1988ChZL
(1968)
(LX-ray emission probabilities)
- S.A.BARANOV, V.M.KULAKOV, V.M.SHATINSKII. Sov. J. Nucl. Phys. 7 (1968) 442
(Alpha emission energies)
- F.L.OETTING. Proc.Int.Conf.on Plutonium and Other Actinides, 4th, Santa Fe, New Mexico, M.A.Musil, Ed., The
Metallurgical Soc., New York, Pt.1, p.154 (1970)
(Half-life)
- R. GUNNINK, R.J. MORROW. In: UCRL 51087 (1971)
(Gamma ray energies and emission probabilities)
- K.L. SWINTH,. IEEE Trans. Nucl. Sci. 18(1), 125 (1971). Quoted in 1988ChZL (1971)
(LX-ray emission probabilities)
- S.A.BARANOV, V.M.SHATINSKY. Sov.J.Nucl.Phys. 22 (1975) 346
(alpha-transition energies)
- B.M.ALEKSANDROV, V.T.ANTSIFEROV, L.S.BULYANITSA, A.M.GEIDELMAN, Y.S.EGOROV, *et al.* Bull.Acad.Sci.USSR,
Phys.Ser. 39, No.3 39 (1975) 20
(Half-life)


- K.M.GLOVER, R.A.P.WILTSHERE, F.J.G.ROGERS, M.KING. UKNDC(75)-P-71 (1975) 55
(Half-life)
- R. GUNNINK, J.E. EVANS, A.L. PRINDLE. UCRL-52139 (1976)
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- S.A. BARANOV, A.G. ZELENKOV, V.M. KULAKOV. Proc Advisory Group Meeting on Transactinium Nucl. Data, Karlsruhe; Vol III, p.249; IAEA-186 (1976)
(alpha-transition probabilities)
- A.H.JAFFEY, H.DIAMOND, W.C.BENTLEY, K.F.FLYNN, D.J.ROKOP, A.M.ESSLING, J.WILLIAMS. Phys. Rev. C16 (1978) 354
(Half-life)
- S.R. GUNN. Int.J.Appl.Radiat.Isotop 29 (1978) 497
(Half-life)
- L.L.LUCAS, J.R.NOYCE, B.M.COURSEY. Int.J.Appl.Radiat.Isotop 29 (1978) 501
(Half-life)
- S.F.MARSH, R.M.ABERNATHEY, R.J.BECKMAN, R.K.ZEIGLER, J.E.REIN. Int.J.Appl.Radiat.Isotop. 29 (1978) 509
(Half-life)
- A.PRINDLE, J.EVANS, R.DUPZYK, R.NAGLE, R.NEWBURY. Int.J.Appl.Radiat.Isotop. 29 (1978) 517
(Half-life)
- P.W.SEABAUGH, K.C.JORDAN. Int.J.Appl.Radiat.Isotop. 29 (1978) 489
(Half-life)
- J.ALMEIDA, T.VON EGIDY, P.H.M.VAN ASSCHE, H.G.BORNER, W.F.DAVIDSON, K.SCHRECKENBACH, A.I.NAMENSON. Nucl. Phys. A315 (1979) 71
(Gamma-ray and conversion electron energies)
- M. DESPRÉS. Rep. CEA-R-5065 (1980), quoted in: Decay Data of the Transactinium Nuclides, IAEA, Vienna, Technical Reports, Ser. No.261, 1986. (1980)
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- A. RYTZ. In: Proc Intern Conf Atomic Masses and Fundamental Constants, 6th, East Lansing (1979), J A Nolen,Jr, W Benensen Eds, Plenum Press, New York (1980) 249
(Absolute alpha-particle energy measurement)
- I.AHMAD. INDC(NDS)-126/NE (1981) 28
(alpha-transition energies and probabilities)
- F. BROWN. Priv. Comm., 1981. Quoted in N.E. Holden, BNL-NCS-35514, p.1, (1984). See Nucl. Stand. Ref. Data, IAEA- TECDoc-335, Vienna, 1985. (1981)
(Half-life)
- H. UMEZAWA. In: INDC(NDS)-126/NE, 38 (1981)
(Gamma-ray emission probabilities)
- G.BARREAU, H.G.BORNER, T.VON EGIDY, R.W.HOFF. Z. Physik A308 (1982) 209
(KX-ray energies)
- R.G.HELMER, C.W.REICH, R.J.GEHRKE, J.D.BAKER. Int.J.Appl.Radiat.Isotop. 33 (1982) 23
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- I. AHMAD, J. HINES, J.E. GINDLER. Phys. Rev. C27 (1983) 2239
(KX-ray energies)
- A.M. GEIDELMAN, P. DRYAK, YU. S. EGOROV, *et al.* Proc. II Int. Symp. Meth. of Prod. and Meas. of Standard Sources and Solutions, Chopak, Hungary, vol. II, p. 381, 1984. Quoted in 1988ChZL (1984)
(U LX-ray energies)
- M.DIVADEENAM, J.R.STEHN. Ann.Nucl.Energy 11 (1984) 375
(Half-life)
- Y. IWATA, Y. YOSHIZAWA, T. SUZUKI, S. ICHIKAWA, S. OKAZAKI. Intern. J. Appl. Radiat. Isotop. 35 (1984) 1
(Gamma-ray emission probabilities)
- G.BORTELS, B.DENECKE, R.VANINBROUKX. Nucl.Instrum.Methods 223 (1984) 329
(U LX-ray energies)
- I. AHMAD. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 223 (1984) 319
(alpha-transition probabilities)
- A.A.DRUZHININ, V.N.POLYNOV, A.M.KOROCHKIN, E.A.NIKITIN, L.I.LAGUTINA. Sov.At.Energy 59 (1985) 628
(SF Half-life)
- S.MIRZADEH, Y.Y.CHU, S.KATCOFF, L.K.PEKER. Phys. Rev. C33 (1986) 2159
(235U level energies, 235Pa beta- decay)
- G.BORTELS, P.COLLAERS. Appl.Radiat.Isot. 38 (1987) 831
(alpha-transition probabilities)


- V.P.CHECHEV, N.K.KUZMENKO, V.O.SERGEYEV, K.P.ARTAMONOVA. Evaluated Decay Data of Transuranium Radionuclides, Handbook, Publishing House Energoatomizdat, Moscow (1988) (Evaluation of ^{239}Pu decay data)
- N.E.HOLDEN. Pure Appl.Chem. 61 (1989) 1483 (Half-life)
- K.M.GLOVER, A.L.NICHOLS. AERE-R-13822 (1990) (Half-life)
- S.V.ANICHENKOV, YU.S.POPOV. Sov.J.Radiochemistry 32 (1990) 401 (alpha-transition probabilities)
- A. RYTZ. At. Data Nucl. Data Tables. 47 (1991) 205 (alpha-transition energies and probabilities)
- C.J. BLAND, J. MOREL, E. ETCHEVERRY, M.C. LÉPY. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 323 (LX and gamma-ray emission probabilities)
- C.J. BLAND, J. TRUFFY. Appl. Radiat. Isot. 43 (1992) 1241 (alpha-transition probabilities)
- N.COURSOL, N.CORON, D.MASSE, H.STROKE, J.W.ZHOU, P.DE MARCILLAC, J.LEBLANC, G.ARTZNER, G.DAMBIER, J.BOUCHARD, G.JEGOUDEZ, J.P.LEPELTIER, G.NOLLEZ, C.GOLBACH, J.-L.PICOLO. Nucl.Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 24 (Gamma-ray emission probabilities)
- E.A. FROLOV. Appl. Radiat. Isot. 43 (1992) 211 (alpha-transition energies)
- G. BARCI-FUNEL, J. DALMASSO, G. ARDISSON. Appl. Radiat. Isot. 43 (1992) 37 (LX and gamma-ray emission probabilities)
- E.GARCIA-TORANO, M.L.ACENA, G.BORTELS, D.MOUCHEL. Nucl.Instrum.Methods Phys. Res. A334 (1993) 447 (alpha-transition probabilities)
- M.R. SCHMORAK. Nucl. Data Sheets 69 (1993) 375 (Decay Scheme)
- J. MOREL, E. ETCHEVERRY, M. VALLÉE. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A339 (1994) 232 (X- and gamma-ray energies and emission probabilities)
- W. RAAB, J.L. PARUS. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A339 (1994) 116 (alpha-transition probabilities)
- D.T.BARAN. Appl.Radiat.Isot. 45 (1994) 1177 (alpha-transition probabilities)
- M.C.LÉPY, B.DUCHEMIN, J.MOREL. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res A353 (1994) 10 (LX-ray emission probabilities)
- M.C.LÉPY, K. DEBERTIN. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A339 (1994) 218 (LX-ray emission probabilities)
- P.N.JOHNSTON, P.A.BURNS. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A361 (1995) 229 (U LX ray energies and emission probabilities)
- R.B. FIRESTONE, V.S. SHIRLEY, C.M. BAGLIN, S.Y.F. CHU, J. ZIPKIN. Table of Isotopes. Eighth Edition, Volume II: A=151-272. (1996) (Decay scheme, gamma ray energies and multipolarities)
- A.M. SANCHEZ, P.R. MONTERO, F.V. TOME. Nucl.Instrum. Methods Phys.Res. A369 (1996) 593 (alpha-transition probabilities)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys.Res. A369 (1996) 527 (Atomic data)
- L.L.VINTRO, P.I.MITCHELL, O.M.CONDRÉN, M.MORAN, J.VIVES I BATLLE, J.A.SANCHEZ-CABEZA. Nucl.Instrum. Methods Phys.Res. A369 (1996) 597 (alpha-transition probabilities)
- A.V.BUSHUEV, V.N.ZUBAREV, E.V.PETROVA *et al.* At.Energ. 82 (1997) 117 (Gamma-ray emission probabilities)
- R.O.KOROB, S.L.FIGUEROA. Radiochim.Acta 77 (1997) 161 (Gamma-ray emission probabilities)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1999-1, Braunschweig, February (1999) (KX-ray energies and relative emission probabilities)
- A.M.SANCHEZ, P.R.MONTERO. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A420 (1999) 481 (alpha-transition probabilities)
- F. DAYRAS. Nucl.Instrum.Methods Phys.Res. A490 (2002) 492 (alpha-transition probabilities)


- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAULT. Nucl.Phys A729 (2003) 337
(Q value)
- E.BROWNE. Nucl.Data Sheets 98 (2003) 665
(Evaluation of ^{239}Pu decay data, ^{235}U level energies, gamma-ray emission probabilities, alpha-transition probabilities)


























1 Decay Scheme

Pu-241 decays approximately 100 % by beta minus emission to the ground state of Am-241 and 0,00244 % by alpha emission to levels of U-237. The Pu-241 spontaneous fission branching is 0,00244 %.

Le plutonium 241 se désintègre principalement par émission beta moins vers le niveau fondamental d'américium 241. L'intensité des émissions alpha conduisant aux niveaux excités et au niveau fondamental d'uranium 237 est de 0,00244 %.

Le plutonium 241 et l'uranium 237 sont à l'équilibre environ 68 jours après la formation de plutonium 241.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{241}\text{Pu})$:	14,33	(4)	a
$T_{1/2}(^{241}\text{Am})$:	432,6	(6)	a
$T_{1/2}(^{237}\text{U})$:	6,749	(16)	d
$Q^-(^{241}\text{Pu})$:	20,8	(2)	keV
$Q^\alpha(^{241}\text{Pu})$:	5140,0	(5)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,10}$	4773 (3)	$\approx 0,0000007$	132
$\alpha_{0,9}$	4813 (3)	$\approx 0,0000007$	254
$\alpha_{0,8}$	4824 (5)	$\approx 0,0000017$	131
$\alpha_{0,7}$	4866,0 (11)	0,0000005 (2)	90
$\alpha_{0,6}$	4879,1 (5)	0,000029 (3)	18,6
$\alpha_{0,5}$	4935,8 (5)	0,000295 (8)	4,5
$\alpha_{0,4}$	4980,0 (5)	0,00203 (4)	1,3
$\alpha_{0,3}$	5057,0 (5)	0,000032 (3)	276
$\alpha_{0,2}$	5083,7 (5)	0,0000100 (12)	1300
$\alpha_{0,1}$	5128,6 (5)	0,000025 (2)	1000
$\alpha_{0,0}$	5140,0 (5)	0,0000086 (10)	3600

2.2 β^- Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	Nature	$\lg ft$
$\beta_{0,0}^-$	20,8 (2)	99,99756 (2)	first-forbidden	5,8

2.3 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(U)$	11,39 (2)	0,00182 (3)					
$\gamma_{3,2}(U)$	26,67 (18)	0,000077 (15)	[M1+E2]				
$\gamma_{5,4}(U)$	44,18 (14)	0,000258 (17)	M1+1,7(5)%E2	45,3 (25)	11,2 (7)	60,4 (29)	
$\gamma_{2,1}(U)$	44,86 (12)	0,000111 (25)	[M1+15(4)%E2]	96 (18)	25 (4)	131 (25)	
$\gamma_{2,0}(U)$	56,30 (12)	0,00051 (4)	(E2)	149 (3)	41,1 (8)	204 (4)	
$\gamma_{6,5}(U)$	56,76 (22)	0,0000280 (41)	M1+1,1(13)E2	21 (3)	5,0 (9)	27 (3)	
$\gamma_{3,1}(U)$	71,64 (13)	0,000189 (14)	(E2)	46,8 (10)	13,0 (3)	64,3 (13)	
$\gamma_{4,3}(U)$	77,01 (13)	0,000225 (6)	(M1)	7,44 (15)	1,8 (4)	9,86 (20)	
$\gamma_{6,4}(U)$	100,94 (17)	0,00000099	(E2)	9,3 (2)	2,58 (5)	12,8 (3)	
$\gamma_{4,2}(U)$	103,68 (12)	0,000536 (14)	[M1+0,47(1)%E2]	3,16 (7)	0,767 (15)	4,20 (9)	
$\gamma_{7,4}(U)$	114 (1)	0,0000067 (13)	E1	0,0665 (13)	0,0163 (3)	0,0883 (17)	
$\gamma_{5,3}(U)$	121,22 (19)	0,000097 (10)	(M1)	10,1 (2)	2,00 (4)	0,484 (10)	12,8 (3)
$\gamma_{4,1}(U)$	148,567 (28)	0,00150 (3)	[M1+2,8(1)%E2]	5,55 (11)	1,13 (3)	0,275 (6)	7,05 (14)
$\gamma_{4,0}(U)$	159,96 (2)	0,0000179 (4)	(E2)	0,208 (4)	1,14 (3)	0,316 (7)	1,78 (3)

3 Atomic Data

3.1 U

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,970 (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,500 (19) \\ n_{KL} &: 0,794 (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	94,666	62,47
K α_1	98,44	100
K β_3	110,421	{}
K β_1	111,298	{}
K β_5''	111,964	{}
		36,08

	Energy keV	Relative probability
K β_2	114,407	{
K β_4	115,012	}
KO _{2,3}	115,377	}
X _L		
L ℓ	11,619	
L α	13,438 – 13,615	
L η	15,399	
L β	15,727 – 18,206	
L γ	19,507 – 20,714	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	71,776 – 80,954	100
KLX	88,153 – 98,429	59,6
KXY	104,51 – 115,59	8,88
Auger L	5,9 – 21,6	

4 α Emissions

	Energy keV	Alpha per 100 disint.
$\alpha_{0,10}$	4694 (3)	$\approx 0,0000007$
$\alpha_{0,9}$	4733 (3)	$\approx 0,0000007$
$\alpha_{0,8}$	4744 (5)	$\approx 0,0000017$
$\alpha_{0,7}$	4785,1 (11)	0,0000005 (2)
$\alpha_{0,6}$	4798,0 (5)	0,000029 (3)
$\alpha_{0,5}$	4853,8 (5)	0,000295 (8)
$\alpha_{0,4}$	4897,3 (5)	0,00203 (4)
$\alpha_{0,3}$	4973,1 (5)	0,000032 (3)
$\alpha_{0,2}$	4999,2 (5)	0,0000100 (12)
$\alpha_{0,1}$	5043,4 (5)	0,000025 (2)
$\alpha_{0,0}$	5054,6 (5)	0,0000086 (10)

5 Electron Emissions

	Energy keV	Electrons per 100 disint.
eAL	(U) 5,9 - 21,6	0,00117 (6)
eAK	(U) KLL 71,776 - 80,954 } KLX 88,153 - 98,429 } KXY 104,51 - 115,59 }	0,000031 (5)
ec _{5,4} L	(U) 22,42 - 27,01	0,000190 (14)
ec _{4,1} K	(U) 32,965 (10)	0,001034 (21)
ec _{2,0} L	(U) 34,54 - 39,13	0,00037 (3)
ec _{3,1} L	(U) 49,88 - 54,47	0,000136 (10)
ec _{2,0} M	(U) 50,75 - 52,75	0,000103 (8)
ec _{4,3} L	(U) 55,25 - 59,84	0,000154 (4)
ec _{4,2} L	(U) 81,922 - 86,512	0,000325 (10)
ec _{4,1} L	(U) 126,809 - 131,399	0,000211 (6)
$\beta_{0,0}^-$	max: 20,8 (2)	99,99756 (2)
$\beta_{0,0}^-$	avg: 5,8 (1)	

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(U)	11,619 — 20,714	0,001166 (40)
XK α_2	(U)	94,666	0,000300 (7) }
XK α_1	(U)	98,44	0,000479 (10) }
XK β_3	(U)	110,421	}
XK β_1	(U)	111,298	0,000179 (5) K' β_1
XK β_5''	(U)	111,964	}
XK β_2	(U)	114,407	}
XK β_4	(U)	115,012	0,000059 (2) K' β_2
XKO _{2,3}	(U)	115,377	}

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{5,4}(U)$	44,18 (3)	0,0000042 (2)
$\gamma_{2,1}(U)$	44,86 (10)	0,00000084 (10)
$\gamma_{2,0}(U)$	56,30 (12)	0,0000025 (2)
$\gamma_{6,5}(U)$	56,76 (10)	0,0000010 (1)
$\gamma_{3,1}(U)$	71,64 (9)	0,0000029 (2)
$\gamma_{4,3}(U)$	77,01 (4)	0,0000207 (4)
$\gamma_{6,4}(U)$	100,94 (11)	0,000000072
$\gamma_{4,2}(U)$	103,680 (5)	0,000103 (2)
$\gamma_{7,4}(U)$	114 (1)	0,0000062 (12)
$\gamma_{5,3}(U)$	121,22 (5)	0,00000070 (7)
$\gamma_{4,1}(U)$	148,567 (10)	0,0001863 (8)
$\gamma_{4,0}(U)$	159,96 (2)	0,00000645 (9)

7 Main Production Modes

U – 238(n, γ)U – 239

$\left\{ \begin{array}{l} \text{U – 239}(\beta^-,\gamma)\text{Np – 239} \\ \text{Possible impurities : } T_{1/2} = 23,5 \text{ min} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Np – 239}(\beta^-,\gamma)\text{Pu – 239} \\ \text{Possible impurities : } T_{1/2} = 2,36 \text{ d} \end{array} \right.$

Pu – 239(n, γ)Pu – 240


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Pu} - 240(\text{n},\gamma)\text{Pu} - 241 \\ \text{Possible impurities : Pu} - 238, \text{Pu} - 239, \text{Pu} - 240 \end{array} \right.$$


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{U} - 238(\alpha,\text{n})\text{Pu} - 241 \\ \text{Possible impurities : Pu} - 238, \text{Pu} - 239, \text{Pu} - 240 \end{array} \right.$$

8 References

- M.S.FREEDMAN, F.WAGNER, JR., D.W.ENGELKEMEIR. Phys. Rev. 88 (1952) 1155
(beta-transition energy, gamma-ray energies)
- F.ASARO. Thesis, Univ.California (1953) (1953)
(alpha-transition energies)
- K.N.SHLIAGIN. Izvest.Akad.Nauk SSSR, Ser.Fiz. 20 (1956) 891
(beta-transition energy)
- H.L.SMITH. J.Inorg.Nuclear Chem. 17 (1961) 178
(beta-transition probability)
- B.S.DZHELEPOV, R.B.IVANOV, V.G.NEDOVESOV. Zh.Eksperim.i Teor.Fiz. 46 (1964) 1517
(alpha-transition energies)
- S.A.BARANOV, M.K.GADZHIEV, V.M.KULAKOV, V.M.MATINSKII. Yadern.Fiz. 1 (1965) 557
(alpha-transition energies)
- I.A.BARANOV, V.V.BERDIKOV, A.S.KRIVOKHATSKII, A.N.SILANTEV. Izv.Akad.Nauk SSSR, Ser.Fiz. 29 (1965) 163
(alpha-transition energies and probabilities, gamma-ray energies)
- S.A.BARANOV, V.M.KULAKOV, V.M.SHATINSKII. Yadern.Fiz. 7 (1968) 727
(alpha-transition energies)
- F.L.OETTING. Phys. Rev. 168 (1968) 1398
(Average beta-transition energy)
- I.AHMAD, A.M.FRIEDMAN, J.P.UNIK. Nucl. Phys. A119 (1968) 27
(alpha- and gamma transition energies, alpha/beta-branching)
- R.GUNNINK, R.J.MORROW. UCRL-51087 (1971) (1971)
(Gamma-ray energies)
- J.E. CLINE, R.J. GEHRKE, L.D. MCISAAC. ANCR-1069, (1972) (1972)
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- S.A.BARANOV, A.G.ZELENKOV, V.M.KULAKOV. Proc.Advisory Group Meeting on Transactinium Nucl.Data, Karlsruhe Vol.III (1976) p.249
(alpha-transition energies and probabilities)
- R.GUNNINK, J.E.EVANS, A.L.PRINDLE. UCRL-52139 (1976) (1976)
(Gamma-ray energies and emission probabilities, alpha/beta-branching)
- H.UMEZAWA, T.SUZUKI, S.ICHIKAWA. J.Nucl.Sci.Technol. 13 (1976) 327
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- R.VANINBROUKX, J.BROOTHAERTS, P.DE BIEVRE, B.DENECKE, M.GALLET. NEANDC(E)-192U Vol.3 (1977) p.55
(alpha/beta-branching)
- J.K.DICKENS, J.S.EMERY, R.M.FREESTONE, T.A.LOVE, J.W.McCONNELL, K.J.NORTHCUTT, R.W. PEELLE. ORNL/NUREG/TM-223 (1978) (1978)
(Gamma-ray emission probabilities)
- Y.A. ELLIS. Nucl. Data Sheets 23 (1978) 123
(Decay scheme)
- A.CESANA, G.SANDRELLI, V.SANGIUST, M.TERRANI. Energ.Nucl.(Milan) 26 (1979) 526
(Gamma-ray energies)
- S.F.MARSH, R.M.ABERNATHEY, R.J.BECKMAN, J.E.REIN. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 31 (1980) 629
(Half-life)
- P.DE BIEVRE, M.GALLET, R.WERZ. NEANDC(E)-242U Vol.III (1983) p.53
(Half-life)
- K.M.GLOVER. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 35 (1984) 239
(alpha-transition energies)
- S.K.AGGARWAL, A.R.PARAB, S.A.CHITAMBAR, H.C.JAIN. Phys. Rev. C31 (1985) 1885
(Half-life)
- A.A.DRUZHININ, V.N.POLYNOV, A.M.KOROCHKIN, E.A.NIKITIN, L.I. LAGUTINA. At.Energ. 59 (1985) 68
(Half-Lives of the Spontaneous Fission of 241Pu)

- R.G. HELMER, C.W. REICH. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 36 (1985) 117
(Gamma-ray energies and probabilities)
- H. WILLMES, T. ANDO, R.J. GEHRKE. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 36 (1985) 123
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- G.A. TIMOFEEV, V.V. KALYGIN, P.A. PRIVALOVA. At. Energ. 60 (1986) 343
(Half-life)
- V.P. CHECHEV, N.K. KUZMENKO, V.O. SERGEEV, K.P. ARTAMONOVA. Evaluated Decay Data of Transuranium Radionuclides, Handbook, Publishing House Energoatomizdat, Moscow (1988)
(Evaluation of ^{241}Pu decay data)
- J.L. PARKER, R.N. LIKES, A. GOLDMAN. Appl. Rad. Isotopes 40 (1989) 793
(Half-life)
- A. RYTZ. At.Data Nucl.Data Tables 47 (1991) 205
(alpha-transition energies)
- T. DRAGNEV. Appl. Rad. Isotopes 44 (1993) 613
(Gamma-ray energies)
- D.T. BARAN. Appl. Rad. Isotopes 45 (1994) 1177
(Gamma-ray emission probabilities)
- Y.A. AKOVALI. Nucl.Data Sheets 74 (1995) 461
(Decay scheme, multipolarities)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys.Res. A369 (1996) 527
(Atomic data)
- R.B. FIRESTONE. Table of Isotopes, 8 Edition, Vol.II, V.S. Shirley (Ed.), C.M. Baglin, S.Y.F. Chu, and J. Zipkin (Assistant Ed.), 1996, 1998, 1999 (1996)
(Decay scheme, gamma ray energies, multipolarities and level energies)
- P. DE BIEVRE, A. VERBRUGGEN. Proc. Intern. Nucl.Data Sci. Techn., Trieste, Italy, 19-24 May, 1997, G. Reffo, A. Ventura, C. Grandi, Eds., Italy, Pt.1, p.839 (1997) (1997)
(Half-life)
- Y.A. AKOVALI. Nucl.Data Sheets 84 (1998) 1
(r₀ of ^{237}U)
- O. DRAGOŇ, A. SPALEK, M. RYSAVÝ, A. KOVALÍK, E.A. YAKUSHEV, V. BRABEC, A.F. NOVGORODOV, N. DRAGOŇOVÁ, J. RIZEK. J.Phys.(London) G25 (1999) 1839
(beta-transition energy)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1999-1, Braunschweig, February 1999 (1999)
(KX ray energies and relative emission probabilities)
- E.A. YAKUSHEV, V.M. GOROZHANKIN, O. DRAGOŇ, A. KOVALÍK, A.F. NOVGORODOV, M. RYSAVÝ, A. SHPALEK. Program and Thesis, Proc. 49th Ann. Conf. Nucl. Spectrosc. Struct. At. Nuclei, Dubna, 1999 (1999) 118
(beta-transition energy)
- O. DRAGOŇ, A. SPALEK, M. RYSAVÝ, A. KOVALÍK, E. YAKUSHEV, V. BRABEC, J. FRANA, D. VENOS. Appl.Radiat.Isot. 52 (2000) 387
(beta-transition energy)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl.Phys. A729 (2003) 337
(Q value)
- N. FOTIADES, G.D. JOHNS, R.O. NELSON, *et al.* Phys. Rev. C69 (2004) 024601
(Placement of 121.2 keV gamma transition)
- M.J. MARTIN. Nucl.Data Sheets 106 (2005) 89
(Evaluation of beta-transition energy, alpha/beta -branching)
- M.S. BASANIA. Nucl. Data Sheets 107 (2006) 2323
(decay scheme, multipolarities)







1 Decay Scheme

Cm-246 disintegrates by alpha emissions (99,97385 %) and spontaneous fission (0,02615 %). The strongest alpha decay branch of 79,17 (22) % populates the Pu-242 ground state, while the first (44,545 keV) and the second (147,35 keV) excited states of Pu-242 are populated with intensities of 20,81 % and 0,020 %, respectively.

Le curium 246 se désintègre par émission alpha et par fission spontanée dans une proportion $p(FS) = 0,02615 \%$.

L'émission alpha a lieu vers le niveau excité de 44,5 keV et le niveau fondamental du plutonium 242.

Le nombre moyen $n(FS)$ de neutrons émis par transformation nucléaire de curium 246 est :

$$n(FS) = p(FS) \times \bar{\nu} = 0,0771$$

où $\bar{\nu} = 2,948$ est le nombre moyen de neutrons émis par fission spontanée.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{246}\text{Cm})$:	4723	(27)	a
$T_{1/2}(^{242}\text{Pu})$:	3,73	(3)	10^5 a
$Q^\alpha(^{246}\text{Cm})$:	5476,7	(9)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,2}$	5329,2 (10)	0,020 (2)	500
$\alpha_{0,1}$	5432,0 (9)	20,81 (22)	2,05
$\alpha_{0,0}$	5476,5 (9)	79,17 (22)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Pu})$	44,545 (9)	20,82 (22)	E2	542 (16)	151,4 (45)
$\gamma_{2,1}(\text{Pu})$	102,8 (1)	0,020 (2)	E2	10,06 (30)	2,82 (8)
					13,86 (42)

3 Atomic Data

3.1 Pu

$$\begin{aligned}\omega_K &: 0,971 \quad (4) \\ \bar{\omega}_L &: 0,521 \quad (20) \\ n_{KL} &: 0,790 \quad (5)\end{aligned}$$

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	99,525	63,17
K α_1	103,734	100
K β_3	116,244	}
K β_1	117,228	}
K β_5''	117,918	}
		36,70
K β_2	120,54	}
K β_4	120,969	}
KO _{2,3}	121,543	}
X _L		
L ℓ	12,125	
L α	14,083 – 14,279	
L η	16,334	
L β	16,499 – 19,331	
L γ	20,708 – 21,984	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	75,263 – 85,357	100
KLX	92,607 – 103,729	60,6
KXY	109,93 – 121,78	9,18
Auger L 6,12 – 22,99		

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,2}$	5242,5 (10)	0,020 (2)
$\alpha_{0,1}$	5343,7 (9)	20,81 (22)
$\alpha_{0,0}$	5387,5 (9)	79,17 (22)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pu)	6,12 - 22,99	7,20 (21)
e _{AK}	(Pu)		
	KLL	75,263 - 85,357	}
	KLX	92,607 - 103,729	}
	KXY	109,93 - 121,78	}
ec _{1,0} L	(Pu)	21,441 - 26,488	15,1 (6)
ec _{1,0} M	(Pu)	38,612 - 40,770	4,22 (17)
ec _{1,0} N	(Pu)	42,986 - 44,121	1,161 (47)
ec _{2,1} L	(Pu)	79,7 - 84,7	0,0135 (15)
ec _{2,1} M	(Pu)	96,9 - 99,0	0,00378 (41)
ec _{2,1} N	(Pu)	101,2 - 102,4	0,00104 (11)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
XL (Pu)	12,125 — 21,984	7,95 (24)

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{Pu})$	44,545 (9)	0,0279 (8)
$\gamma_{2,1}(\text{Pu})$	102,8 (1)	0,00134 (14)

7 Main Production Modes

Cm – 245(n, γ)Cm – 246 σ : 15,2 (12) barns


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Cf} – 250(\alpha)\text{Cm} – 246 \\ \text{Possible impurities : Cf} – 250, T_{1/2} = 13,08 \text{ a} \end{array} \right.$$


8 References

- A.M. FRIEDMAN, A.L. HARKNESS, P.R. FIELDS, M.H. STUDIER, J.H. HUIZENGA. Phys. Rev. 95 (1954) 1501 (Half-life)
- C.I. BROWNE, D.C. HOFFMAN, W.T. CRANE, J.P. BALAGNA, G.H. HIGGINS, J.W. BARNES, R.W. HOFF, H.L. SMITH, J.P. MIZE, M.E. BUNKER. J. Inorg. Nucl. Chem. 1 (1955) 254 (Half-life)
- J.P. BUTLER, T.A. EASTWOOD, H.G. JACKSON, R.P. SCHUMAN. Phys. Rev. 103 (1956) 965 (Half-life)
- P.R. FIELDS, M.H. STUDIER, H. DIAMOND, J.F. MECH, M.G. INGHAM, G.L. PYLE, C.M. STEVENS, S. FRIED, W. MANNING, A. GHIORSO, S.G. THOMPSON, G.H. HIGGINS, G.T. SEABORG. Phys. Rev. 102 (1956) 180 (SF Half-life)
- S.M. FRIED, G.L. PYLE, C.M. STEVENS, J.R. HUIZENGA. J. Inorg. Nucl. Chem. 2 (1956) 415 (SF Half-life)
- W.T. CARNALL, S. FRIED, A.L. HARKNESS. J. Inorg. Nucl. Chem. 17 (1961) 12 (Half-life)
- L.M. BELOV, B.S. DZHELEPOV, R.B. IVANOV, A.S. KRIVOKHATSKII, V.G. NEDOVESOV, V.P. CHECHEV. Sov. J. Radiochem. 5 (1963) 362 (Alpha-decay transition energies and probabilities)

- B.S. DZHELEPOV, R.B. IVANOV, V.G. NEDOVESOV, V.P. CHECHEV. Sov. Phys. JETP 18 (1963) 937
(Alpha-decay transition energies and probabilities)
- D. METTA, H. DIAMOND, R.F. BARNES, J. MILSTED, J. GRAY, JR., D.J. HENDERSON, C.M. STEVENS. J. Inorg. Nucl. Chem. 27 (1965) 33
(SF Half-life)
- S.A. BARANOV, YU.P. RADIONOV, V.M. KULAKOV, V.M. SHATINSKII. Sov. J. Nucl. Phys. 4 (1967) 798
(Alpha-decay transition energies and probabilities)
- D.N. METTA, H. DIAMOND, F.R. KELLY. J. Inorg. Nucl. Chem. 31 (1969) 1245
(Half-life, Alpha/SF ratio)
- K.W. MACMURDO, R.M. HARBOUR, R.W. BENJAMIN. J. Inorg. Nucl. Chem. 33 (1971) 1241
(Half-life)
- J.E. McCracken, J.R. STOKELY, R.D. BAYBARZ, C.E. BEMIS, JR. AND R. EBY. J. Inorg. Nucl. Chem. 33 (1971) 3251
(Half-life, Alpha/SF ratio)
- E. EICHLER, N.R. JOHNSON, C.E. BEMIS, JR., R.O. SAYER, D.C. HENSLEY, M.R. SCHMORAK. ORNL-4706 (1971)
(Gamma-ray transition energies)
- M. SCHMORAK, C.E. BEMIS, JR., M.J. ZENDER, N.B. GOVE, P.F. DITTLER. Nucl. Phys. A178 (1972) 410
(Gamma-ray energies and emission probabilities)
- V.G. POLYUKHOV, G.A. TIMOFEEV, P.A. PRIVALOVA, V.YA. GARBESKIRIYA AND A.P. CHETVERIKOV. Sov. J. Radiochem. 19 (1977) 414
(Half-life)
- F.P. LARKINS. Atomic Data and Nuclear Data Tables. 20 (1977) 313
(Electron shells binding energies)
- W. SPRENG, F. AZGUI, H. EMLING, E. GROSSE, R. KULESSA, CH. MICHEL, D. SCHWALM, R.S. SIMON, H.J. WOLLERSHEIM, M. MUTTERER, J.P. THEOBALD, M.S. MOORE, N. TRAUTMANN, J.L. EGIDO AND P. RING. Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1522
(Gamma-ray energies)
- V.M. SHATINSKII. Sov. J. At. Energy 56 (1984) 282
(Alpha-decay energies and transition probabilities)
- N.E. HOLDEN. Pure Appl. Chem. 61 (1989) 1483
(Half-life, evaluation)
- A. RYTZ. At. Data Nucl. Data Tables 47 (1991) 205
(Alpha-decay energies and transition probabilities)
- M.U. RAJPUT, T.D. MACMAHON. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A312 (1992) 289
(Evaluation techniques)
- S.I. KAFALA, T.D. MACMAHON, P.W. GRAY. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A339 (1994) 151
(Evaluation techniques)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(Fluorescence yields)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-98-1 Braunschweig (1998)
(K Auger electron energies)
- A. ARTNA-COHEN. Nucl. Data Sheets 84 (1998) 901
(Half-life, evaluation)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1 Braunschweig (1999)
(KX-ray energies and relative emission probabilities)
- N.E. HOLDEN, D.C. HOFFMAN. Pure Appl. Chem. 72 (2000) 1525
(SF half-life evaluation)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSEN. Appl. Rad. Isotopes 52 (2000) 595
(Program Emission)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 94 (2001) 131
(250Cf half-life)
- M.-M. BÉ, R. HELMER, V. CHISTÉ. J. Nucl. Scienc. and Techn. suppl. 2 (2002) 481
(Saisinuc & supporting software)
- I.M. BAND, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, P.O. TIKKANEN, S. RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables. 91 (2002) 1
(ICC)
- Y.A. AKOVALI. Nucl. Data Sheets 96 (2002) 177
(242Pu Decay scheme)
- R.D. DESLATTE, E.G. KESSLER, P. INDELICATO, L. DE BILLY, E. LINDROTH, J. ANTON. Rev. Mod. Phys. 77 (2003) 35
(K and L X-ray energies)

- G.AUDI, A.H. WAPSTRA. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Decay Q values)
- D. MACMAHON, A. PEARCE, P. HARRIS. Appl. Rad. Isotopes 60 (2004) 275
(Evaluation techniques)
- V.P. CHECHEV. http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm (2006)
(244Cm Half-life)
- F.G. KONDEV, I. AHMAD, J.P. GREENE, M.A. KELLETT, A.L. NICHOLS. Appl. Rad. Isotopes 65 (2007) 335
(Half-life, Alpha-decay transition probabilities)





1 Decay Scheme

Cf-252 disintegrates by alpha emissions mainly to the Cm-248 ground state level, and by spontaneous fission for 3,086(8) % .

The average number of neutrons emitted by spontaneous fission is: 3,7675 (40).

The average number of neutrons emitted per 100 disintegrations is :

$$n = 3,086 \times 3,7675 = 11,627 \text{ (33) \%}$$

Le californium 252 se désintègre par émissions alpha principalement vers le niveau fondamental de Cm-248 et pour 3,086 % par fission spontanée.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{252}\text{Cf})$:	2,6470	(26)	a
$T_{1/2}(^{248}\text{Cm})$:	348	(6)	10^3 a
$Q^\alpha(^{252}\text{Cf})$:	6216,87	(4)	keV

2.1 α Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,3}$	$\sim 5920,3$	$\sim 0,0019$	1200
$\alpha_{0,2}$	~ 6073	0,23 (4)	65
$\alpha_{0,1}$	6173,63 (11)	15,1 (3)	3,2
$\alpha_{0,0}$	6216,8 (1)	81,7 (3)	1

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{Cm})$	43,40 (3)	15,2 (3)	E2		724 (11)	204 (3)	1000 (15)
$\gamma_{2,1}(\text{Cm})$	100,2 (4)	0,232 (39)	E2		13,4 (4)	3,79 (9)	18,5 (5)
$\gamma_{3,2}(\text{Cm})$	154,5 (6)	0,00192	E2	0,1741 (25)	1,87 (5)	0,526 (12)	2,76 (6)

3 Atomic Data

3.1 Cm

ω_K : 0,972 (4)
 $\bar{\omega}_L$: 0,538 (23)
 $\bar{\omega}_M$: 0,061 (6)
 n_{KL} : 0,785 (5)
 \bar{n}_{LM} : 1,12 (4)

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X _K		
K α_2	104,59	63,87
K α_1	109,271	100
K β_3	122,304	}
K β_1	123,403	}
K β_5''	124,124	}
K β_2	126,889	}
K β_4	127,352	}
KO _{2,3}	127,97	}
X _L		
L ℓ	12,639	
L α	14,744 – 14,9560	
L η	17,315	
L β	17,288 – 20,515	
L γ	21,969 – 23,319	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	78,858 – 89,973	100
KLX	97,226 – 109,267	61,8
KXY	115,57 – 128,23	9,5
Auger L 6,3 – 24,5		

4 α Emissions

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,3}$	$\sim 5826,3$	$\sim 0,0019$
$\alpha_{0,2}$	$\sim 5976,6$	0,23 (4)
$\alpha_{0,1}$	6075,64 (11)	15,1 (3)
$\alpha_{0,0}$	6118,1 (1)	81,7 (3)

5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Cm)	6,3 – 24,5	5,02 (13)
e _{AK}	(Cm)		0,0000025 (4)
	KLL	78,858 - 89,973	}
	KLX	97,226 - 109,267	}
	KXY	115,57 - 128,23	}
ec _{1,0} L	(Cm)	18,9 – 24,4	10,93 (33)
ec _{1,0} M	(Cm)	37,1 – 39,4	3,08 (9)
ec _{1,0} N	(Cm)	41,7 – 42,9	0,856 (26)
ec _{2,1} L	(Cm)	75,7 – 81,2	0,159 (27)

6 Photon Emissions

6.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(Cm)	12,634 — 23,319	6,07 (14)
XK α_2	(Cm)	104,59	0,0000257 (7) } K α
XK α_1	(Cm)	109,271	0,0000402 (11) }
XK β_3	(Cm)	122,304	}
XK β_1	(Cm)	123,403	}, 0,0000151 (5) K' β_1
XK β_5''	(Cm)	124,124	}
XK β_2	(Cm)	126,889	}
XK β_4	(Cm)	127,352	}, 0,00000530 (19) K' β_2
XKO _{2,3}	(Cm)	127,97	}

6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}$ (Cm)	43,399 (25)	0,0152 (4)
$\gamma_{2,1}$ (Cm)	100,2 (4)	0,0119 (20)
$\gamma_{3,2}$ (Cm)	154,5 (6)	0,00051



7 Main Production Modes

Pu – 239(multiple,n – captures)

8 References

- F.ASARO, *et al.* Phys. Rev. 100, 1 (1955) 137
(Alpha emission energies and intensities)
- S.BJORNHOLM, *et al.* Phys. Rev. 130, 5 (1963) 2000
(Alpha spectra)
- D.MEHTA, *et al.* J.Inorg.Nucl.Chem. 27 (1965) 33
(Half-life)
- A.DE VOLPI, *et al.* Inorg. Nucl. Chem. Letters 5 (1969) 699
(Half-life)
- S.A.BARANOV, *et al.* Sov. J. Nucl. Phys 11,3 (1970) 393
(Alpha emission energies Alpha emission intensities)

- B.M.ALEKSANDROV, *et al.* Sov. Atomic Energy 28 (1970) 462
(Spontaneous fission half life)
- S.A.BARANOV, *et al.* Sov. J. Nucl. Phys 14,5 (1971) 614
(Alpha emission energies)
- R.L.WATSON, T.K.LI. Nucl. Phys. A178 (1971) 201
(Gamma-ray energies Gamma-ray emission intensities)
- J.D.HASTINGS, *et al.* Mound Laboratory report- MLM-1845 ; TID-4500 ; UC-4 (1971) 1
(Spontaneous fission half-life)
- B.J.MIJNHEER. Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 24 (1973) 185
(Half-life)
- V.SPIEGEL. Nucl. Sci. Eng. 53 (1974) 327
(Half-life)
- V.T.SHCHEBOLEV, *et al.* Sov. Atomic Energy 36 (1974) 507
(Half-life)
- S.A.BARANOV, *et al.* Proc.Advisory Group meeting Transactinium Nucl.Data, Karlsruhe, IAEA-186 B6 (1976) 249
(Alpha emission intensities)
- V.K.MOZHAEV. Sov.Atomic Energy 40 (1976) 200
(Half-life)
- F.LAGOUTINE, *et al.* Int. J. Appl. Radiat. Isotop. 33 (1982) 711
(Half-life)
- W.G.ALBERTS, *et al.* Report PTB-Mitteilungen 93 (1983) 315
(Half-life)
- M.DIVADEENAM, *et al.* Ann. Nucl. Energy 11, 8 (1984) 375
(neutron numer)
- J.R.SMITH. Report EPRI NP-3436 (1984)
(Half-life)
- R.A.P.WILTSHERE. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A236 (1985) 514
(alpha spectra)
- E.J.AXTON, *et al.* Metrologia 21 (1985) 59
(Half-life)
- A.RYTZ, *et al.* Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A253 (1986) 47
(Alpha emission energies)
- E.A.SHLYAMIN, *et al.* IAEA TECDOC-410 (1987) 225
(Half-life)
- CHEN KELIANG, *et al.* China Nucl. Information Centre Beijing, CNIC-I-004 (1988) 23
(Half-life)
- YU.S.POPOV, *et al.* Sov. J. Radiochemistry 32 (1990) 425
(X-ray emission probabilities)
- A.RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47,2 (1991) 229
(Alpha emission energies Alpha emission intensities)
- V.T.SHCHEBOLEV, *et al.* Sov. Atomic Energy 73, 6 (1992) 1015
(Half-life)
- A.K.PANDEY, *et al.* Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B82 (1993) 151
(Alpha to fission branching ratio)
- I.A.KHARITONOV. Report IAEA INDC(CCP)-362 (1994)
(Half-life)
- E.SCHÖNFELD, *et al.* Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(L X-ray emission intensities)
- YU.S.POPOV, *et al.* Radiochemistry 41, 1 (1999) 43
(Spontaneous fission half-life)
- Y.A.AKOVALI. Nucl. Data Sheets 87 (1999) 257
(Spin and Parity)
- M.BALASUBRAMANIAM, *et al.* Phys. Rev. C60 (1999) 064316
(Theoretical half-life)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA, C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q value)
- T. KIBEDI, T.W. BURROWS, M.B. TRZHASKOVSKAYA, C.W. NESTOR, JR. Proc. Intern. Conf. Nuclear Data for Science and Technology, Santa Fe, New Mexico, 26 September-1 Oc 769 (2005) 268
(ICC)



Reproduction Service
30, Boulevard Verd-de-Saint-Julien
92190 MEUDON

Achevé d'imprimer : décembre 2008
Imprimé en France

ISBN 92-822-2204-7 (set)
ISBN 92-822-2230-6 (Vol. 4)
ISBN 92-822-2231-4 (CD-Rom)